


Meer broedgevallen van de Stormmeeuw *Larus canus* in Noord-Holland buiten het duingebied

*More breeding records of Common Gull *Larus canus* in Noord-Holland outside dune areas*

Woutersen & Roobeek (1992) bespraken broedgevallen van de Stormmeeuw *Larus canus* in Noord-Holland buiten het duingebied. Het ging hierbij om broedgevallen in het noordelijk deel van de provincie, vaak op ongewone plaatsen zoals daken. Ook uit het zuidelijk deel van Noord-Holland zijn in de jaren 1987-1992 broedgevallen van de Stormmeeuw buiten het duingebied bekend geworden (figuur 1). Het gaat in totaal om de volgende aantallen: in 1987 28 paar, 1988 23-25, 1989 12, 1990 14, 1991 22 en 1992 31. Deze gevallen kwamen grotendeels aan het licht door inventarisaties ten behoeve van het Bijzondere Soorten Project (BSP) van SOVON. De broedgevallen werden vastgesteld op uiteenlopende plaatsen als sluiscomplexen en struikgewas (IJmuiden), akkerland (Zaanstreek, Haarlemmermeerpolder), hijskranen



Figuur 1. Broedgevallen van de Stormmeeuw buiten de duinstreek. *Breeding records of Common Gull outside the dune areas.*

(Spaarndam), een pompstelling op het fabrieksterrein van een suikerfabriek (Halfweg) en havenbakens (Amsterdam). In de polder IJdoorn, ten noorden van Amsterdam, broedden de Stormmeeuwen in de kolonie van Kokmeeuwen *L. ridibundus* en Visdieven *Sterna hirundo*. Op de hier aangegeven plaatsen werd alleen bij IJmuiden ieder jaar gebroed. Behalve in de in figuur 1 aangegeven gebieden, broedt de soort waarschijnlijk al vele jaren op het terrein van de Hoogovens te IJmuiden. Door de onmogelijkheid hier tellingen uit te voeren is het onduidelijk om hoeveel paar het gaat.

De Stormmeeuw blijkt de laatste jaren steeds vaker buiten het duingebied te broeden. Omdat solitaire paren of kleine kolonies zich nogal eens op zelden door vogelaars bezochte terreinen bevinden, is de kans groot dat broedgevallen over het hoofd worden gezien. Meldingen van dergelijke broedgevallen zijn van harte welkom bij de districtscoördinatoren van SOVON in Noord-Holland (Ruud Brouwer, Antwoordnummer 1477, 1740 WV Callantsoog voor gevallen ten noorden van Alkmaar-Hoorn en Hans Groot, Antwoordnummer 632, 2060 WJ Santpoort-Noord).

Summary Details on inland breeding by Common Gull Larus canus in the years 1987-92 in the southern part of the province of Noord-Holland are presented (fig. 1). These settlements often take place in unexpected places, rarely visited by birdwatchers, and are therefore easily overlooked.

Woutersen K. & Roobeek C.F. 1992. Broedgevallen van de Stormmeeuw *Larus canus* in het binnenland van Noord-Holland. *Sula* 6: 51-55.

Hans Groot, Kenaupark 14 (2.4), 2011 MT Haarlem
Fred Cottaar, Marsstraat 1, 2024 GA Haarlem