

Vervolg op "Zwartkeellijster in de Groninger binnenstad"

(Gr. Gors 9, no. 1. 1981).

De diaserie van deze dwaalgast in Groningen, zoals in de genoemde Grauwe Gors al werd aangekondigd, is inderdaad nauwkeurig bestudeerd. Hoewel onmiskenbaar en zonder twijfel een zwartkeellijster, vertoonden de kleurendia's enkele bijzonderheden die mogelijksterwijs enige aanvulling kunnen geven op de nog weinig gedetailleerde literatuurbeschrijvingen. De C.D.N.A. (Comm. Dwaalgasten Nederl. Avifauna) aanvaardde zonder meer onze determinatie en adviseerde om in verband met de waargenomen afwijkingen in het verenkleed de dia's ook voor te leggen aan dhr. C.S. Roselaar van het Zoölogisch Museum te Amsterdam. Dit hebben we natuurlijk gedaan. Dhr. Roselaar schrijft ons daarop de volgende interessante brief:

"Ik heb de dia's aan een onderzoek onderworpen en de vogel is inderdaad een fraai voorbeeld van Turdus ruficollis atrogularis. Ik kon een en ander vergelijken aan 10 mnl. ex. en 11 vrl. ex. uit onze collectie, meest afkomstig uit Zuid-Siberië (Tarbagatai, Altai, Turkmeniya, Tashkent) en West-China (Tarim Bekken). Van de vrl. ex. toonden 4 ex. een duidelijk maar smal wenkbrauwstreepje, lopend van de basis van de bovensnavel tot boven de oordekveren, evenals 2 mnl. ex. (beiden jong). Het ziet er precies hetzelfde uit als het streepje van de vogel op de dia. Er is klaarblijkelijk meer variatie dan de veldgidsen beschrijven. Ook in het boek "Birds of the Sovjet-Union" van Dementiev en Gladkov wordt de pootkleur als bruin aangegeven. Over het gedrag kon ik in Engelstalige literatuur niets vinden. Mogelijk staat er meer in de Russische handboeken, bv. Ptitsy Kazakhstana, deel 3, 1970, onder redactie van Dolgushin, waar de tekst van atrogularis 6½ blz. beslaat. De witte staartvlek lijkt me veroorzaakt door dat een van de buitenste staartpenen albino is. Dit komt wel meer voor, maar helaas vooral bij vogels in gevangenschap die tijdens de rui niet het juiste voedsel hebben gehad; in het wild maken dergelijke vogels niet veel kans, behalve, zoals bij stadsmerels en-mussen, daar waar predatoren ontbreken. Het feit dat de vogel een albino veer of vlek liet zien zou dus op gevangenschap kunnen duiden, evenals het voorkomen in dichtbevolkt gebied. Zoals ik u al telefonisch vertelde, worden er soms vogels aangevoerd, meest afkomstig uit India. Op welke schaal dit op het ogenblik gebeurt, zou ik u niet kunnen zeggen, maar ik weet dat er bijvoorbeeld omstreeks 1976 10-tallen atrogularis de douane op Schiphol gepasseerd zijn, evenals een aantal andere lijstersoorten, zoals Valé lijster."

J. van Klinken,
Scheperweg 26,
9751 RR Haren (Gr.)