

Toelichting

Op 17 juli werd via de politie een parkiet met kooi gebracht. De eigenaar ging met vakantie en zat met de parkiet in z'n maag. De eigenaar werd verzocht de parkiet weer op te halen, omdat het verzorgen van kooivogels niet strookte met de doelstelling van de Stichting.

Van 25 juli tot 10 augustus was er een invasie van Drieteenmeeuwen. Deze periode werd gekenmerkt door bijzonder slecht weer. Het was te koud voor de tijd van het jaar, te veel wind en te veel regen. Niet alleen boven land hadden we last van dit slechte weer, maar op de Noordzee was het nog slechter. Vooral jonge Drieteenmeeuwen zijn het slachtoffer van dit slechte weer geworden. De kleine visjes, die het voedsel vormen voor de Drieteenmeeuwen, kwamen door dit slechte weer nauwelijks aan de oppervlakte. Door voedselgebrek zijn duizenden Drieteenmeeuwen om het leven gekomen. De wat sterkere vogels zochten de kust op en werden bij tientallen tegelijk naar de asiels gebracht. Vele van deze uitgeputte, broodmagere vogels haalden het niet. STIVONO heeft 7 jonge Drieteenmeeuwen voorzien van onze ring, weer kunnen lossen.

Van deze slecht weer periode zijn ook veel Noordse stormvogels het slachtoffer geworden. Ook deze vogels werden uitgeput en extreem mager naar het asiel gebracht. Geen enkele vogel heeft het overleefd.

Op 6 augustus werd in de Noordduinen een witte Ekster gelost. De normale donkere delen waren wat beige van kleur. Wat er van deze Ekster geworden is, is niet bekend. Waarnemingen van witte Eksters uit deze periode zijn bij STIVONO niet bekend.

In juli werden nog veel jonge Merels, Spreeuwen, Mussen en Gierzwaluwen binnengebracht. Een zeer klein aantal kon met succes weer worden losgelaten.

Noordwijk, 15 oktober 1987

Stichting Vogelasiel Noordwijk
Postbus 168
2200 AD NOORDWIJK

-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-

GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT GEKNIPT

STRENGE WINTERS NEKKEN GROTE GELE KWIKSTAART

De afgelopen drie strenge winters hebben grote invloed gehad op de Nederlandse broedvogelstand van de Grote Gele Kwikstaart. In de belangrijkste broedgebieden, Zuid-Limburg en de ZO-Achterhoek bleek de stand in vergelijking met het topjaar 1984 te zijn afgenomen met ruim 60 %, respectievelijk bijna 75 %. De zwaarste klappen vielen langs de van oudsher dunbevolkte smallere beken, waar de stand inmiddels tot veelal nul is gereduceerd. Bij sommige brede beken wist de soort zich plaatselijk redelijk te handhaven. De Nederlandse broedvogelstand in 1987 kan op 70-100 paren worden geschat. Het zal ongetwijfeld vele jaren en de nodige zachte winters kosten, voordat de stand weer zo zal floreren als in 1984, toen 225- 275 paren in ons land broedden.