

digheden in de diepzee waarschijnlijk in de loop der tijden vrijwel constant gebleven zijn, heeft ook de evolutie vrijwel stil gestaan, terwijl de strijd om het bestaan er niet zo hevig is.

Wij kennen, zo schrijft Lemche, reeds een hele reeks van die dieren zoals de inktvissen Nautilus en Spirula, de slak Pleurotomaria en de vis Latimeria, die alle uit de diepzee komen.

## LITERATUUR

- H. LEMCHE: Uraltes Leben entsteigt dem Meer, Umschau 1957, Heft 9, p. 266/267.
- C.O. VAN REGTEREN ALTENA: Een nieuw levend fossiel, Corr. Blad der Ned. Malac. Ver. nr. 70 (1957), p. 677.
- C.M. YUNGE: Neopilina, survival from the Palaeozoic, Discovery, Vol. 18 (1957) p. 255.

## TELOCERAS BLAGDENI (SOWERBY)

Pleistocene Maasgrind van Zuid-Limburg

### aanvulling Limburgnummer

Op verzoek van de heer J. Willems brengen wij het volgende nog gaarne onder uw aandacht:

Pagina 80, achter de 31e regel van boven ontbreekt onderstaande tabel:

Nederland	Frankrijk	
Malm	Supérieur	
Dogger	Moyen	Bathonien
		Bajocien
Lias	Inférieur	

### Indeling Jura

Pagina 84, 17e regel staat: "St. Geertruid-Berg- en St. Pieter-Niveau".

Dit moet zijn: St. Geertruid-Berg en St. Pietersberg-Niveau.

Pagina 86, 4e regel van boven, als volgt te lezen:

Opvallend is ook dat in de laatste jaren veel vondsten gedaan zijn, in de meeste gevallen door particuliere verzamelaars. Dit blijkt ook uit de vondsten die gedaan zijn na 1950. Gevonden zijn nl. in 1952 no. 10, in 1954 no. 9, in 1955 no. 7, in 1956 no. 11 en 12 en in 1959 no. 8, (zie overzicht der vondsten).

REDACTIE.