

AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN VOOR DE LICHENENFLORA
VAN AMELAND EN VLIELAND

door Maarten Brand

In 1972 verscheen in Buxbaumiaella een lichenenlijst bij het verslag van de bryologische voorjaarsexcursie naar Ameland, en in 1975 een van de najaarsexcursie 1973 naar Vlieland.

Sindsdien bezocht ik Ameland eenmaal op 29-12-1977 en Vlieland een aantal malen tussen 1974 en 1977. Deze excursies leverden voor zowel Ameland als Vlieland een aantal nieuwe soorten op, die ik hier wil vermelden. Ook kwamen uit het materiaal, dat op de bryologenoexcursies verzameld was nog enkele nieuwe soorten te voorschijn. En verder bleken in de oorspronkelijke lijsten enkele foute determinaties voor te komen die ik hier wil rechtzetten. Tenslotte leek het me nuttig ook die soorten erbij te zetten die vroeger al vermeld zijn van Ameland of Vlieland, maar die niet in de excursieverslagen voorkomen noch door mij gevonden zijn.

Ameland

1. Verbeteringen

opgegeven naam	verbeterde naam
Caloplaca aurantia	Caloplaca heppiana
C. marina	C. marina (p.p.) salina (p.p.)
Catillaria sp.	Catillaria griffithii
Cladonia grayi	Cladonia merochlorophaea v novochlorophaea
Lecanora chlorona	Lecanora campestris (lw) laevis (4w)
L. dispersa	L. hageni (4w, p.p.) dispersa (4w, rest)
L. varia	L. conizaeoides
Verrucaria sp.	Verrucaria erichsenii (5) nigrescens (3)

2. Aanvullingen

<i>Acarospora heppii</i>	10
<i>Arthopyrenia halodytes</i>	1
<i>Bacidia nitschkeana</i>	4
<i>Caloplaca citrina</i>	3 6 8
<i>decipiens</i>	3
<i>heppiana</i>	3 6 8
<i>lithophila</i>	6
<i>luteoalba</i>	5
<i>rudenum</i>	3 6 8
<i>Candelaria concolor</i>	5
<i>Cladonia arbuscula</i>	
<i>v mitis</i>	4
<i>coccifera</i>	4
<i>cornuta</i>	4
<i>floerkeana</i>	4 7
<i>gracilis</i>	4 7
<i>macilenta</i>	4 7
<i>rei</i>	4
<i>subulata</i>	4
<i>uncialis</i>	4 7
<i>verticillata</i>	4
<i>zopfii</i>	4
<i>Collema tenax</i>	10
<i>Cornicularia muricata</i>	4 7
<i>Lecania cyrtella</i>	5
<i>erysibe</i>	3 6 8
<i>Lecanora albescens</i>	3 6 8
<i>carpinea</i>	2
<i>crenulata</i>	3 6 8
<i>expallens</i>	2 5
<i>flotowiana</i>	6
<i>laevis</i>	3s 5 6s 8s
<i>saligna</i>	9
<i>Lecidea granulosa</i>	4
<i>saepincola</i>	11
<i>symmicta</i>	4
<i>uliginosa</i>	4

<i>Lecidella scabra</i>	3 6 8
<i>stigmatea</i>	3 6
<i>Leptogium lichenoides</i>	10
<i>sinuatum</i>	10
<i>Opegrapha vermicellifera</i>	5 6
<i>Physcia dubia</i>	3
<i>nigricans</i>	6 8
<i>Physciopsis adglutinata</i>	5
<i>Placynthium nigrum</i>	6
<i>Rinodina exigua</i>	5
<i>Verrucaria muralis</i>	3

Vindplaatsen:

- 1 Nes, oude veerdam
 - 2 Nes, bomen in dorp (*Ulmus*) en op kerkhof (*Populus alba*)
 - 3 Nes, op NH kerk, op toren en op huizen
 - 4 Ballum, Roosduinen; binnenduinen met heide
 - 5 Ballum, bomen in dorp (*Ulmus*)
 - 6 Ballum, kerkhof
 - 7 Heitje tussen Ballum en Hollum
 - 8 Hollum, kerk
 - 9 Ballum, houten bankje lange fietspad door duinen
 - 10 Zwanewaterduinen, langs schelpenpad (fietspad)
 - 11 Buren, op *Pinus* in bos.
- s: epilithisch.

3. Literatuurgegevens

- Arthonia radiata* (1) Hollum, op *Acer* in dorp, 1951
- Cladonia cryptochlorophaea* (2)
 merochlorophaea
 v *merochlorophaea* (2)
 conistea (2)
 pyxidata s.str. (2)

Vlieland

1. Verbeteringen

opgegeven naam	verbeterde naam
Bacidia rosella	Bacidia rubella
Caloplaca marina	Caloplaca salina
Cladonia bacillaris	Cladonia floerkeana
C. squamosa	C. furcata v scabr.
Lecania fuscella	Bacidia naegelii
Lecanora crenulata	Lecanora hageni (1) crenulata (11)
L. hageni	L. saligna (19) hageni (13, 14)
Verrucaria microspora	Verrucaria erichsenii

2. Aanvullingen

Arthonia lapidicola	6
phaeobaea	7
Arthopyrenia fallax	1
Bacidia chlorococca	8
umbrina	
v corticicola	8
Biatorella pinicola	10 11
Caloplaca aurantia	12
lithophila	2
marina s.str.	7 12
runderum	2
salina	7 12
saxicola	2
Cladonia bacillaris	5
chlorophaea s.str.	4
cryptochlorophaea	5
furcata	
v scabriuscula	17
merochlorophaea	5
v novochlorophaea	5
Dermatina quercus	13
Lecania salina	14 (zie opm. elders in dit nummer)
Lecanora campestris	2

<i>Lecanora conferta</i>	2
<i>varia</i> s.str.	11
<i>Lecidea erratica</i>	3
<i>saepincola</i>	15
<i>Lecidella scabra</i>	2
<i>Peltigera rufescens</i>	18
<i>Physcia caesia</i>	2
<i>Ramalina duriaei</i>	16
<i>Thelidium minutum</i>	19
<i>Verrucaria nigrescens</i>	2 3 5

Vindplaatsen:

- 1 Oude Kooi, op jonge takken van *Acer pseudoplatanus* (1977)
- 2 Dorp, N.H. kerk en kerkhof (1977)
- 3 Duinen bij paal 46, op bakstenen in de duinen (1977)
- 4 Duinen N van Posthuis (1977)
- 5 Duinen aan Waddenzeekust, Z van Lange Paal (1977)
- 6 Lange Paal, op kiezelstenen langs fietspad (1973)
- 7 Waddenzeedijk bij Westerveld (1977)
- 8 Kooisplek, op *Empetrum* (1974)
- 9 W van Lange Paal, op *Salix repens* (1976)
- 10 Kwelder bij Bomenland, op houten paaltjes (1977)
- 11 Oude, bijna verrotte schutting in dorp bij N.H. kerk (1977)
- 12 Waddenzeedijk bij werkhaven (1977)
- 13 Op dunne takken van *Quercus*, tussen dennebos N van dorp (1974)
- 14 Waddenzeedijk O van de veerdam (1973)
- 15 Lange Paal, op *Pinus* (1975)
- 16 Oude Kooi, op *Acer* (1976)
- 17 Oostervallei, tussen Oude Kooi en Bomenland (1973)
- 18 Pad van 20 N van Oude Kooi, langs schelpenpad (1977)
- 19 Lange Paal, op schelpen aan rand van schelpenpad (1977)

3. Literatuurgegevens

- Candelariella xanthostigma* (3) *Ulmus* in dorp (1948)
Opegrapha varia (3) West Vlieland, op *Populus* (1951)

Literatuur

- (1) Barkman, J.J. 1958 Phytosociology and ecology of cryptogamic epiphytes.
- (2) Sipman, H.J.M. 1973 Ongepubliceerde verspreidingskaartjes bij: The *Cladonia pyxidata-fimbriata* complex in the Netherlands. *Acta Bot. Neerl.* 22: 490-502.
- (3) Maas Geesteranus, R.A. 1954 Notes on Dutch Lichens. *Blumea* 7: 570-592.