

Eendagsexcursie naar Culemborg en omgeving op 31 oktober 1992

Henk Greven

Om 10.15 uur hadden zich 7 deelnemers verzameld bij het station te Culemborg: Els Prins, Tilly Berkenbosch, Ger Harmsen, Leo de Borst, Henk Schendstok, Wim Loode en Henk Greven.

Eerst werd een wilgengriend uitgezocht aan de Zeedijk even buiten Culemborg (145.4/438.2). De lage wilgenstoven waren rijk begroeid met voornamelijk *Brachythecium*-soorten. Naast *B. rutabulum* vonden we *B. salebrosum*, *B. velutinum* en zeer overvloedig de neofyt *Brachythecium reflexum*. Deze "bergsoort" werd reeds in 1954 gevonden, maar niet herkend, door Willy Reijnders op een wilg in het Naardermeer. Ik trof de soort in 1990 aan in het herbarium van Willy en heb een deel van het ook toen reeds overvloedige en rijk kapselende materiaal ondergebracht in mijn eigen herbarium.

De vijfde *Brachythecium*, *B. populeum*, vonden we op bazaltkeien van een krib in de Lek bij Ravenswaay (151.4/440.8), ons tweede excursieterrein. Deze krib was uitgezocht omdat hier een andere neofyt, *Didymodon nicholsonii*, massaal voorkomt. Nadat een ieder dit mos had verzameld, bekeken we een aantal andere hier groeiende soorten: *Cinclidotus fontinaloides*, *Leskea polycarpa* en *Schistidium rivulare*.

Na de lunch begaven we ons naar een zuidelijk geëxponeerde, door schapen begraaide, dijk aan het Amsterdam-Rijnkanaal bij Rijswijk (152.6/441.0). Hier zochten we naar de hoofdsoort van de dag *Ephemerum recurvifolium*, maar ook naar *Bryum ruderale*, *Bryum rubens*, *Pottia davalliana*, *Pottia truncata* en vooral ook naar *Pottia recta*, die hier vorig jaar door Joop Kortselius was gevonden. Door ijverig te zoeken werden, met uitzondering van *Pottia recta*, alle genoemde soorten gevonden en kon een ieder met een mooi plukje kapselende *Ephemerum recurvifolium* voldaan huiswaarts keren.