

*Triphaena Janthina* F.

Roodachtig grijs met lichte rugstreep, daarnaast zwarte, driehoekige vlekken. Lichte zijdestrepen.  
Aronswortel.

*Mamestra nebulosa* Tr.

Licht bruin, zelden bruingrijs, met onderbroken witte strepen op den rug en schuine, zwarte strepen aan de zijden.  
Wollekruid.

*Luperina virens* L.

Vuilgroen met zwarten kop.  
Hoenderdarm — Weegbree — Graswortels.

*Leucania albipuncta* W. V.

Roodachtig grijs met eene witte donker gezoomde rugstreep. Eene zwartgrijze streep aan iederè zijde en daaronder eene witte, zwart- of geelachtige lijn.  
Grassen.

*Dichonia aprilina* L.

Naakt. Schorskleurig bruin met eene witte rugstreep tusschen gele en witte stippen. Eene witte, getakte zijstreep.  
Eiken.

*Brotolomia meticulosa* L.

Zie Maart.

## GEOMETRIDAE — Spanrupsvlinders.

*Urapteryx sambucaria* L.

Spanrups. Bedekt met bultjes en aan de zijden gerimpeld. Verschillend, bruin of grijs met kromme, donkere, overlangsche strepen.

Vlier — Peren — Pruimen.

*Larentia montanata* W. V.

Licht geelgrijs met eene donkere rugstreep en witte zijdestrepen.

Steutelbloemen.

*Angerona prunaria* L.

Aschgrauw of bleek bruin met donkere en lichte streepjes en wratten. Eene donkere zijdestreep.

Sleedoorn — Frambozen — Kamperfoelie — Haagbeuk — Olm — Hazelaar — Weegbree.

(Wordt vervolgd).

Utrecht.

TIDDO-FOLMER.



## Bekende groeiplaatsen van inlandsche planten.

### Familie RESEDACEEËN.

#### 1. Reseda.

- R. luteola* L. Aan ruigten, wegen, dijken. Limburg (niet zeldzaam), Den Bosch, Nijmegen, Arnhem, Tiel, Culemborg, Doesburg, Zutphen, Twello, Harderwijk (Haven, Molenbelt, zeldz.), Utrecht, Deventer, Zwolle, Kampen, Hardenberg, Meppel, Groningen, Wijk aan Zee, Haarlem, Bennebroek, Overveen, Naarden, Muiden, Hillegom, Vogelenzang, Leiden, Den Haag, Scheveningsche boschjes, Everdingen, Vianen, Westland, Koekange, Hulst, Sas van Gent.
- R. lutea* L. Aan ruigten, wegen, dijken. Maastricht, St. Pietersberg, Velden, Blerik, Hamert, Oosterhout, Nijmegen (niet zeldzaam), Arnhem, Tiel, Zutphen, Hattem Deventer, Zalk, Vollenhoven, Hardenberg, Velzen, Haarlem, Overveen, Amsterdam (Willemspark), Hillegom, Haagsche bosch, Vianen, Walcheren.

### Familie VIOLACEEËN.

#### 1. Viola.

- V. palustris* L. Moerassige hei- en veengrond. Slootkanten. Gennep, Velden, Arcen, Oostrum, Helmond (Peel), Oudenbosch (Etten), Heumen (St. Willebrord), Nijmegen (Hatertsche broek, Wichensche veen, Overasselt), Wolfhezen, Lochem, Winterswijk, Apeldoorn (Beekbergen, park achter 't Loo), Hattem, Utrecht, Zeist, de Belt (Beerschoten), Soestdijk, Maaibergen, Almelo, Vriezeveen, Tubbergen, Staphorst (bosch), Steenwijkerwold, Giethoorn, Meppel, Havelte, Weerdinge, Dalen, Odoorn, Valthe, Giekerk, Bergum, Texel, Terschelling (duinpan West-Tersch.), Abcoude, Leimuiden.
- V. hirta* L. Droge open of beschaduwde zand- en heigrond. Gronsveld, Meersen, Valkenburg, Oud-Valkenburg, Terhagen, Maastricht, Zutphen, Voorst, Deventer, Schoorl, Bergen, Csstricum, Velzen, Haarlem, Noordwijkerhout, Hillegom, Vogelenzang, Wassenaar, Voorne.
- V. odorata* L. Aan heggen, beschaduwde slootkanten, onder boomen. Gulpen, Eisden, Maastricht, Oudenbosch (Standaardbuiten), Nijmegen (Valkhof, Ubbergen, Beek), Culemborg, park Loo, Doetinchem, Harderwijk (zeldz.). Vleuten, Deventer, Kampen, Meppel, Weerdinge, Terschelling (duin Midland), Haarlem, Leiden, Westland, Voorne, Schouwen, Walcheren, Zuid-Beveland, Hoek.
- V. mirabilis* L. In bosschen. Maastricht, Rheden, Ubbergen, Helmond, Nijmegen (Ubbergen, Beek, Neerbosch), Terborg, Ruurlo, Winterswijk (Willinkhof), Apeldoorn (vroegere Beekbergerwoud, bij de Kar, Loo, Soerensche

- bosch), Wolfhezen, Hardenberg (bosch van Leuveren Hulshorst, 's Heerenloo), Wijhe, Delden, Steenwijker wold, Eeze, Eelde, Weerdinge, Castricum, Marquette Velzen, Bloemendaal, Haarlem (den Hout, Aardenhout Vogelenzang, Warmond), Haagsche bosch, Den Haag Schouwen en Duiveland (Reigersbosch), Oostkapelle.
- V. Riviniana* Rchb. In bosschen. Maastricht, Nijmegen (Beek), Hoenderloo, Doetinchem, Haagsche bosch, Walcheren (zeldzaam).
- V. canina* L. Droge open of beschaduwde zand- en heigrond, vooral veel in de Hollandsche en Zeeuwsche duinen. Vrij algemeen en overal.
- V. stagnina* Kit. Moerassige hei- en veengrond. Alleen bij Zeist, Veenendaal, Nieuw Lekkerland, Achttienhoven en Sliedrecht gevonden.
- V. lactea* Sm. Zand- en heidegrond. Arnhem, Velp, Ruurlo, Lochem (op 't Exelsche veld tusschen Groot Ampsen en Verwolde) Apeldoorn (Loenen, buurt Wormingen, Diepenveen (exercitieveld), Camp.
- V. tricolor* L. Zand- en heigrond, de varieteit *vulgaris* in de duinen en in korenland op hooge zandgronden, de varieteit *arvensis* in bouw- en korenland. Algemeen en overal.
- V. lutea* Sm. Langs de Geul boven Mechelen, tusschen Gronsveld en Mechelen en tusschen Cottesen en Gulpen.

### Familie DROSERACEEËN.

#### 1. Drosera.

- D. intermedia* Hayne. Moerassige heide- en veengrond. Overal en algemeen.
- D. rotundifolia* L. Moerassige heide- en veengrond. Overal en algemeen.
- D. longifolia* Rchb. Moerassige heide- en veengrond. Maashees (Aardbrand), Apeldoorn (Emst, Wissel), Nijkerkerveen, Eibergen, Nieuw Dordrecht (Zwarte Meer), Oostbroeksche veen onder Eelde.

### Familie CISTINEEËN.

#### 1. Helianthemum.

- H. guttatum* Mill. Duinvalleien en hellingen. Terschelling (Doodemans kisten, Liesterplak, Groene plak, Uilenplak, Studentenplak), Vlieland (weg naar het Badhuis, bij de Eendenkooi).
- H. vulgare* Gaertn. Op zonnige plaatsen op steenachtigen dorren zandgrond. St. Pietersberg (dicht bij de herberg de Roode Haan), Louberg (bosch v. Canne) Kadzand (duinkant).

H. HEUKELS.



## 16 MAART—15 APRIL.

UIT EEN DAGBOEK VAN 1896.

16 Maart. Abeel (*Populus alba*) staat op 't punt te gaan bloeien; van *Ribes sanguinea* zijn de hangende bloemtrossen zichtbaar; roeken en houtduiven zijn druk aan 't bouwen; de eersten breken met hun snavel veel takjes uit de iepen-boomen.

17 Maart. Prachtig weer; zuidenwind met zonneshijn. *Taxus baccata* stuift druk; maagdepalm bloeit en wordt voornamelijk bezocht door *Osmia bicornis*. Ook de eerste aardhommels (*Bombus terrestris*) komen voordendag. De dagbladen vermelden ooievaars.

18 Maart. Regenachtig, maar zwoel, wind Z. O., 't prachtigst denkbare weer voor vogeltrek. De Tjiftjaf (*Phylloscopus rufus*) is aangekomen en zingt druk in de hooge iepen.

19 Maart. Hetzelfde weder. Iepen bloeien, groenvinken (*Fringilla chloris*) laten zich veel hooren; berberis bot uit; van een enkele kastanje (*Aesculus hippocastanum*) springen de knoppen open.

20 Maart. Nachtvorst, koude nevel, regen en dan weer warme zonneshijn. Vleermuis vliegt in de namiddag, vier uur. *Holosteum umbellatum* bloeit, anemoontjes zijn al heelemaal boven de grond, maar staan nog gebogen.

22 Maart. Prachtig weer, zuidenwind; de meeste heesters zijn groen, bij een enkele *Spiraea*-soort zijn de uitbottende loten rozerood gekleurd, wat de indruk maakt, alsof die struikjes in bloei staan.

23 Maart. Bloeiende *Richardia*'s aan de markt; *Ribes* bloeit, lijsterbesknoppen bersten, anemoontjes staan recht op.

24 Maart. *Anemone nemorosa* bloeit. *Hepatica*'s en sneeuwkllokjes zijn uitgebloeid, ook taxus en elzen hebben gedaan.

25 Maart. *Corydalis solida* bloeit. De vroege kastanje (zie 19 Maart) heeft zijn bladeren uit de knoppen; een enkele spitsbladige ahorn begint te bloeien.

26 Maart. Zacht, vochtig weer, wind Z. O. Groote zwermen bonte kraaien komen uit 't westen en trekken over de Zuiderzee oostwaarts. Regenwulpen (*Numenius phaeopus*) en tureluurs (*Totanus calidris*) vliegen over.

29 Maart. Wandeling van Hilversum naar de Vuursche, door het Soester Ven naar Soest, en over Soestdijk naar Baarn. Welriekend viooltje bloeit nog, langs de zonnige zandweg zijn zandloopkevers (*Cicindela campestris* en hybridum), graafwespen (*Pompilus viaticus*), hagedissen (*Lacerta agilis*) druk in de weer. Bij de Vuursche zingen: vink, groenvink, winterkoninkje, roodborstje, meezen, merel, zanglijster en boomkruipertje.

In een vijver in de buurt veel *Utricularia*, zich ontwikkeld uit de winterknoppen, een dozijn soorten van

watertorren, larven van glazemakers, en de beide salamandersoorten. In 't Ven bloeit *Andromeda* bijna, waterklaver (*Menyanthes trifoliata*) begint uit te loopen. Langs de Soester straatweg vertoonen zich een paar roodborst-tapuitjes (*Saxicola rubicola*). *Larix* bloeit. Veel beukenmotjes (*Cheimatobache fagellum*) tegen eiken, beuken en ahorns.

1 April. Dotterbloem, Anemoontjes en *Corydalis solida* bloeien nu op 't drukst, ook *Forsythia viridissima* (Chineesche klokjes).

3 April. Reukgras (*Hierochloa odorata*) bloeit. Leeuwerik-nest met drie eieren. Ooievaar kleppert. Bij hectometerpaaltje 26 aan 't Sloter jaagpad hebben alle speenkruidbloempjes twaalf kroonblaadjes.

4 April. Bezoek aan de duinen bij Caprera (Klein Zomerzorg Zandpoort). Hondsviooltje bloeit prachtig mooi blauw tusschen dor gras aan de voet van witte berken. Hier en daar is zooveel bloem van *Corydalis solida*, dat de grond er bedekt lijkt met een purpurbloeiende wolkje. Een enkele groeipiek van die plant is door een laag van veertien dorre eikeblaren heen geboord. Pijpbloem (*Aristolochia clematitis*) komt op met dikke bruine stengels en is juist goed, om overgeplant te worden. Vogelmelk (*Ornithogalum nutans*) bloeit; de bol zit 40 cM. onder de grond. Kardinaalshoedje (*Evonymus europaeus*) is geheel bebladerd en vertoont bloemknoppen. Op een berk zit onbeweeglijk een peper-en-zout-mot, (*Amphidasis betularia*); zijn vleugels hebben juist de zilvergrauwe berkentint, de zwarte streepen erop bootsen de ademhalingsopeningen in de schors na. Kieviten schermten op 't binnenduin; wulpen roepen in de verte; gele lijsters en roodborstjes zingen tot bij achten 's avonds.

7 April. Amandelboompje en spitsbladige ahorn in volle bloei. Salomonszegel (*Convallaria polygonatum*) komt op; ook kiemplantjes van *Impatiens noli tangere* (Inlandsch Kruidje roer me niet).

8 April. De bloemen van de spitsbladige ahorn worden druk bezocht door prachtige graafbijtjes (*Andrena fulva*); *Carabus clathratus* gevangen, half elf v. m., tusschen gras, rondlopend aan een slootkant.

12 April. Hyacinthen bloeien druk. Oostenwind.

13 April. Keizerskronen en narcissen gaan open. Tulpen, crocusjes, scilla's en *Corydalis* zijn uitgebloeid.

14 April. Zwarte populier (*Populus nigra*) bloeit, ook berk (*Betula alba*), wilg (*Salix alba*), spar (*Abies excelsa*), brem (*Sarothamnus vulgare*), Klein Herderstaschje (*Teesdalia nudicaulis*), Sterremuur (*Stellaria Holostea*). Een mol zwemt een sloot over, waarin veel waterranonkel (*Batrachium sp.*) bloeit.

JAC. P. THIJSSSE.

## Vragen en Korte Mededeelingen.

## Een Vraag.

Wij hebben onze lezers een vraag te doen.

Velen uwer zullen opgemerkt hebben, dat wij in de meeste onzer opstellen de buigingsuitgangen geheel weglaten; dat wij van *eene, hunne, zijnen, mijnen* en *den*, de *e* en *n*'s weglaten, die maar in enkele streken van ons land gehoord worden; zoodat wij, als wij ons door de macht der gewoonte niet vergissen, altijd eenvoudig *een, mijn, hun* en ook *de* schrijven.

Dat is geen slordigheid; wij doen het opzettelijk, om het ons zelf en onze medewerkers, vooral de jeugdige, niet noodeloos lastig te maken.

Van *mijnen, uwen, eenen* en *eene* laten tegenwoordig zeer veel schrijvers de uitgang weg, zelfs in schoolboekjes; maar, dat wij die ook van het andere lidwoord weglaten, dat wij in plaats van *den* bodem, *den* avond, *den* kever, *den* vlinder, de bodem, de avond enz. schrijven, al is het woord manlijk, enkelvoud en 3de of 4de naamval, dat gaf een viertal onzer lezers aanleiding, ons te verzoeken, in 't vervolg weer *den* te schrijven, en niet *de*, waar dat volgens de gewone taalregels hoort.

Nu zouden wij graag zien, dat in de toekomst het weglaten van die *n* van *den* geen taalfout meer zou zijn; net zoo min als het weglaten van de laatste *e* van *eene* tegenwoordig nog als fout wordt gerekend. Het zou voor heel veel groote en kleine menschen, vooral voor hen, die nog examens moeten doen, een uitkomst zijn, als 't spoedig zoover kwam; dat ieder, die de *n*'s zetten wil, (omdat hij denkt, dat het zoo hoort of mooi staat), dat doet, — en dat ieder, die 't onnoodig vindt, het laat.

Om het kort te zeggen: wij willen die *n* van *den* niet afschaffen, dat kan ons weinig schelen, maar wij hopen dat het gebruik er van *facultatief* zal worden. Daarom schrijft één van ons drieën in zijn opstellen dan ook zorgvuldig alle uitgangen en zoekt in de woordenlijst van alle beestjes en plantjes op, of ze mannelijk of vrouwelijk zijn — d. w. z. van de namen.

Maar, en dit is het doel van dit berichtje, hinderen wij hiermee lezers, in plaats van, zooals wij dachten, de meesten een genoegen te doen, — dan zullen wij in 't vervolg bij woorden, waarvan wij, zonder het op te zoeken, weten, dat zij mannelijk zijn, in de 4de nv. enkelvoud, weer *den* zetten, Laat ieder, die het weglaten van de *n* van *den* hindert,