

Triphaena Janthina F.

Roodachtig grijs met lichte rugstreep, daarnaast zwarte, driehoekige vlekken. Lichte zijdestrepen.
Aronswortel.

Mamestra nebulosa Tr.

Licht bruin, zelden bruin-grijs, met onderbroken witte strepen op den rug en schuine, zwarte strepen aan de zijden.
Wollekruid.

Luperina virens L.

Vuilgroen met zwarten kop.
Hoenderdarm — Weegbree — Graswortels.

Leucania albipuncta W. V.

Roodachtig grijs met eene witte donker gezoomde rugstreep. Eene zwartgrijze streep aan iederè zijde en daaronder eene witte, zwart- of geelachtige lijn.
Grassen.

Dichonia aprilina L.

Naakt. Schorskleurig bruin met eene witte rugstreep tusschen gele en witte stippen. Eene witte, getakte zijstreep.
Eiken.

Brotolomia meticulosa L.

Zie Maart.

GEOMETRIDAE — Spanrupsvlinders.

Urapteryx sambucaria L.

Spanrup. Bedekt met bultjes en aan de zijden gerimpeld. Verschillend, bruin of grijs met kromme, donkere, overlangsche strepen.

Vlier — Peren — Pruimen.

Larentia montanata W. V.

Licht geelgrijs met eene donkere rugstreep en witte zijdestrepen.

Steutelbloemen.

Angerona prunaria L.

Aschgrauw of bleek bruin met donkere en lichte streepjes en wratten. Eene donkere zijdestreep.

Sleedoorn — Frambozen — Kamperfoelie — Haagbeuk — Olm — Hazelaar — Weegbree.

(Wordt vervolgd).

Utrecht.

TIDDO-FOLMER.



Bekende groeiplaatsen van inlandsche planten.

Familie RESEDACEEËN.

1. Reseda.

- R. luteola* L. Aan ruigten, wegen, dijken. Limburg (niet zeldzaam), Den Bosch, Nijmegen, Arnhem, Tiel, Culemborg, Doesburg, Zutphen, Twello, Harderwijk (Haven, Molenbelt, zeldz.), Utrecht, Deventer, Zwolle, Kampen, Hardenberg, Meppel, Groningen, Wijk aan Zee, Haarlem, Bennebroek, Overveen, Naarden, Muiden, Hillegom, Vogelenzang, Leiden, Den Haag, Scheveningsche boschjes, Everdingen, Vianen, Westland, Koekange, Hulst, Sas van Gent.
- R. lutea* L. Aan ruigten, wegen, dijken. Maastricht, St. Pietersberg, Velden, Blerik, Hamert, Oosterhout, Nijmegen (niet zeldzaam), Arnhem, Tiel, Zutphen, Hattem Deventer, Zalk, Vollenhoven, Hardenberg, Velzen, Haarlem, Overveen, Amsterdam (Willemspark), Hillegom, Haagsche bosch, Vianen, Walcheren.

Familie VIOLACEEËN.

1. Viola.

- V. palustris* L. Moerassige hei- en veengrond. Slootkanten. Gennep, Velden, Arcen, Oostrum, Helmond (Peel), Oudenbosch (Etten), Heumen (St. Willebrord), Nijmegen (Hatertsche broek, Wichensche veen, Overasselt), Wolfhezen, Lochem, Winterswijk, Apeldoorn (Beekbergen, park achter 't Loo), Hattem, Utrecht, Zeist, de Belt (Beerschoten), Soestdijk, Maaibergen, Almelo, Vriezeveen, Tubbergen, Staphorst (bosch), Steenwijkerwold, Giethoorn, Meppel, Havelte, Weerdinge, Dalen, Odoorn, Valthe, Giekerk, Bergum, Texel, Terschelling (duinpan West-Tersch.), Abcoude, Leimuiden.
- V. hirta* L. Droge open of beschaduwde zand- en heigrond. Gronsveld, Meersen, Valkenburg, Oud-Valkenburg, Terhagen, Maastricht, Zutphen, Voorst, Deventer, Schoorl, Bergen, Csstricum, Velzen, Haarlem, Noordwijkerhout, Hillegom, Vogelenzang, Wassenaar, Voorne.
- V. odorata* L. Aan heggen, beschaduwde slootkanten, onder boomen. Gulpen, Eisden, Maastricht, Oudenbosch (Standaardbuiten), Nijmegen (Valkhof, Ubbergen, Beek), Culemborg, park Loo, Doetinchem, Harderwijk (zeldz.). Vleuten, Deventer, Kampen, Meppel, Weerdinge, Terschelling (duin Midland), Haarlem, Leiden, Westland, Voorne, Schouwen, Walcheren, Zuid-Beveland, Hoek.
- V. mirabilis* L. In bosschen. Maastricht, Rheden, Ubbergen, Helmond, Nijmegen (Ubbergen, Beek, Neerbosch), Terborg, Ruurlo, Winterswijk (Willinkhof), Apeldoorn (vroegere Beekbergerwoud, bij de Kar, Loo, Soerensche

bosch), Wolfhezen, Hardenberg (bosch van Leuveren Hulshorst, 's Heerenloo), Wijhe, Delden, Steenwijker wold, Eeze, Eelde, Weerdinge, Castricum, Marquette Velzen, Bloemendaal, Haarlem (den Hout, Aardenhout Vogelenzang, Warmond), Haagsche bosch, Den Haag Schouwen en Duiveland (Reigersbosch), Oostkapelle.

- V. Riviniana* Rchb. In bosschen. Maastricht, Nijmegen (Beek), Hoenderloo, Doetinchem, Haagsche bosch, Walcheren (zeldzaam).
- V. canina* L. Droge open of beschaduwde zand- en heigrond, vooral veel in de Hollandsche en Zeeuwsche duinen. Vrij algemeen en overal.
- V. stagnina* Kit. Moerassige hei- en veengrond. Alleen bij Zeist, Veenendaal, Nieuw Lekkerland, Achttienhoven en Sliedrecht gevonden.
- V. lactea* Sm. Zand- en heidegrond. Arnhem, Velp, Ruurlo, Lochem (op 't Exelsche veld tusschen Groot Ampsen en Verwolde) Apeldoorn (Loenen, buurt Wormingen, Diepenveen (exercitieveld), Camp.
- V. tricolor* L. Zand- en heigrond, de varieteit *vulgaris* in de duinen en in korenland op hooge zandgronden, de varieteit *arvensis* in bouw- en korenland. Algemeen en overal.
- V. lutea* Sm. Langs de Geul boven Mechelen, tusschen Gronsveld en Mechelen en tusschen Cottesen en Gulpen.

Familie DROSERACEEËN.

1. Drosera.

- D. intermedia* Hayne. Moerassige heide- en veengrond. Overal en algemeen.
- D. rotundifolia* L. Moerassige heide- en veengrond. Overal en algemeen.
- D. longifolia* Rchb. Moerassige heide- en veengrond. Maashees (Aardbrand), Apeldoorn (Emst, Wissel), Nijkerkerveen, Eibergen, Nieuw Dordrecht (Zwarte Meer), Oostbroeksche veen onder Eelde.

Familie CISTINEEËN.

1. Helianthemum.

- H. guttatum* Mill. Duinvalleien en hellingen. Terschelling (Doodemans kisten, Liesterplak, Groene plak, Uilenplak, Studentenplak), Vlieland (weg naar het Badhuis, bij de Eendenkooi).
- H. vulgare* Gaertn. Op zonnige plaatsen op steenachtigen dorren zandgrond. St. Pietersberg (dicht bij de herberg de Roode Haan), Louberg (bosch v. Canne) Kadzand (duinkant).

H. HEUKELS.