

*Himera pennaria* L.

Schorskleurig met gele en roode vlekken aan de zijden.  
Op den laatsten ring roode spitsen.  
Eiken — Berken — Wilgen — Ooftboomen.

*Boarmia lichenaria* W. V.

Witachtig met groen gemengd en bedekt met bultjes. De kop heeft den vorm van een' platten kogel.  
Boomleverkruid.

*Eupitheca rectangularata* F.

Groen met eene roode rugstreep en gele zijdestrepen.  
Ooftboomen: Appels — en and.

*Acidalia brumata* L.

Groen met witte strepen.  
Ooftboomen: Pruimen — Noten — Eiken — Jonge beuken.

TIDDO-FOLMER.

(Wordt vervolgd).

## Vragen en Korte Mededeelingen.

### Gekleurde platen.

De gekleurde plaat, die bij deze aflevering verschijnt, is nummer 1 van een eerste serie van twaalf platen, waarin ongeveer vijftig van onze inlandsche vogelsoorten zullen worden afgebeeld.

De tweede serie zal gewijd zijn aan bloemen met hun gasten uit de insectenwereld. Daarna hopen we de Nederlandsche Reptielen en Amphibiën te geven, dan krijgen zoogdieren en visschen een beurt, terwijl ook reeds gewerkt wordt aan een serie (gekleurde) microscopische afbeeldingen.

Zoодоende zal langzamerhand een Atlas van de Nederlandsche Flora en Fauna tot stand komen.


In dit jaar kunnen we maar vier platen geven, maar de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat dit aantal tot zes, twaalf of nog hooger stijgen zal.

### DE REDACTIE.


#### Wie zoekt er mee?

Van Dr. Everts ontvangen wij het volgende schrijven:  
*Iets over een drietal groote bladsprietkevers, welke nog in Nederland kunnen ontdekt worden.*

*Sisyphus Schaefferi* L., een echte mestpillenkever, dus een naaste verwant van de heilige tor der oude Egyptenaren (*Ateuches Sacer* L.), welke laatste op allerlei monumenten en sarcophagen van het oude Egypte afgebeeld is. Onze dofzwarte, ongeveer 1 centim. lange kever, bij welke de voorschienen tot graven ingericht en de achterschienen bijzonder lang, dun en gebogen zijn, leeft op kalkheuvels, in de uitwerpselen van menschen en grazende dieren. Het ♀ legt hare eieren in een weinig mest en maakt door het ♂ geholpen, daarvan balletjes, die op een geschikte plaats in den grond begraven worden. Onze Limburgsche entomologen kunnen dezen kever, welke reeds in aantal nabij Visé en Loen, dus dicht nabij de Nederlandsche grens, werd aangetroffen, allicht ontdekken.



*Sisyphus Schaefferi*



*Gnorimus variabilis*

*Anoxia villosa* F., een aanverwant van den meikever, welke ook in vorm en grootte daarmede zeer overeenkomt en in de schemering en vroeg in den morgenstond op de wijze van den meikever onbeholpen rondvliegt. Deze kever

is gemakkelijk te onderscheiden door de dicht, wit, wollig behaarde onderzijde, het dicht behaarde schildje en de 3 meer of minder duidelijke witharige vlekjes op het halsschild; overigens wisselt zij van zwartbruin tot roodbruin. Het voornaamste onderscheid is echter, dat de doorbladerde sprietknots bij het mannetje uit 5, bij het wijfje uit 4 blaadjes bestaat, terwijl deze bij den meikever, respectievelijk uit 7 en 6 blaadjes is samengesteld. Deze merkwaardige stamverwant van den meikever, welke meer in het gebied van Frankfort en Wiesbaden t'huis behoort, werd door Belgische entomologen in eenige exemplaren op de heide van Calmpt-hout aangetroffen.

*Gnorimus variabilis* L. een merkwaardige kever, die in vorm geheel overeenkomt met den fraai metalisch-groenen *Gnorimus nobilis* L., welke laatste soort in de oostelijke provinciën en vooral in Limburg niet zeldzaam is op *Spiraea's*, *Viburnum lantana* en op sommige *Umbelliferen*. Het geslacht *Gnorimus* is eenigzins aanverwant aan het geslacht *Cetonia*, waartoe de welbekende „gouden tor” behoort. Het hier bedoelde insect echter is geheel zwart, met eenige witachtige spikeltjes op de dekschilden; de lengte bedraagt om en bij 2 centimeter. In het buitenland komt zij o. a. voor op bloeiende vlier, doch schijnt veel meer te worden aangetroffen in den molm van holle boomen als van eiken, elzen en iepen, evenals de in ons land zeldzame *Osmoderma eremita*, Scop., die zijne gedaanteverwisseling aldaar schijnt te ondergaan. Onze soort nu werd in de Belgische Campine van Limburg, bij Genck en Maeseeyck op de heide, kort na zonsopgang dicht over den grond vliegende aangetroffen.

Wie weet, of niet de een of ander bewonderaar der kever wereld op deze aanwijzingen afgaande, in het a.s. seizoen in onze grensprovinciën enkele onzer desiderata weet te ontdekken en dit dan aan den ondergeteekende wil mededeelen.

Nog zoovele andere, zelfs vrij groote, keverssoorten kunnen binnen onze politieke grenzen ontdekt worden, waarom ondergeteekende zich voor mededeeling ten zeerste aanbevolen houdt.

ED. EVERTS.

's Gravenhage, Stationsweg 79.

### Een prachtwerk.

Niemand zal beweren, dat de studie onzer vaderlandsche dieren niet omvangrijk en aantrekkelijk genoeg is, om een heel menschenleven met eere in beslag te nemen. Ja, al waren er honderden dierenvrienden, die het ruime gebied onder elkander verdeelden, zoodat de een zoo min mogelijk het werk van den ander herhaalde, dan nog zouden onze vogels en visschen, onze roofdieren en kikvorschen, onze tallooze insecten, weekdieren en infusoriën, onze wormen en holzakdieren, — de vroolijke fauna van den dag, de mysterieuse dierenschaar van den nacht, de zoo verborgen wereld der parasieten, ieder der waarnemers tot het einde van zijn leven rijke, boeiende stof kunnen opleveren.

En toch neemt ieder op zijn tijd wel eens graag een kijkje buitenslands; toch ziet elk, al is 't maar voor een keer, met belangstelling, wat „onze Moeder de Aarde” buiten onze grenzen, ja buiten ons werelddeel, voortbrengt. Zoo worden er op verkoopingten altijd mooie prijzen voor insecten uit de tropische gewesten geboden, en toen „Artis” voor eenige jaren eens iets tentoonstelde van de vele schatten, die het op dit gebied bezit, was de toeloop groot.

Het is geene verachting van onze Nederlandsche fauna, die daaruit spreekt. Integendeel, wie deze het best kent