

## 15 MEI—15 JUNI.

UIT EEN DAGBOEK VAN 1896.

17 Mei. Gele Raat (*Rhinanthus major*) bloeit in overvloed, Wollegras (*Eriophorum angustifolium*) heeft rijpe vruchten. Kardinaalshoedje bloeit en wordt druk bezocht door kevers, waaronder eenige groote Elateridae. Eiken bloeien, de groote gele brem (*Sarothamnus vulgare*) is in 't volst van zijn bloei. Jongen van Merel zijn al vlug.

18 Mei. Spotvogeltjes (*Hypolais icterina*) zingen sinds eenige dagen in 't Vondelpark, houden zich bij voorkeur in berken op en zitten bijna nooit in boomen, hooger dan een meter of acht. In 't nachtegaalshoekje kon ook wel een zwartkop-grasmusch zitten.

20 Mei. Op een plek, waar veel smeewortel, bloeit, we-melt het van hommels (*Bombus terrestris* en *B. lapidarius*) die alle zonder uitzondering op wettige wijze de honing inzamelen.

21 Mei. Tulpenboom staat geheel in blad; Catalpa bloeit, vlier begint; kamperfoelie, lijsterbes, sneeuwbal en sering zijn op hun prachtigst.

23 Mei. *Bryonia dioica* ♂ (heggerank) bloeit en wordt behalve door honigbijen en hommels (*B. agrorum*) veel bezocht door behangersbijtjes. (*Megachile centuncularis*.)

26 Mei. Honigbijen verzamelen in de vroege morgen al vliegende stuifmeel uit de ver vooruitstekende meeldraden van een tamme kamperfoelie, wat buitengewoon aardig is om te zien. Aan de honig kunnen ze natuurlijk niet komen. Paardebloem raakt uitgebloeid.

28 Mei. Een musschenpaar broedt voor de tweede maal. Een enkele plant van reigersbek (*Erodium cicutarium*) beslaat een kring van anderhalve Meter in middellijn: de snavels van de vruchten ervan zijn 5—7 centimeter lang. Papavers bloeien prachtig, maar er is geen enkel insect op te zien.

29 Mei. Mieren zijn in de tuin druk aan 't sjouwen met zaden van stinkende Gouwe (*Chelidonium majus*), vast wortelige Helmbloem. (*Corydalis solida*) en van Anemoontjes. (*Anemone nemorosa*).

3 Juni. Bij Bloemendaal in een boschkuil onder eiken en beuken veel *Scrophularia vernalis* in prachtige exemplaren; *Anchusa officinalis* en braamsoorten bloeien. De *Aristolochia's* achter Klein Zomerzorg staan in volle bloei; de meeste bloemen zitten vol vliegjes. De Duinroos vormt een wit kleed op 't duin; verder bloeien *Polygala* en zeer talrijk de Bremraap van 't Walstroo (*Orobanche Galii*). *Listera Ovata* bloeit druk, maar tevergeefs zoek ik er op naar zijn insecten. (*Grammoptera* is anders in de duinen niet zeldzaam). Kieviten, Tureluurs, Grutto's en Wulpen maken een verbazend misbaar.

5 Juni. Paardebloemen met bandvorming vertoonen alle toch neiging om hun platte bloemstengels weer rolrond te maken. Dat doen ze op tweeërlei manier: sommige doen net, alsof ze van binnen opgeblazen werden, andere probeeren een kring te vormen. Dit alles geeft aanleiding tot de gekste verwringen.

7 Juni. Wilde wingerd bloeit en lokt natuurlijk ook al honigbijen. Van hommels komen al veel kleine werksters voor. Populierbok (*Saperda Carcharias*) gevangen in holle knotwilg.

8 Juni. Jonge ooievaars doen vliegkunsten, zwermen jonge spreuwen zijn er al lang. De koekoek roept nog.

11 Juni. Plompen bloeien overvloedig, Fonteinkruid (*Potamogeton nitens*) begint ook. Boschbessen zijn al heerlijk rijp, ook wilde aardbeien. De slangenwortel bloeit, waterklaver is al bijna gedaan.

14 Juni. De oeverzwaluwjes in de Haarlemmermeer-polder hebben al jongen, maar die zijn nog kaal en hulpbehoevend. De kolonie heeft veel last van ratten. De nestgangen liggen bijna horizontaal. De zwaluwtjes bij Ouderkerk a/d Amstel bouwen hun gangen naar 't achter eind toe opwaarts hellend. Jonge geelgorzen vliegen.

JAC. P. THIJSSSE.



## RUPSENKALENDER.

(Vervolg van blad. 46).

Evenals we de eerste maal met de Lente gedaan hebben, geven we nu ook eerst eene reeks van rupsen, die den geheelen zomer door te verzamelen zijn en daarna van elke maand afzonderlijk.

## ZOMER (Juni, Juli, Augustus).

## RHOPALOCERA—Dagvlinders.

*Vanessa urticae* L.

Doornrups. Zwart, geelgestreept.

Brandnetels.

*Vanessa polychloros* L.

Vuilgrijs en bruin, met gele zijdestrepen en dito rugstreep. Bruine doornen.

Wilgen — Olmen — Espen — Ooftboomen: Kersen — Peren.

*Vanessa cardui* L.

Zwartgrijs, geelgestreept of met dito stippen. Geelgedoorn.

Distels — Brandnetels — Duizendblad — Kliswortel — Malvasoorten.

*Vanessa Antiopa* L.

Zwart met zwarte doornen, hoogrood gevlekte rugstreep en witte stippen.

Wilgen — Berken — Populieren: v. n. Espen

*Vanessa Atalanta* L.

Grondkleur wisselt af tusschen groenachtig geel, bruinrood of vleeschkleurig en zwartachtig. Aan beide zijden eene rij halvemaaan-vormige gele vlekken en gele doornen.

Brandnetels (in te zamen gesponnen bladeren) — Tuinmalva.

*Vanessa Io* L.

Doornrups als de voorgaanden. Zwart met witte stippen.

Groote brandnetels — Hop

*Vanessa C-album* L.

Half oranjekleurig en verder wit met dito doornen. Aan de zijden bruin.

Brandnetels — Olmen — Aalbessen — Hop.

*Pieris brassicae* L.

Blauwgroen. Op den rug en aan de zijden gele strepen. Overal met zwarte stippen en dito haartjes. Zwarte kop.

Alle koolsoorten — Mosterd — Nachtvlootjes — O-I. kers.

*Pieris rapae* L.

Dofgroen met gele zijdestrepen. Gele stippen aan de zijden. Koolsoorten — Rapen — Rammenas — Nachtvlootjes — Knoflook — Reseda — enz.

*Anthocharis cardamines* L.

Blauwgroen, witachtig gestreept.

O-I. kers — Waterkers — Tuinmosterd — Taschjeskruid.

*Papilio Machaon* L.

Aanvankelijk zwart met roode doortjes en eene witte vlek op den rug, later groen met zwarte ringen, die bruinrood gestippeld zijn.

Fenkel — Rapen — Karwij — Peterselie — Selderij — en and. Scherm-bloemigen.

*Melitaea cinxia* L.

Zie April.

*Rhodocera rhamni* L.

Zie Mei.