

Bekende groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familiën behorende planten.

(Vervolg en slot.)

Familie Pomaceeën.

1. Crataegus.

C. Oxyacantha L. In bosschen en heggen. Epen. Bostel, Breda. Nijmegen (Beek, Ubbergen, Berg-en-Dal), Rheden, Zutphen, Brummen, Warnsveld, Winterswijk, Voorst, Apeldoorn. Wulperhorst, de Bilt, Achttienhoven. Delden, Raalte, Zalk. Valthe. Groningen, Haren. Boetgum, Belkum, Hardegarijp, Bergum, Goutum, Bergen, Overveen, Haarlemmerhout. Warmond, Wassenaar, den Haag, Delft. Schouwen en Duiveland, Walcheren, Zuid-Beveland, West-Zeeuwsch Vlaanderen.

C. monogyna Jacq. In bosschen en heggen. Limburg (alg.). Bostel, Oudenbosch. Nijmegen, Wageningen, Apeldoorn, Harderwijk. Wijhe, Twenthe, Steenwijkerwold, Giethoorn. Terschelling, Texel, Kennemerland, Bloemendaal, Haarlem, Hilversum. Delft, Wassenaar, Staalduin, Voorne. Schouwen en Duiveland. St. Philipsland, Noord-Beveland, Walcheren, Zeeuwsch Vlaanderen.

2. Mespilus.

M. germanica L. In bosschen. Meersen, Slenaken, Plas-molen. Nijmegen (Ubbergen, Mook, Meerwijk).

3. Pirus.

P. communis L. Verwilderd in bosschen. Herpt, Berg-en-Dal, Doorwerth, Zalk, Steenwijkerwold. Friesland (wouden). Scheveningen (duinen).

P. malus L. Verwilderd in bosschen. Breda. Doorwerth. Zalk, Helpen, Onnen. Friesland (Wouden). Bergerduin, Bloemendaal, Vogelenzang, Wassenaar (duinen), Waalsdorp, Domburg.

P. arbutifolia L. var. erythrocarpa A. Gray. Alleen bekend

van duinvalleien tusschen Domburg en Westkapelle en van Steenwijk.

4. Sorbus.

S. aucuparia L. In bosschen. Vrij algemeen en bijna overal.

5. Amelanchier.

A. vulgaris Mch. In bosschen verwilderd, St. Pietersberg. Nijmegen (Uilenput, Ubbergen), Heino.

A. canadensis Torr. et Gray. Verwilderd in akkersmaalshout te Apeldoorn en te Haarlem (Bentveld, achter Elswout, Boekenrode, Haarlemmerhout).

Familie Aristolochieeën.

1. Aristolochia.

A. Clematitis L. Aan heggen, op grazige beschaduwde plaatsen. Valkenburg, Houtem, Vijlen, Gennep, Venlo, Doorwerth, Zutphen, Utrecht, Amersfoort, Deventer, Zwolle. Ameland. Langs den geheelen duinzoom van Castricum tot Leiden. Dordrecht.

2. Asarum.

A. europaeum L. Alleen bij Maastricht in bosschen.

Familie Loranthaceeën.

1. Viscum.

V. album L. Op verschillende boomsoorten woekerend. Overal in Zuid-Limburg. Deurne, Blijham, Amsterdam, Haarlemmerhout, Dordrecht.

H. HEUKELS.



Vragen en Korte Mededeelingen.

Vereeniging „Minerva”.

Hiermede heeft het bestuur de eer u te berichten, dat voor de volgende Openbare Vergadering, welke zal gehouden worden op Woensdag 19 April e. k. voor de abonnées van dit tijdschrift gratis toegangskaarten verkrijgbaar zijn bij de heeren J. Q. Bosz, Oudezijds-Achterburgwal 205 en E. A. van Genderen Stort, Brederodestraat 2.

Namens het bestuur:

E. A. v. GENDEREN STORT, *Secretaris.*

Winterdieren.

Sinds eenige weken houdt zich gedurig een klein vogeltje in mijn tuin op, dat, volgens de beschrijving in afl. 1, jrg. 1 van uw tijdschrift, een tjiptaf is. Mijn buurman beweert het diertje al met Nieuwjaar gezien te hebben. Het is alleen, en geluid heb ik er nog niet van gehoord; het zou dus ook een fitis kunnen zijn. De kleur komt geheel overeen met beschrijving op blz. 8. Kan mijn naamsbepaling goed zijn? Het slot van het artikel deed mij voor een vergissing vreezen. Vandaar mijn bericht en vraag.

Een dag of vijf geleden (6 Febr.) zag ik hier ook een kwikstaart over het ijs trippelen en druk pikken. Wat daár voor het beestje te vinden was, kon ik niet nagaan.

En nu nog iets over een huisjesslak. Ik vond gisteren in mijn tuin zoo'n dier, met de opening van de schelp behoorlijk door een vrij stevig deksel afgesloten. Ik nam de slak mee naar binnen en legde ze op een plank voor het raam, waarop eenige planten staan. Van morgen was de slak verdwenen, alleen het uit verschillende lagen bestaande dekseltje lag er nog. Het slijmerige spoor wees me al gauw de vluchteling. Ze was weggekropen, onder

tegen den stengel van een plant. Zeker was ze door de warmte — het was gisteren buiten 60° F. — wakker geworden en had ze honger gevoeld en voedsel bespeurd. De opening van de schelp was echter weer afgesloten, maar nu slechts door een dun vliesje. Ze zal zeker gemerkt hebben, dat het nog te vroeg was.

Middelburg.

J. v. T.

Uw vogeltje zal wel een goudhaantje geweest zijn: kunt u zich ook herinneren, of hij een geel streepje midden over zijn kop had? Daaraan zijn goudhaantjes 't best te kennen. Die kwikstaart had stellig dorst, ik heb spreuwen en kraaien ook wel zoo zien doen, en 't ook voor staartmeesjes vermeld gevonden.

T.

Eenige dagen geleden en hedenmiddag weer, werd, in het bosch alhier, mijne aandacht geboeid door eenige kleine vogeltjes, die zich onledig hielden met het opsporen van hun voedsel op met mos begroeide eikeboomen. De diertjes, die me tot op een paar passen afstands lieten naderen, waren aan de buikzijde lichtgrijs; de rug was bronskleurig; op de vleugeltjes was een zwart kringetje op te merken en enkele zwarte strepen; op den kop zag ik tusschen twee zwarte vlekken eene oranje-streep; de korte staart was V-vormig ingesneden, grootte als van een winterkoninkje; vorm gedrongen. Zou u s. v. p. in „De L. N.” den naam van dit weinig schuwe, levendige vogeltje willen mededeelen?

BAKHUIZEN.

Stellig een Goudhaantje.

T.

Een goed middeltje om kikkervischjes groot te brengen.

Verleden voorjaar waren met de waterplanten uit de sloot eenige kikkervischjes in ons aquarium gekomen, eenige werden door de salamanders opgegeten, andere