

Een zeldzame pijlstaart.

In de laatste week van Juni ving ik in mijn tuin een gaaf exemplaar *Smerinthus Tiliae* var. *Brunnea*, waarvan in ons land, zooals u weet, nog slechts enkele exemplaren (o. a. door Prof. Dr. Van Leeuwen, Dr. Kallenbach, Mr. De Roo van Westmaas) zijn gevangen.

Voorschoten.

G. J. KLOKMAN.

**Een driedubbele tulp.**

Hierbij een sepia-teekening van mijn driedubbele tulp.

Tengevolge van de groote hitte in 't laatst, zijn de 2 kleine knoppen niet ontwikkeld; wel zijn ze zoover gekomen, dat ze duidelijk de kleur van de tulp vertoonden.

Op de teekening is duidelijk te zien, waar de stengel een gleuf vertoont. Eerst bij het tweede paar der zichtbare bladen (het eerste paar kleine blaadjes) splitst zich de stengel in drieën.

Ingeval u er een reproductie van laat maken had ik gaarne 2 afdrucken voor den heer J. H. R., die zoo vriendelijk was de teekening voor mij te maken. Is ze niet geschikt, dan wilt u ze mij wel retourneren?

J. D. ERDMAN SCHMIDT,

Hoofd der 1ste O. L. S.

Beekprik.

Het voorkomen van de beekprik (*Petromyzon planeri* Blch.) in Nederland werd eerst in 1899 door Dr. J. C. C. Loman geconstateerd. Dr. L. vond ze in de Heelsumsche en de Renkumsche beek. Van mijne leerlingen vernam ik, dat ook in de Klarenbeek (bij Arnhem) prikken voorkwamen. Vangen, vangen, en mij laten zien! was dan steeds mijn antwoord. Het gelukte verleden maand

eindelijk aan Antonia Vermeer een dood exemplaar machtig te worden. Het was werkelijk een *Petromyzon planeri* Blch.

Het ex. bevindt zich thans in de verzameling der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging te Helder.

Arnhem.

A. C. OUDEMANS.

Naar aanleiding der vraag van Mej. Van Deinse, welke vogel het kan wezen die in 't voorjaar „Schiët in 't vuur” en in 't najaar „Spin Dikke” roept, kan ik u melden dat het de *koolmees* is.

Onder de buitenlui bij Enschede wordt deze vogel algemeen met den eersten naam „Schiët in 't vuur” genoemd.

Onder de spelletjes met planten kan ik u nog noemen het maken van een „kanarievoegeltje” uit de bloemen der groote ratelaar, of zooals die hier en bij Enschede genoemd wordt gele hotte. Dit laatste staat misschien in verband met de naam ijzerhorde, die hier roode hotte genoemd wordt.

Om een „kanarievoegeltje” dan te maken neemt men van de bloem de onderlip met de twee daaraan zittende meeldraden af. Uit de bovenlip verwijderd men den stamper en buigt de beide overgebleven meeldraden achterover zoodat ze pootjes vormen. De tandjes aan de bovenlip vormen den snavel, meeldraden de pooten en helmknoppen de voeten.

Nijverdal.

P. J. LEMPERSZ.

Zwarte variëteit van onze gewone hagedis.

Naar aanleiding van het berichtje van dr. A. C. Oudemans over melanisme bij een hagedis, bericht ik u dat ik ook eens een geheel zwarte hagedis ving onder langs de Wageningsche Berg, nl. verleden jaar in de groote vacantie.

P. CALAND.

Wellicht is 't de moeite waard u te melden, van het vangen van een ♂ van *Spilosoma Lubricipeda*, bij 't licht bemachtigd door een mijner kennissen. Zij was echter te beschadigd door 't in de vlam vliegen, dat ik hem heb kunnen opzetten. Een deel der door 't ♂ gelegde eieren stel ik beschikbaar voor de een of andere vlindervriend; franco per post.

Rotterdam.

P. v. ROSSUM.

***Draba muralis*.**

Nog iets omtrent *Draba muralis*. Ik herinner me uit een vroeger schrijven, dat u ze gevonden hadt te Gorinchem, en wel met ongeoorde bladeren. Ik ben er eens op uit geweest en vond ze in groote hoeveelheid, doch enkel geoorde. De plant schijnt zich verbazend te vermenigvuldigen. Ze groeit langs de spoorlijn van Leerdam tot Giesendam—Hardinxveld. Bij Gorcum ook langs dijken en wegen. Ik zag aan 't spoor heele velden, zoo dicht bij elkaar, dat ze 't best te vergelijken zijn met vlasakkers. Ze staan er bij miljoenen!

J. VAN WIJNGEN.

Aangeboden.

Als speciale ruilexemplaren kan ik aanbieden: *Boarmia lichenaria* Hfn. (mosmeter), *Ortholitha cervinata* (een fraaie spanner, waarvan ik een honderdtal rupsen kweek, verschijnt a.s. najaar) en *Pyrrhia umbra* (een fraai niltje).

B. BOON.

Rupsen of poppen van Daggauwoog en Atalanta.

Tegenwoordig worden hier — t. w. Slochteren, Hoogezand, Veendam en Wildervank — de brandnetels kaal gevreten door de rupsen van de daggauwoog. Mocht U met een bezendingrupsen of poppen gediend zijn, zoo behoeft U slechts te schrijven. En zou U in de komende afl. van *D. L. N.*, zoo het daarvoor nog niet te laat is, deze rupsen of poppen evenals die van *Vanessa Atalanta* voor de liefhebbers, willen aanbieden. Wie kan mag er voor een paar poppen van andere dagvlinders sturen, een paar poppen van de distelvlinder of van de groote aurelia zullen direct met een dozijn poppen van een der soorten, al naar men verkiest, worden beantwoord.

Lageland (gem. Slochteren).

D. KOPPELLE.

Lichenologen!

Wie der lichenologen stelt belang in een partijtje goed geconserveerde Lichenen, bijna alle van Zürich en omstreken. Ingeval er meer dan één liefhebber opdaagt, zal ik de partij verloten. Cadeau, doch ongefrankeerd. Adres Oudemans, Boulevard 85, Arnhem.

Herbarium.

Wie stelt belang in een 50-tal gedroogde planten van Den Bosch en Omstreken. Voorwaarden als boven. Adres Oudemans, Boulevard 85, Arnhem.

Gevraagd

volledige, liefst levende exemplaren van *Cirsium anglicum*, in ruil voor: *Sturmia Loeseli*, *Epipactis palustris*, *Herminium Monorchis*, *Orchis incarnata*, *Pulmonaria officinalis*, *Parnassia palustris*, *Viola palustris*, *Saponaria vaccaria*.

Rijswijk, Z.-H.

H. R. HOOGENRAAD.

Zoudt u mij dan misschien kunnen zeggen of (en waar?) cyaankaliflesschen te verkrijgen zijn en tegen welken prijs?

Te Amsterdam bij Merkelbach en te Dordrecht bij Kriebel. Vraag prijscouranten.

Reeds lang heb ik dit jaar naar de gallen van *Rhodites Mayri* Schlecht. gezocht; ik kon er echter niet meer dan een tweetal vinden. Daar ik er echter veel meer nodig heb kom ik met het verzoek aan de lezers der „Levende Natuur”, om ze voor mij te willen bewaren, wanneer ze deze tegenkomen. De gallen lijken veel op *Rhod. rosae* wat de vorm betreft. Ze zijn in 't najaar bruin, maar daar de uitsteeksels onvertakt zijn, is de wand van de gal te zien. Een afbeelding vindt men in mijn stuk over gallen fig. 4, ofschoon een zeer bijzonder geval. *R. Mayri* komt 't meest voor aan *Rosa rubiginosa*.

Ik hoop, dat iemand me er aan zal kunnen helpen.

W. DOCTERS v. LEEUWEN.

Bussum, Nassaupark 5.