

afteekende tegen het hemellicht, in een donkere kleur of lichter, naarmate het licht viel op hunne vleugels; maar dat was in de maanden Februari of Maart. Zou het zachte winterweer hen in de war brengen?

Verbazende zwermen van genoemde vogels ziet men dan aan de door mij genoemde kusten van de Noordzee. Ziet men dit ook gebeuren aan de kusten der Zuiderzee?

Naarden, Dec. 1900.

Z.

Tulpenbollen boven den grond.

Ik moet u even meedeelen, dat de eigenaardige bolvorming bij tulpen in de oksels der bladeren, van welk verschijnsel u gewag maakte in *D. L. N. IV*, blz. 59, ook is waar te nemen aan een mooie „Duc van Tol”, die in een bloempot binnen het schoollokaal werd gekweekt en normaal bloeide.

Leerdam.

S. WIJNGEN.

Wild Zwijn.

Misschien kan ik u van dienst zijn met een klein berichtje voor *De Levende Natuur*. Ik heb n.l. dezer dagen op het buitengoed „De Bannink”, bij Colmschate (gem. Diepenveen), een wild zwijn gezien. Ik was in de gelegenheid, het beest gedurende eenige minuten van vrij dichtbij te kunnen waarnemen, zoodat ik u voor de juistheid van deze mededeeling in kan staan. Hij stond op den rand van dicht dennenkreupelhout, en liep een zandweg over juist naar mij toe; toen hij mij zag, ging hij denzelfden weg terug; het was 2 uur 's middags. De streek is daar rijk aan dicht dennenhout, een zeer geschikte schuilplaats aanbiedend. Vorige jaren hoorde ik meermalen bij geruchte, dat zich onder Diepenveen wel eens wilde zwijnen ophielden. In de winter '90-'91 werd er op het Joppe te Gorsel één geschoten. Zeker heeft de strenge winter hen hier gebracht uit Duitschland.

Deventer.

C. J. ENKLAAR.

Alopecurus (Vossestaart).

Ondergeteekende verzoekt beleefd toezending (niet franco) van planten uit het geslacht *Alopecurus* met opgave van vindplaats, hetzij versch, hetzij in gedroogden toestand, zooveel mogelijk met de onderaardsche deelen. Indien het mogelijk is, zijn buitenlandsche exemplaren ook zeer welkom.

Voor hen, die niet met dit grassengeslacht bekend zijn, voeg ik er het volgende bij. De grassen van dit geslacht hebben een rolronde aarpluim van $\pm \frac{1}{3}$ c.M. lange aartjes. Ieder aartje is éénbloemig en bestaat uit 2 aan den voet vergroeide kelkafjes en verder is de eenige bloem (3 meeldraden en een stamper) omgeven door een evengroot kafje (kroonkafje), dat een naald in of onder het midden van den rug draagt. Vooruit bedank ik hen, die mij aan exemplaren helpen.

ANDRÉ C. J. VAN GOOR.
Vijzelstraat 61, Amsterdam.

Orixa japonica.

Dezer dagen vond ik in een stadstuin een mannelijk exemplaar van de weinig bekende struik *Orixa japonica* (Thunb.). Wie kan mij een vrouwelijk exemplaar bezorgen? Zij bloeien in Mei.

Haarlem.

LEONARD A. SPRINGER.
Tuin-architect.

Vertakte Orchis Moris.

Van den heer De Moor te Amsterdam ontvingen wij een merkwaardig exemplaar van Orchis Morio. De bloeistengel vertakt zich in drieën en elk deel nog eens, zoodat de bloeiwijze een zeer vreemden indruk maakt. De stengel heeft drie knollen, doch er is geen bandvorming te bespeuren, de stengel is alleen wat dikker dan gewoonlijk.

f m aakt


Gele Doovenetel.

Daar ik niet weet, of deze vindplaats u reeds bekend is, meld ik u dat Galeobdolon luteum Huds (Gele doovenetel) door mij aan de Hamersfeldschen weg bij Amersfoort gevonden is in vrij groot aantal op den 12den Mei.

C. P. G. C. BALFOUR VAN BURLEIGH.

Bandvorming bij Paardebloemen.

Op de wallen van Naarden vond ik een vergroeide paardebloem, die mij curieus genoeg voorkwam, om er een schetsje van te maken, dat ik u hierbij toezend. Toen de bloem zich



Paardebloem met bandvorming.

gesloten had, kon ik er duidelijk drie knopvormen in onderscheiden, zoodat dit exemplaar een drieling moet zijn. De steel is breed en plat.

H. N. DE FREMERY.

1e Luitenant der Artillerie.

In de jongste aflevering van *De Levende Natuur* vond ik eene afbeelding van een *Ficaria ranunculoides* met twee volkomen bloemen op één stengel. Ofschoon ik vroeger een dergelijke afwijking niet had waargenomen, wilde het toeval, dat ik hedenmiddag (8 Mei) hetzelfde feit constateerde bij een *Taraxacum officinale*, ja zelfs vond ik verscheidene exemplaren op een betrekkelijk kleine oppervlakte, waarvan één zelfs eene vergroeiing van drie bloemen vertoonde. Mijn vraag is nu, of dit bij de gemelde plant veel voorkomt, of dat ik hier voor eene zeldzaamheid sta?

J. L. BULT,

Onderwijzer te Oudehorne.

Er is dit jaar weer zeer veel bandvorming bij paardebloemen op te merken.

T.

Hoe diep gaat een pad?

Mijn tuinman was bezig in het najaar opgepote Margrietten te verplanten; in een dezer kleine potten vond hij onder op den bodem een volwassen pad. Wij mogen gerust aannemen dat deze in het najaar er niet ingestopt is. De wortels waren boven het dier normaal ontwikkeld en vulden het potje, zooals het behoort. Hij moet dus zich spoedig na het oppotten zich daarin gewerkt hebben.

Een andere pad werd bij het verplaatsen eener zware *Acacia* (pseudo) ongeveer een meter diep in den grond gevonden; zelf was ik er niet bij, dus kan de diepte wel overdreven zijn, maar 75 c.M. was het zeker, daar het gat ruim die diepte heeft gehad.

Bussum.

J. POMP.

Gevraagd:

één gladde slang; één ringslang (grootte exemplaren); twee hazelwormen; 2 hagedissen en 2 kleine schildpadden.

L. DE VRIES,

Oldenbarneveldtstraat 93, Amsterdam.

Aangeboden:

Enige prachtige mannelijke en eierdragende vrouwelijke exemplaren van *Lacerta agilis*, duinhagedis; in ruil tegen kleine exemplaren van: muurhagedis, landsalamander (*S. maculosa*) vuurpad, knoflookpad, groene pad, hazelworm, ringslang, gladde slang en heikikker (*R. arvalis*).

Monster b/d Haag.

Dr. J. A. VAN DEN BRINK.