

NAAR HILVERSUM.

Ja, Hilversum met zijn heerlijke bosschen en heiden, dat was het doel van ons uitstapje. Reeds vroeg in den morgen verlieten we de Amstelstad en spoorden, full speed, naar 't oosten. Vanuit den trein hadden we reeds aardige kijkjes op de rietlanden tusschen Weesp en Bussum, maar toen we de heide in 't gezicht kregen, boeide die ons veel meer. De heerlijke heidelucht stroomde het geopende raampje binnen, en gaf ons reeds een voorproefje van hetgeen ons te wachten stond. Eindelijk werden we zelfs ongeduldig en waren blijde dat wij er waren.

We stapten uit en wandelden den kant naar Baarn op, met links den spoorweg en rechts een beukenhaag, waar 't in 't voorjaar wemelde van zweefvliegen en adela's, die er den dauw kwamen drinken.

Na een kwartiertje geloopt te hebben staken we links den spoorweg over, en wandelden de fraaie breede laan in, welk naar Baarn leidt. Natuurlijk was onze eerste gang naar 't plekje met de gevelde boomstammen, waar de roode boschmier in huisde, en het in 't voorjaar kriede van kevers. De stammen bekijkend en sommige onwentelend, vonden we mooie boktorren zooals *Spondylus buprestoides*, *Crioce-*




Leptura rubra ♀, donkerrood.
ongeveer nat. grootte.



Leptura rubra ♂, geelbruin
ongeveer nat. grootte.

phalus rusticus en *Leptura rubrotestacea*, en vooral niet te vergeten de fraaie *Carabus catenulatus*, een groote donkere loopkever met violetten rand die ons in de vingers trachtte te bijten.

Eenige fraaie blauwtjes en vuurvindertjes lokten ons naar een open plekje, begroeid met heide en zandklokjes. Al jagende op deze vlindertjes zochten we verademing onder 't heerlijk koele dennendak, en soms uitgliddend op de gladde laag dennennaalden, doch genietend van de gezonde dennenlucht, wandelden we tusschen de met mos begroeide stammen, tot we terecht kwamen in een uitgestrekt boschje eikenhakhout, we drongen er dwars door heen en zagen hier reeds sporen van de eikenaarvloo



Ephialthes manifestator, ongeveer nat. grootte.

(*Haltica erucae*) namelijk afgegrasde bladeren met larven en een enkel volwassen insect.

Verbazend veel sluipwespen vlogen hier rond, vaak fraai gekleurd, zelfs één met zeer langen legboor, wier larve in boktorlarven leeft, nl. *Ephialthes manifestator*. Ook snaptten we een kakkerlak (*Blatta laponica*) een vlug, aardig diertje.

We besloten nu onzen innerlijken mensch te gaan versterken, we zetten ons daartoe onder een *Rhamnus*-struik neder en deden ons aan 't medegenomene te goed. We keken op onzen struik naar de rupsen van 't Citroentje, doch zagen er geen.

Spijtig gingen we weer aan 't afdwalen, en kwamen op een plekje te land, dat ons ruimschoots schadeloos stelde, zoovol als 't er stond met bramen, zandklokjes (*Campanula*) en distels. Eerst smulden we van de reeds rijpe bramen en keken toen eens naar de bezoekers uit de insectenwereld. We vingden weer verschillende soorten blauwtjes, dikkopjes



Hesperia sylvanus, ongeveer nat. grootte.

(*Hesperia thaumas* en *sylvanus*) en de Aardbeivlinder (*Syrichthys malvae*), ook Citroentjes kwamen ons een bezoek brengen, doch enkel mannetjes, wijfjes schijnen nogal schaarsch te zijn.

Met leedwezen verlieten we ons fraaie plekje, om 't donkere bosch in te gaan, een bosch, waarvan de onderste takken dood waren, verstikt door de bovenste. Niets verstoorde de indrukwekkende stilte dan het gegons der lastige vliegen, die ons geen oogenblik met rust lieten.

We vingden ze soms als 't te erg werd in onze vlinder-netten en verpletterden ze met een gevoel van bevrediging. Onze voetstappen smoorden in de dikke laag dennennaalden en op 't laatst werkte de doodsche stilte zoo beklemmend, dat we blij waren er uit te zijn.

We bevonden ons nu op een zandpad, met links heide en rechts 't bosch, dat we pas verlaten hadden. Op de heide vlogen weer allerlei insecten, groote geel met zwarte roofvliegen (*Asilus crabroniformis*), bijtjes, en de door zijn



Asilus crabroniformis,
ongeveer nat. grootte.



Conops 4-fasciatus,
ongeveer nat. grootte.

levenswijze merkwaardige hommelparasiet *Conops 4-fasciatus* alle druk aan 't honingzuigen. Nu en dan vloog er plotseling een sprinkhaan met blauwe ondervleugels uit de heide op, soms achtervolgd door een zandloopkever. Ook ontmoetten we een flinke ringslang. Wel een rare plaats voor een ringslang, doch misschien was er een poeltje in de

buurt. In de verte zagen we in een dwarslaan fietsrijders, en daaropaanlopend bevonden we ons weldra weer op den weg naar Hilversum. We hielden nog even halt aan een




Cicindela sylvatica,
ongeveer nat. grootte.



Cicindela hybrida,
ongeveer nat. grootte.

plekje vol met geveldde boomen, waar een bordje stond met Art. 461 enz.



Ocnaria monacha ♀.



Ocnaria monacha ♂,
iets verkleind.

We keken echter maar zoo nauw niet en zochten op en onder de boomstammen met een goed resultaat.

We vonden er namelijk verscheidene exemplaren van *Spondylus buprestoides*, ook kwam er één aanvliegen, een tamelijk zeldzame loopkever (*Abax ater*) en een dito houtwesp een soort *Sirex*. Het was nu vrij laat geworden, en daar we tijdig aan 't station wilden zijn stapten we stevig door, doch namen in 't voorbijloopen een paartje nonnetjes (*Psilura monacha*) mede, welke tegen een boomstam zaten.

Troepen wandelaars kondigden aan, dat we Hilversum weer naderden en weldra waren we aan 't station gearriveerd, tot hiertoe uitgeleide gedaan door de akelige vliegen, alsof ze ons weggejaagd hadden.

S. LEEFMANS.




Chrysotoxum intermedium, ongeveer nat. grootte.
Zweefvlieg op de heide.



UIT ONS DAGBOEK.

1900.

- 8 April. Mooi weer, wandeling naar „Het Kalfje.” In tuinen bloeien Crocussen in alle kleuren, sneeuwkllokjes hebben zoo goed als gedaan. Op vette klei bloeit Hoefblad prachtig; geheele bossen van fijne goudgele bloempjes op vliezige steelen. Langs een sloot groeit lidsteng (*Hippuris vulgaris* (L)). Verscheidene leeuweriken zingen; het is een onophoudelijk gejubel hoog in de lucht; terwijl men de zangers alleen dan ziet, wanneer ze uit het gras omhoog stijgen.
- 14 April. Met het vischnet naar Diemen. Veel Salamanders en groote spinnende waterkevers gevangen, ook nog



een buitenkansje n.l. *Ranatra linearis* of Staartwants, een smal dier met lange pooten, en zeer traag in de bewegingen. In den tuin worden Crocussen bestoven door aardhommels.


- 18 April. Prachtig weer. In de Watergraafsmeer vliegen eenige kleine vossen. Allerlei „onkruid” bloeit: doove-netel, paardbloem en hondsdrif met groote blauwe en paarse bloemen. *Viola Canina* heeft bloemknoppen. Veel hommels bestuiven de bloemen. In het aquarium pronken de Salamanders. In de schemering vliegen veel vlermuizen in paren, al spelende zooals dagvlinders het dikwijls doen.

- 21 April. Aan den Amsteldijk bloeien in 't wild albino's van het Maartsche viooltje. Thuis iets aardigs ontdekt. Op de vensterbank staan eenige potten met klimop, dat zeer veel van bladluizen te lijden heeft. Elk jaar komen de diertjes weer terug en vooral in de bladoksels zijn zij in heele kolonies gevestigd. Allerlei middelen zijn reeds beproefd, doch niets heeft gebaat, maar vandaag heeft


moeder natuur een middel aangegeven, dat beter schijnt te helpen. Op de klimop op de vensterbank en tegen het raam krioelt het nu van tweestippige Lieveheersbeestjes, die ijverig jacht maken op de bladluizen. Alweer een aardig voorbeeld hoe zelfs in de huiskamer het evenwicht in de Natuur gehandhaafd wordt!

1901.

- 3 April. Speenkruid heeft nauwelijks nog bloemknoppen. Tep bloeit. In tuinen staan de crocussen en narcissen



Geelgerand
Waterzofter.



Ruggerwemmer