

keel gebeten, die dan als souvenir meestal weken lang een kropgezwel meedragen, doch zelden aan de gevolgen sterven. Welk geneesmiddel de herder aanwendt weet ik niet zeker. (Ik meen, dat hij de kleine wonde met een mes vergroot en verder inwrijft met tabaksap, maar of 't waar is...???)

Hopende, u met deze korte inlichtingen van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

Epe, o. d. Veluwe, 5/4 '03.

J. STEL EZN.,

Onderwijzer.

Arnhem.

Waarde Redacteuren. Hoe veel gelezen *D. L. N.* tegenwoordig ook is, 't zou kunnen zijn, dat uw artikel over De Adder niet ter kennis kwam van een der personen, die getuigen waren van het geval van een adderbeet, dat geruimen tijd geleden, meer dan 10 jaren meen ik, aan de Westerbouwing zich heeft voorgedaan. Het weinige, wat ik er van gewaar werd, zal ik u zeggen. Wil u er meer van weten, dan kunt u zich wenden tot den heer Baudet, instituteur te Arnhem, Rijnkade. Een van diens leerlingen greep, bij het afdalen van de Westerbouwing door het struikgewas, zooals hij meende een slang, stopte haar in zijn zakdoek en ging toen verder naar de aanlegplaats van de boot. Eensklaps werd hij gebeten. De kameraden wisten natuurlijk allerlei raad en daaronder goeden raad. Ze bonden de wond met zakdoeken af; op de boot was cognac, dat hem door den heer Baudet werd toegediend. Bij aankomst te Arnhem werd hij aanstonds naar een der ziekenhuizen gebracht, waar Renssen en Wartmann (de laatste woont thans niet meer te A.) gelukkig aanwezig waren. Dr. Wartmann kende het reptiel, dat de jongens hadden meegenomen, het was een zeer vergiftige adder. De patient was er zoo naar aan toe, dat hem de sacramenten werden toegediend; toch is hij er nog boven gekomen. Hij moest steeds cognac gebruiken. Hoe de wond is behandeld, weet ik niet. De naam van den jongen is mij ook niet bekend, maar Baudet zal u natuurlijk alles kunnen zeggen en dat ook ongetwijfeld gaarne willen doen. Over het voorkomen in die streek van boschmieren en egels weet ik niets. Daar u zelf meen ik, de Westerbouwing kent, zult u dat trouwens beter weten dan ik.

Ede, 7 April 1903.

TITIA VAN DER TUUK.

Hoogeveen.

In beleefd antwoord op uwe vraag betreffende het zelf aantreffen van adders het volgende:

Eens (1883) vond ik een jong exemplaar een uurtje benoorden Hoogeveen; een tweede exemplaar ving ik tusschen het station Veenendaal en Lunteren in 1885, een derde werd mij in 1886 gebracht door een jongen, die het dier bij een bakker onder takkebossen had gevangen (ergens in Wageningen). Hij had het dier bij den staart en had er zeker een half uur mee rondgelopen zonder te weten, dat het vergiftig was. Of er in de onmiddellijke nabijheid boschmieren, gladde slangen of egels voorkwamen, weet ik niet.

Hoogachtend,

Deventer, 4/4 '03.

J. D. KOBUS.

Enschede.

De heer Bolink deelde mij mede dat op de school C alhier een adder is, voor eenige jaren hier in het Aamsveen gevangen. Bijzonderheden van roode mieren en egels kan ik niet mededeelen, wel dat de laatste hier vrij veel zijn, de eerste daarentegen zijn, meen ik, alleen in het Bruninkbosch te Broekkeume (ten Z. van Enschedé). In de gisteren gehouden vergadering der afd. Twenthe der N. N. V. deelde de heer J. H. Fuelink te Dulder, gem. Weerseloo, mede, dat hij vele jaren geleden een adder had gezien, op olie bewaard, en bij Vrieveveen gevangen. Deze olie moest goed zijn voor brandwonden, hetgeen hij natuurlijk niet voor zeker durfde verklaren.

Ringslangen zijn wel in het Aamsveen gevangen, en ook hazelwormen komen hier, hoewel sporadisch, voor.

Hopende, dat dit welkom is,

Hoogachtend,

\* Enschedé, 6/4 '03.

M. J. BLIJDENSTEIN.

(Wordt vervolgd.)

## Vragen en Korte Mededeelingen.

### Vroege vogels.

5 April vond ik te Overveen reeds een zanglijster met jongen.

12 April waren hier de boerenzwaluwen terug.

Haarlem.

A. TRAANBERG.

### De zeldzame Geelster.

Misschien stelt u er prijs op te weten, dat mijn broer en ik Zondag 5 April, in een bosch ± 1 uur van Enschede, hebben gevonden, *goudveil* en *geelster* en van deze laatste nog wel de zeldzaamste soort, die tot nu toe alleen bij Denekamp is gevonden n.l. *Gagea spathacea*.

Vergissing is niet mogelijk, want voor een 14 dagen heb ik ze ook in Denekamp zien bloeien.

Enschede.

B. H. BOLINK.

### Rotterdamsche Natuurhistorische Club.

Vergadering Dinsdag 24 Februari, in de Diergaarde.

Nadat de vergadering door den voorzitter, den heer Haverhorst, geopend was, laat de heer Lindemans rondgaan eenige vlinders uit het geslacht *Ophideres* Bois: n.l. *O. fullonica* (Indië) en *Adris* (Ohid.), *Syrannus* (Japan), en deelt mede, dat volgens Künkel bij dit geslacht de zuiger veranderd is in een stijf boorwerktuig, waarmee schade aan vruchten veroorzaakt wordt. Zoo richt *O. fullonica* verwoestingen aan in plantages van oranjeboomen, door de vruchten met talrijke gaatjes te doorboren, zoodat deze sterven en afvallen. De zuiger eindigt in een scherpe, driehoekige spits, voorzien van weerhaakjes; iets verderop zwellen deze aan en vertoonen drie gedeelten van een schroefdraad, ter weerszijden en van boven met korte doorntjes, die in een ondiepe groeve zijn geplaatst. Deze doorntjes doen dienst als een rasp.

Tegelijkertijd laat spreker rondgaan een fraai ♂ exemplaar van *Ornithoptera Brookeana* van Borneo.

De heer De Koning geeft nu een overzicht van de orden, waarin *Infusorien* verdeeld worden, met de voornaamste kenmerken der orden:

- I. *Holotricha*. Mond zonder bijzonderen vorm van wimpers.
- II. *Heterotricha*. De toegang tot den mond aangegeven door wimpers. Lichaam gelijkmatig bewimperd.
- III. *Oligotricha*. Spiraal, bijna cirkelvormig, loodrecht op de lengte-as. Lichaam geheel of bijna geheel onbewimperd.
- IV. *Hypotricha*. Adorale wimpers als bij II. Alleen aan de buikzijde wimpers of griffels. Lichaam sterk afgeplat.
- V. *Peritricha*. Adorale wimpers als bij III, doch tegengesteld (rechts) gewonden. Lichaam naakt of met wimpers aan het achtereind (cirkelvormig). Kern hoefijzer- of worstvormig.

De *Peritricha* zijn verdeeld als volgt:

- a. *Vorticella*. Gesteeld, samentrekbaar, vormen geen kolonie, zonder hulsels.
- b. *Carchesium*. Gesteeld, samentrekbaar, kolonievormend, zonder hulsels.
- c. *Opercularia*. Gesteeld, niet samentrekbaar, kolonievormend, mondopening klein.
- d. *Epistylis*. Als c; mondopening breed.
- e. *Rhabdostylis*. Zeer kort gesteld, niet samentrekbaar, niet kolonievormend, geen hulsels.
- f. *Cothurnia*. Ongesteeld, in doorschijnende bekervormige hulsels.
- g. *Vaginicola*. Als f. Het omhulsel is volgens de lengte as aan het voorwerp vastgegroeid.

Spreker laat door hem vervaardigde teekeningen zien van vertegenwoordigers der verschillende orden en onderorden, en toont onder het microscoop door hem gevonden levende *Vorticella*'s, die zeer fraai hun vermogen tot het samentrekken der steel vertoonen.

De heer Haverhorst laat een doosje rondgaan met eenige fraaie Javaansche *Heterocera*, waaronder *Crinodes Vethi* Snell, *Saturnia kathinka* West. e. a., benevens een curieus voorwerp van een kunstmatig gekleurde vlinder. Verder deelt hij den uitslag mede eener kweeking van *Agrotis xanthographa* W. V., waaruit blijkt, dat de meening in sommige boeken over vlinders gevonden, als zou verstoring der rups gedurende den tijd, dat zij haar verandering