

alleen aan den binnenkant zouden de korrels door een kleverige plek tegengehouden worden: het stuifmeel uit de hokjes kan dus nooit op den stempel van *dezelfde* bloem worden gebracht. Bezoekt nu daarentegen het dier een andere bloem van deze soort, „dan likt (schreef de heer Heimans in zijn opstel) om zoo te zeggen de stempelslip het stuifmeel er weer af en slikt het in.”

Uit rechtstreeksche proeven, door Darwin en anderen genomen (zie bijv. de boekjes van dr. Calkoen, „De bloem en hare geheimen”, en van prof. Hugo de Vries, „Het leven der bloem”) weet men dat zulk een kruising voordeeler voor de plant is, dan andere vormen van bestuiving.

Rotterdam.

C. EDSTON.

Vervormde Anemonen.

Als antwoord op de vraag van J. B. Bernink: „Komt het meer voor?” deel ik mede, dat ik in de Paaschvacantie van 1900 in de buurt van Heerlen (Limburg) een tiental vervormde anemonen gevonden heb. De kleur der ingesneden bloemdekbladen was bij twee exemplaren groenachtig, bij de andere normaal. In de Paaschvacantie van 1901 bleiden op dezelfde plaats weer vele anemonen maar toen heb ik geen vervormde exemplaren kunnen vinden.

Rotterdam.

C. J. PEKELHARING.

Indische Vlinders.

Ik heb een vriend in Indië, die in de gelegenheid is, de prachtigste Indische vlindersoorten te verzamelen, sommige met ruim 2 d.M. vlucht. Weet u misschien iemand, die een dergelijke verzameling zou willen kopen? Of die misschien voor bepaalde soorten iets over heeft?

Harlingen.

E. ZWANENBURG.

Gij schreeft mij in de *L. N.* dat schoon water voor niets en voor niemand voedsel is, doch ik kan u berichten dat een vriend van mij een meeraal heeft, die al $\frac{3}{4}$ jaar *alleen* op pompwater leeft, ofschoon 't diertje erg dun is. Zelf heb ik er twee, die al ongeveer $\frac{1}{4}$ jaar op slootwater leven.

Cothen (U)

JOHS. DE KRUYF.

Vervormde anemonen.

Naar aanleiding van den vondst van een pelorische bloem van *Anemone nemerosa*, deel ik u mede, die ook bij Wageningen een jaar of drie geleden herhaalde malen gevonden te hebben. Later er nog eens naar zoekende, kon ik ze niet meer vinden. Soms was maar één bloemblad, soms meerdere overgegaan in gewone bladeren.

Wageningen.

P. CALAND.

Hagedis met twee staarten.

Zeker stelt u er belang in te weten, dat ik hedenmiddag in de duinen een vijfshagedis ving met twee staarten. De 2e staart steekt ongeveer op de helft van den eerste schuin naar boven en is \pm 3 c.M. lang.

A. A. v. HEURN.

Misschien weet u al dat dergelijke verdubbeling bij reptielen meestal een gevolg is van regeneratie bij verwonding; zelden is het dier met de afwijking geboren. H.

Van een zwarte mees?

In het mos, op den grond, vonden we wel eens een nestje, waarop een kapje, dat dichtviel als het vogeltje er af vloog. De eitjes waren wit, met bruine, ronde spikkeltjes. Vindplaats een bosch. Gaarne wenschte ik naam en zoo mogelijk nadere inlichtingen omtrent dat vogeltje.

JOH. VIJVERBERG.

Neen, dit is zeer zeker het nest van den fluitcr. Zie „In het Bosch,” daar is de vogel geteekend. T.

P.S. Als een curiositeit m.i. kan ik mededeelen, dat ik op 10 April van Haarlem naar Leiden rijdende, in den spoorloot al een wilde eend met jongen zag. Rekent men een maand voor het broeden en een verloop van 12 dagen van het leggen van het eerste tot het laatste ei, dan heeft dus die eend reeds in de eerste dagen van Februari het eerste ei gelegd.

Verleden jaar vond een mijner vrienden in één nest eendeneieren en fazanteneieren en naar vorm en kleur te rekenen nog wel van twee verschillende fazanten. Is UED. dienaangaande ook iets bekend van tureluurs, daar ik eens een nest met 6 eieren vond, waar 4 eieren bij de moerasvogels als regel als grensgetal voorkomt.

Haarlem.

J. VIJVERBERG.

Lag uw tureluursnest in een bewoonde of als jachtterrein goed verzorgde streek, dan kan een menschenhand het eieren-aantal vergroot hebben; evengoed als de collectie in 't andere nest op een menschelijke proefneming wijst. Ook van Mej. v. Schermbek te Breda ontvingen wij een teekening van een nest met een heele verzameling verschillende eieren. H.

Weidebloem.

In antwoord op een vraag van den heer G. J. Riewer, Steenstraat 65, Arnhem, diene dat *weidebloem* = *Bellis perennis* = fennebloem, grasbloem, koeiebloem, kransje, landjebloem, liefkruid, maagdelief, madeliefje, meliefje, margriet, meizoentje, meizoetje, schapebloem.

Arnhem, Boulevard 85.

OUDEMANS.

A. G. te St. Annaland. Uw tulp, die bloemen in de bladoksels voortbrengt is de eenige niet. In D. L. N. is het geval al vaker vermeld; toch blijft het buitengewoon. Ik heb indertijd een dergelijke tulp, die mij als curiositeit gezonden werd, zorgvuldig uitgeplant en in 't volgend jaar vertoonde de excentrieke plant twee bloemen aan den topstengel maar geen okselbloemen. H.

D. Th. H.; C. D. en Joh. L. den Helder. Een drievluchtvalk is de verhollandsching van het woord tiercel, waarmee in de valkerij bedoeld wordt het mannetje van den slechtvalk in volwassen kled (2e of 3e jaar).

De *Ammophila*, die geen rupsen maar spinnen doodt, is waarschijnlijk toch wel *Ammophila hirsuta*. T.

Dat uw stekelbaarsje een nest maakte in een stopflesch is stellig een buitengewoon geval. Jammer, dat het wijfje stierf, geef hem een ander, misschien begint de nestbouw opnieuw, al is 't wat laat in den tijd.

Uw opstelletje is wel wat zwak, maar misschien krijgt het nog wel een plaatsje, anders moet u maar weer een ander sturen. H.

J. P. J. de J., Hilversum. Uw kevers zijn Junikevers (net miniatuur-Meikevers met groenbrons borstchild). Het eenige middel er tegen is alle wegvangen, maar als u dit antwoord leest, zijn ze alle al „vanzelf” verdwenen; de larven leven in den grond. H.

C. B. te Meerkerk. Uw paddestoel was een *Polyporus squamosus*, wel een groot exemplaar, maar nog niet reusachtig in zijn soort. U zult er nog wel groter vinden. H.

A. W. Uw Orchis was noch *O. mascula* noch *O. maculata*, maar Orchis morio, de harlekijnsorchis. De beide ronde knollen hadden u dadelijk op weg moeten helpen. H.

Dr. P. te Grouw. Uw plantje is toch niet anders dan *Viola canina*. H.

P. L. Alblasterdam. Uw boterbloem met dubbele bloem en blad en daarbij sterke bandvorming is goed opgeborgen, het is een aardig ex. voor de collectie. H.

N. v. d. M. ter Neuzen. Aquariumvischjes voedert u het best met kleine wormpjes, stukjes eiwit of geraspt vleesch en versche miereneieren. Het gevraagde boekje moet nog geschreven worden. H.

W. v. d. M. Apeldoorn. Uw hagedis zal als 't geen alpen-salamander was, een kleine hagedis (*Lacerta vivipara*) geweest zijn. H.

R. C. v. d. L., Den Haag. Uw plant is zeer waarschijnlijk *Bartonia aurea*, een vroeger veel gekweekte sierplant. H.

T. C., Bussum en M. K., Nijmegen. 't Is een goudgele *Rhamnus-zwam*. H.

Te koop aangeboden:

Jaargang VII van de *Levende Natuur*.

Helder, Hoogstraat 43.

C. KIKKERT.