

## VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

**Nieuwe plantensoorten en variëteiten gevonden in Nederland in 1917.** — In deze lijst zijn de volgende verkortingen gebruikt: H. voor J. Th. Henrard te 's Gravenhage; J. voor P. Jansen te Amsterdam; K. voor A. W. Kloos Jr. te Dordrecht; Si. voor C. Sipkes te Haarlem; Sl. voor Jan G. Sloff te Rotterdam en W. voor W. H. Wachter te Rotterdam.

*Carex fulva* var. *discolor* Vollmann. Alblasserwaard (K.). Ook in 1916, daar algemener dan het type.

*Scirpus americanus* var. *monostachys* Marss. Nunspeet (J.), Harderwijk (K.).

*Scirpus sylvaticus* fm. *dianthelus*. Oisterwijk (Sl. en W.).

*Festuca geniculata* Cav. Deventer (H.).

*Bromus macrostachys* var. *Danthoniae* Trin. Amsterdam (J.).

*Elodea canadensis* var. *latifolia* Casp. fm. *repens* Sanio. Soesterberg (Sl.).

*Rumex bucephalophorus* L. Rotterdam (K.).

*Chenopodium Berlandieri* Moq. Wormerveer (H.).

*Amarantus lividus oleraceus* Thell. Zijdrecht (K.).

*Silene stricta* L. Amsterdam (1909) (H.).

*Silene nocturna* L. *pauciflora* Otth. (S. *permixta* Jord.). Amsterdam (1909) (H.).

*Silene antirrhina* L. Amsterdam (1909), Gorinchem (1912) (H.).

*Viscaria vulgaris* Roehl. Heerenveen (Oranjewoud) in een aardappelveld (J. H. en J. A. Overdiep).

*Boreava orientalis* Jaub. et Spach. Weert (Ver Straeten).

*Reseda Phyteuma* L. Deventer (H., K. en Offerijns).

*Euphorbia rythisperma* Engler, komt in plaats van *E. serpyllifolia* (zie Verslag XXI p. 437) (K.).

*Oenothera argentinæ* Leveillé et Thell. Wormerveer (1912, 1913, 1914, 1916) (K.).

Indertijd opgegeven als *O. rosea*, later als *O. laciniata* var. *integritifolia*.

*Melilotus messanensis* All. Amsterdam (1909) (G. H. Zandvoort).

*Ornithopus compressus* L. Rotterdam (K.).

*Ligustrum vulgare* B. Ebbingense Stomps. Zandvoort (Si.).

*Anchusa variegata* L. Gorinchem (H.).

*Verbascum pulverulentum* Sm. Weert (1914) (Ver Straeten).

*Mimulus Langsdorffii* Don. Arnhem (1916) (Mej. J. Weghuis).

*Veronica urticifolia* Jacq. Valkenburg (1914) (J. L. van Soest).

*Mentha tomentosa* d'Urville. Arnhem (1909) (H.).

*Achillea Ptarmica angustissima* Heimerl. Meppel—Steenwijk (Exc. der Ned. Bot. Ver.).

*Achillea micrantha* Bieb. Arnhem (H.).

*Centaurea diluta* Ait. Gorinchem (H.).

*Centaurea Scabiosa* subspec. *badensis* Gugl. Amsterdam (1909) (H.).

H. HEUKELS.

**Nieuwe vindplaatsen in Nederland van zeldzame plantensoorten in 1917.** — Verkortingen in deze lijst dezelfde als in de vorige.

*Scilla bifolia*. Middelburg (Si.).

*Arum maculatum* var. *immaculatum*. Velsen (Breesaap) (Si.).

*Potamogeton natans* fm. *terrester*. Terheyden (N. Br.), Soesterberg, Oisterwijk (Sl.).

*Carex extensa*. Goeree (R. Breur en K.).

*Cyperus vegetus*. Middelburg (1916) (G. J. Evers).

*Scirpus multicaulis* m. *vivipara*. Galdersche heide (Ginneken), Valkenburgsche heide (Gilse) (Sl.).

*Eriophorum polystachyum* var. *dianthelus* Kloos. Oisterwijk (Sl.), Bavel'sche heide (K.).

*Phalaris paradoxa* var. *intermedia* Coss. et Dur. Rotterdam (K.).

*Panicum capillare*. Schiedam (J. D. Dorgelo).

*Setaria viridis reclinatum* m. *glomeratum*. Teteringen (K., Lako, Sl., Vuijk).

*Agrostis scabra*. Rotterdam (K.).

*Aira praecox laevis*. Havelte—Uffelterveen (Exc. der Ned. Bot. Ver.).

*Avena sterilis*. Eperheide (Z. L.). (J. D. Dorgelo). Amsterdam (J.).

*Briza maxima*. Rotterdam (K.).

*Spartina stricta*. Flakkee (K.).

*Brachypodium distachyon*. Rotterdam (K.).

*Bromus unioloides pubescens* Hack. Deventer (K.).

*Hordeum jubatum*. Leeuwen bij Tiel (K., Schuijt, Sl.).