

12. *Cosmarium subcrenatum* Hantzsch, gevonden in sprank G en H, in typische vorm en maat. Heimans vindt gewoonlijk vormen, die moeilijker van *subcostatum* te onderscheiden zijn, abnormaal is de extra dikke gezwollen celwand.

13. *Cosmarium subexcavatum* var. *ord.natum* W. en G. S. West, gevonden in sprank G. In bovengenoemd plasje bij Kijkduin vond ik ook dezen vorm, terwijl Heimans haar eveneens heeft gevonden o.a. bij Oisterwijk (zie fig. 7).

14. *Staurastrum punctulatum* Bréb. In groote hoeveelheid gevonden in een plasje op de Waalsdorpsche vlakte.

15. *Staurastrum punctulatum* var. *subproductum* W. en G. S. West, gevonden in sprank G.

16. *Cylindrocystis minutissima* Turn., gevonden in sprank G. Volgens Heimans wel heel wat grooter dan normaal, n.l. 16×8 , zelfs $17 \times 9 \mu$.

Van deze Desmidiaceeën komen *Closterium acerosum*, *Cl. Leibleinii*, *Cosmarium botrytis* en *Cosm. biretum* ook in het gebied vlak achter de duinen voor. De overige zijn verspreid en algemeen voorkomende vormen; *Closterium punctatum*, *Cosmarium subexcavatum* var. *ordinatum*, *Cosm. holmiense* var. *integrum* en *Cosm. speciosum* var. *simplex* maken hierop een uitzondering. Wellicht zijn er soorten bij die op den trek door vogels in den vorm van sporen naar hier werden overgebracht. Een klein plekje water in het zoo bij uitstek droge gebied is een plaats, waar zeer zeker vele vogels komen drinken of baden.

's Gravenhage.

J. F. OBBES.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

Adres der Redactie. — Met heden te beginnen is het adres der Redactie: J. Heimans, Beethovenstraat 18, Amsterdam (Z.). De heer Thijsse vertoeft tot het midden van het volgend jaar in Indië.

Paris quadrifolia L., de Eenbes in Drente! — In het zelfde boschje, waarin *Polygonatum verticillatum* groeit ¹⁾, zag ik 29 Juli j.l., terwijl ik met den heer C. O. van Regteren Altena kleine landslakjes zocht tusschen en op de natte, dorre bladeren en takjes, opeens een klein aantal exemplaren van de éénbes, *Paris quadrifolia* L., tusschen *Polygonatum multiflorum* staan. Ze stonden onder hulst en eik; ook *Rhamnus frangula*, *Alnus glutinosa* en *Populus tremula* stonden in de buurt. Slechts één exemplaar droeg een rijpe bes. Het is typisch, dat hier dus een heel gezelschap van ná-verwante Liliaceeën blijkt voor te komen, n.l.: *Convallaria majalis*, *Majanthemum bifolium*, *Polygonatum multiflorum*, *Polygonatum verticillatum* en *Paris quadrifolia*, — met daarbij de massavegetatie van *Trientalis europaea*!

In m'n artikel over *Polygonatum verticillatum* ¹⁾ vergat ik te vermelden, dat deze soort in 1921 ook door den heer A. W. Kockelmans te Houthum (Z.L.) werd aangetroffen ²⁾.

Verder zou onder de boschplanten van het Drentsche gebied nog te noemen zijn: *Gagea lutea* Schult., de boschgeelster, van Midlaren. W. BEIJERINCK.

Drente wordt met den dag belangrijker. Laat ons toch alle zeilen bijzetten, om op waardige en voor altijd doeltreffende manier ervan te behouden, wat nog te behouden is. En vooral, nog scherper onderzoek! JAC. P. THUISSE.

¹⁾ Zie „De Levende Natuur“, Jrg. 35, 1930, afl. 4. ²⁾ Zie „De Levende Natuur“, Jrg. 26, 1922, pag. 346.