


- Scolymus maculatus L.* H<sub>2</sub>. (h)  
 \**Hedypnois polymorpha D. C. var. pendula Batt. et Trab.* H<sub>2</sub>. (h)  
*Rhagadiolus stellatus Gaertn.* H<sub>2</sub>. (h)  
 Dordrecht.

Ir. A. W. KLOOS Jr.




## NIEUWE PLANTENSOORTEN EN VARIËTEITEN GEVONDEN IN NEDERLAND IN 1938.

In deze lijst en de volgende zijn de Tilburgse en Helmondse wol-adventieven niet opgenomen, daar deze in de hierboven gegeven lijst reeds staan. Wij gebruiken hier de verkortingen: (K.) voor J. Kern te Vlaardingen, (Kl.) voor A. W. Kloos Jr. te Dordrecht, (B.R.) en (Th.R.) resp. voor B. Reichgelt en Th. Reichgelt beide te Nijmegen, (R.R.) voor de gebroeders Reichgelt, (P.) voor J. Prins te Amsterdam (S.) voor Ir. J. L. van Soest te 's Gravenhage en (Un.) voor excursie v. d. Ned. Bot. Ver. Planten waarvan de determinatie nog niet gelukt of nog niet geheel zeker is, zijn met een (?) aangegeven.

- Galanthus nivalis f. lutescens Baker* te Kornjum (Ir. A. N. Koopmans).  
 × *Juncus pratensis Hoppe* = *J. acutiflorus* × *articulatus* te Nieuwkuik (Joh. Jansen en W. v. d. Kloot).  
*Cyperus c.f. ochraceus Vahl* te Nijmegen (R.R.).  
*Paspalum distichum L.* te Nijmegen (R.R.) te Veghel (R.R.).  
*Piptochaetium tuberculatum Desv.* te Nijmegen (R.R.).  
*Lamarckia aurea Mnch.* te Rotterdam (K.).  
*Eragrostis capillaris (L.) Nees.* (?) te Nijmegen (K. R. R.).  
*Sporobolus neglectus Nash.* te Nijmegen (K.R.R.).  
*Sclerochloa dura (L.) P.B.* te Erp (R.R.).  
*Kochia sp.* (?) te Deventer (Joh. Jansen en Kl.).  
*Sisymbrium Sophia* var. *persicum* (*Schrad.*) *Petri* te Erp (R.R.).  
*Trigonella polycerata L.* te Erp (R.R.).  
*Trigonella c.f. corniculata L.* (?) te Erp (R.R.).  
*Trifolium nigrescens Viv.* te Erp (R.R.).  
*Scandix australis (L.)* te Erp (R.R.).  
*Scandix iberica (L.)* te Nijmegen 1924 (Th.R.), te Erp (R.R.).  
*Solanum triflorum Nutt.* met ongedeelde bladen (?) te Nijmegen (R. R.).  
*Verbesina encelioides (Car.) Benth. et Hook.* te Nijmegen (K.R.R.).  
*Parthenium Hysterocephorus L.* te Nijmegen (K.R.R.).  
*Gnaphalium siloticum* var. *depressa* te Borger (Un.).  
*Chrysanthemum segetum f. discoidea* te Erp (Kl.).  
*Centaurea triumfetti All.* te Erp (R.R.).  
*Taraxacum obliquum Fr.* Kalkduingebied (S.).  
*Taraxacum obliquum Fr.* var. *platyglossum Raunk.* te Wassenaar 1926 (S.).  
*Taraxacum tortilobum Florström* algemeen in zandstreken (S.).  
*Taraxacum dissimile D.* Zeeduin te Wassenaar sedert 1928 (S.).  
*Taraxacum laetum D.* Kalkduinen den Haag en Wassenaar sedert 1915 (Kl.) (S.).  
*Taraxacum rubicundum D.* Kalkduingebied en Krijtgebied in Z. Limburg (S.).  
*Taraxacum lacistophyllum D.* Wassenaar S., Wieringen 1856 (v. d. Sande Lacoste), Koegras 1933 (S.).  
*Taraxacum tenuilobum D.* te Scheveningen 1922 (S.).

## NIEUWE PLANTENSOORTEN



377

*Taraxacum brachyglossum* D. te Waalsdorp 1937 (S.).*Taraxacum commutatum* D. te Wassenaar sedert 1928 (S.).

Ir. A. W. KLOOS Jr., Dordrecht.

W. H. WACHTER, Rotterdam.

## NIEUWE VINDPLAATSEN IN NEDERLAND VAN ZELDZAME PLANTENSOORTEN IN 1938.

*Cyperus flavus* te Nijmegen (K.R.R.).*Carex ligerica* te Rheden (P.).*Carex Schreberi* bij de Grebbeberg (P.).*Carex Reichenbachii* te Arcen (Joh. Jansen en W. v. d. Kloot), te Weert 1932 (W. v. Dijk) vroeger opgegeven als *C. brizoides* en te Wassenaar 1936 (Prof. Siertsema) id.*Carex vulgaris juncea* te Wormen (S.).*Phalaris paradoxa intermedia* te Erp (R.R.).*Phalaris paradoxa praemorsa* te Nijmegen (R.R.).*Beckmannia eruciformis* te Nijmegen (R.R.).*Eleusine tristachya* te Nijmegen (K.R.R.) en Vriezenveen (H. Sijtstra).*Phleum graecum* te Erp (R.R.).*Sporobolus cryptandrus* te Nijmegen (K.R.R.).*Agrostis scabra* te Nijmegen (K.R.R.).*Gaudinia fragilis* op Rozenburg (Prof. de Jongh en Prof. Siertsema).*Diplachne uninervia* te Nijmegen (K.R.R.).*Cynosurus echinatus* te Wassenaar (S.) te Loosduinen (W. Vervoort), te Rheden (P.) en te Oud Leusden (P.).*Poa trivialis glomerata* te Dordrecht (Kl.).*Bromus lepidus* te Veghel (Kl.).*Hordeum maritimum Gussoneanum* te Erp (Kl.).*Rumex salicifolius* te Vlaardingen (K.).*Rumex dentatus* te Nijmegen (B.R.).*Amaranthus angustifolius graecizans* te 's-Hertogenbosch (Kl.), te Veghel (R.R.).*Chenopodium acuminatum* te 's-Hertogenbosch (Kl.) (P.).*Monolepis trifida* te Erp (R.R.).*Montia fontana rivularis* te Eeklo (Un.).*Stellaria media neglecta* te Wychen (Joh. Jansen).*Gypsophila porrigens* te Erp (R.R.).*× Melandrium dubium* te Loosduinen (S.).*Fumaria muralis* te Katwijk (N.Br.) (Prof. Siertsema).*Roripa austriaca* te Erp 1937 (Th. R.).*× Roripa erythrocaulis* te Pernis (K.).*Sisymbrium Irio* te Leiden (W. Vervoort), te Nijmegen (R.R.).*Sisymbrium orientale iroides* te Hilversum (Dr. G. Kruseman en Dr. A. Reclaire).*Sisymbrium multifidum brachycarpon* te 's-Hertogenbosch (P.) (v. Giersbergen), te Veghel (K.R.R.).*Eruca sativa* te Erp (R.R.).*Hirschfeldia incana* te Veghel (Kl.).*Lepidium perfoliatum* te Erp (Kl.), te 's-Hertogenbosch (v. Giersbergen).*Camelina microcarpa* te 's-Hertogenbosch (v. Giersbergen).*Alyssum maritimum* te Overveen (Prof. Siertsema).