

C. australis heeft stompe kroonslippen en korte, diep tweedelige kroonschubben met weinig wimpers; *C. campestris* daarentegen heeft spitse kroonslippen en langere, eironde, niet gedeelde kroonschubben met meer wimpers. De soort hoort thuis in Midden-, Zuid- en Oost-Azië, het Maleise gebied en Australië.

Gilia multicaulis Benth. var. *peduncularis* (Eastw.) Jepson; N.O.-polder, zandafgraving bij De Voorst (J. Diender).

Deze variëteit is evenals de typische vorm van de soort afkomstig uit Californië. Enige soorten van *Gilia* worden bij ons als sierplant gekweekt. *G. multicaulis* wordt echter voor zover ons bekend niet in de Nederlandse tuinbouw-litteratuur vermeld; zij is dus waarschijnlijk als adventief te beschouwen.

Phacelia campanularia A. Gray; Bommelerwaard, tussen Gameren en Kerkwijk (H. Mooi en A. Westera).

Evenals de vorige soort is deze afkomstig

uit Californië. Zij werd aangetroffen als onkruid in een akker met voor bijenvoer gekweekte *Phacelia tanacetifolia* Benth. *Cynoglossum amabile* Stapf et Drummond; Haarlem, op aardappelakker, 1942 (Dr. J. Brand).

Deze uit Tibet en China afkomstige soort wordt bij ons wel eens als sierplant in tuinen gekweekt.

Verbascum nigrum L. var. *gymnostemon* Rchb.; Ottersum, Limb., in de buurtschap Zelder (R. Tolman).

De variëteit verschilt van typische exemplaren der soort door het ontbreken van de wollige beharing der helmraden.

Potamogeton × *decipiens* Nolte ex Koch (waarsch. *P. lucens* L. × *P. praelongus* Wulf.); Leekster Meer, 1955 (E. W. Clason).

Een plant, die in de Z.O.-hoek van het Leekster Meer werd aangetroffen, wordt door de vinder als deze bastaard beschouwd.

NIEUWE VONDSTEN VAN ZELDZAME PLANTEN IN NEDERLAND IN 1956

S. J. VAN OOSTSTROOM en TH. J. REICHGELT.

(Rijksherbarium, Leiden)

Deze lijst bevat behalve opgaven uit 1956, waarbij hieronder geen jaar is vermeld, ook een aantal oudere vondsten, die voor de kennis van de Nederlandse flora van belang zijn. Een belangrijk deel hiervan troffen wij aan in het herbarium van de heer N. P. W. Balke te Rotterdam, dat onlangs door deze aan het Rijksherbarium werd geschonken.

Evenals voorheen houden wij ons ook nu weer aanbevolen voor toezending van materiaal en voor opgave van vindplaatsen

aan ons adres, Rijksherbarium, afd. Nederland, Nonnensteeg 1, Leiden.

Voor de namen van vaak in de lijst voorkomende vindsters zijn de volgende afkortingen gebruikt: (B.) voor Dr. D. Bakker te Ens, N.O.-Polder; (Ba.) voor N. P. W. Balke te Rotterdam; (F.) voor D. Franke te Eernewoude, Fr.; (I.V.O.N.) voor Excursie Instituut voor het Vegetatieonderzoek van Nederland; (M.T.J.) voor M. T. Jansen te Veenendaal; (de J.) voor Prof. Dr. S. E. de Jongh te Leiden; (K.)

voor J. H. Kern te Leiden; (M.) voor Ir. F. M. Maas te Arnhem; (v. O.) voor Dr. S. J. van Ooststroom te Oegstgeest; (v. d. P.) voor D. T. E. van der Ploeg te Murmerwoude, Fr.; (R.) voor Th. J. Reichgelt te Leiden; (Unio) voor Excursie Kon. Ned. Botanische Ver.; (de V.) voor A. de Visser te St. Laurens, Zeel.; (v. d. V.) voor E. E. van der Voo, Stichting Onderzoek Levensgemeenschappen, te Woerden.

Lycopodium annotinum L.; Schiermonnikoog, in het noordelijke dennenbos (M. T. J.); id. (Unio).

Lycopodium selago L.; Zeist, 1936 (Ba.).

Equisetum sylvaticum L.; Arnhem, Angerenstein, 1955 (M.); aan de spoorlijn Bussum—Hilversum, in een bosje bij de Crailllose brug, 1928 (J. Prins).

Ceterach officinarum Lamk. et DC.; Kamerik bij Woerden, op stenen dam (C. Sipkes).

Dryopteris cristata (L.) A. Gray $\times$ *D. spinulosa* (O. F. Müll.) Watt [*D. $\times$ tauschii* (Celak.) Domin]; Veenwouden, Buitenveld, 1955 (S. Hoekstra en v. d. P.).

Dryopteris linnaeana C. Chr.; Kooiplas ten Z.O. van Rhoon, op knotwilg (v. d. V.).

Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro; Oosterbeek, Hemelse Berg, bronbos, verwilderend, 1955 (M.); id., Oorsprong, in vochtig bos, verwilderend (id.).

Polygonum patulum Bieb.; Oostelijk Flevoland, bij Harderwijk, talud van de dijk en buitendijks terrein (B.).

Rumex dentatus L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).

Rumex domesticus Hartm.; Leiden, eiland in de Zijl, voormalig stortterrein (R.).

Rumex stenophyllus Ledeb.; Leiden, stortterrein bij de Zijl (de J., K. en R.).

Rumex triangulivalvis (Dans.) Rech. f.;

stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.); De Beer bij Hoek van Holland, 1931 (Ba.).

Atriplex hortensis L.; tussen Amerongen en Elst, Utr., ruderaal plek (v. O.).

Atriplex sabulosa Rouy; De Beer bij Hoek van Holland, strand, 1934 (Ba.).

Axyris amaranthoides L.; Wassenaar, Meyendel, wegrand, 1948 (Ba.).

Beta vulgaris L. var. *foliosa* Aschrs. et Schweinf.; Oostelijk Flevoland bij Harderwijk, opgespoten buitendijks terrein (B.).

Chenopodium album L. $\times$ *C. berlandieri* Moq. (*C. $\times$ subcuneatum* Murr); Harlingen, haventerrein, 1955 (v. d. P.).

Chenopodium crassifolium Hornem.; IJmuiden, 1883 (J. C. H. de Meijere). Zie Acta Bot. Neerl. 5, 1956, p. 323.

Chenopodium pumilio R. Br.; Ooyse Waard bij Nijmegen, 1945 (Joh. Jansen en R.); Ewijk, 1945 (Joh. Jansen en Ir. Th. Welle).

Kochia scoparia (L.) Schrad.; Oostelijk Flevoland, bij opslagplaats van Koreaanse matten, 1951 (W. I. Betzema).

Suaeda maritima (L.) Dum.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).

Agrostemma githago L.; tussen Nieuweschans en het grenskantoor, wegrand, 1955 (E. W. Clason).

Dianthus deltoides L.; duinen van de Amsterd. Waterleiding, Zandvoortervlakje (P. Cornet).

Lychnis flos-cuculi L., met gevulde bloemen; Ginneken, de Hondsdonk, 1937 (Ba.).

Melandrium noctiflorum (L.) Fr.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).

Silene armeria L.; Maarn, spoorweguitgraving (v. O.); Arcen, oude zand-

- afgraving bij de Duitse grens (Mej. A. H. P. de Goederen).
- Silene conoidea* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Silene pendula* L.; Murmerwoude, op nieuw ingezaaid gazon (v. d. P.).
- Stellaria nemorum* L. ssp. *nemorum*; Gewande bij 's-Hertogenbosch, bosje aan de Maasdijk, 1938 (J. Prins).
- Vaccaria pyramidata* Med.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Anemone nemorosa* L. var. *alboplena* Silva Tar. et Schneid.; Oosterbeek, Oorsprong (M.).
- Epimedium alpinum* L.; bos van Neerijnen, Tielerwaard, verwilderd (M.T.J.).
- Ceratophyllum submersum* L.; Holwerd, binnendijs, 1935 (D. Koopmans-Forstmann en Ir. A. N. Koopmans); tussen Ferwerd en Holwerd, sloot buitendijs (O. Hoekstra en v. d. P.); Middelburg, putje bij Waldamme, 1943 (C. Brakman); Ritten, Schroeweg, 1943 (id.).
- Fumaria capreolata* L.; Heemstede, stortterrein (P. Markus).
- Brassica juncea* (L.) Czern. et Coss.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.); Bergen aan Zee, weg-rand (de J.); Leiden, stortterrein bij de Zijl (de J., K. en R.).
- Brassicella erucastrum* (L.) O. E. Schulz; Halle, Gld., molenberg, 1940 (J. Prins).
- Bunias orientalis* L.; de Pan, tussen Katwijk en Wassenaar (de J., K., v. O. en R.).
- Cardamine flexuosa* With.; Oosterbeek, Oorsprong (M.).
- Cardamine impatiens* L.; Hilversum, spon-taan in tuin (Mej. A. M. van Hels-dingen).
- Cardamine pratensis* L., ondergedoken vorm; bronbeek van de Heelsumse Beek (M.).
- Cardaminopsis arenosa* (L.) Hayek; Wier-ringermeer, bij Middenmeer, 1952 (C. den Hartog).
- Chorispora tenella* (Pall.) DC.; Heer, Limb., Heerderberg, bouwland, 1948 (A. M. Husson).
- Conringia orientalis* (L.) Dum.; stort-terrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Erucastrum gallicum* (Willd.) O. E. Schulz; Hoogkerk, Gr., bij oliefabriek, 1955 (E. W. Clason).
- Erysimum repandum* L.; Oostelijk Flevo-land, bij Harderwijk, opgespoten buiten-dijs terrein (B.).
- Hirschfeldia incana* (L.) Lagrèze-Fos-sat; Harderwijk, bij meelfabriek, 1952 (B.).
- Lepidium densiflorum* Schrad.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Lepidium neglectum* Thell.; ten W. van Suawoude (v. d. P.); Oudeschoot, los-plaats (K. Wellinga).
- Lepidium perfoliatum* L.; Oostelijk Flevo-land, bij Harderwijk, opgespoten dijk-perceel (B.).
- Lepidium smithii* Hook.; Wassenaar, Raap-horst, 1942 (Ba.).
- Nasturtium officinale* R. Br.; Arnhem, Zijpendaal, brongebied (M.). Zie Acta Bot. Neerl. 5, 1956, p. 103.
- Hypericum hirsutum* L.; tussen Angerlo en Eldrik, Gld. (M. T. J.).
- Tillaea muscosa* L.; Darthuizen bij Leer-sum, op kwekerij (M. T. J.).
- Alchemilla acutiloba* Opiz; tussen Epe en Oene, Gld., rand van een weide (B.); de Loete, bij Papieren Kade, gem. Hazerswoude (de J. en R.).
- Alchemilla monticola* Opiz; tussen Steen-wijk en Ossenzijl, bij Gelderingen (B.).
- Geum rivale* L.; Schoonheeten, Ov., aan het kanaal, 1932 (Mej. A. Baarda).

- Potentilla argentea* L.; Noordwelle, Schouwen (de V.); tot nu toe niet bekend van het Duindistrict bezuiden Goeree.
- Potentilla norvegica* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Potentilla supina* L.; bij Naarden, IJsselmeerkust (J. van der Veen).
- Prunus spinosa* L. var. *macrocarpa* Wallr.; Rhenen, aan de voet van de Grebbeberg (M.T.J.).
- Rosa micrantha* Sm.; Amerongen, bosrand (M.T.J.).
- Rosa rugosa* Thunb.; Ameland, duinen bij Hollum (v. d. P.); Schiermonnikoog, Kobbeduinen, al sedert 25 jaar daar aanwezig (Unio).
- Sorbaria sorbifolia* (L.) A. Br.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Astragalus baeticus* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Lathyrus hirsutus* L.; Leiden, stortterrein bij de Zijl (de J., K. en R.).
- Lathyrus sylvestris* L.; Wiessel bij Apeldoorn, Greutelse weg (B. J. Lempke); de Pan, tussen Katwijk en Wassenaar (de J., K., v. O. en R.).
- Medicago arabica* (L.) All.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Melilotus indicus* (L.) All.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Scorpiurus subvillosus* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Trifolium scabrum* L.; slaperdijk tussen 's-Gravenzande en Hoek van Holland, 1910 (H. R. Hoogenraad); Oostvoorne, de Laagte, 1932 (Dr. W. C. de Leeuw); Goeree, duinen bij de vuurtoren, 1938 (A. Gorter en J. W. Kuiper); Ouddorp, 1931 (Prof. Dr. Th. Weevers); Schouwen, duinen bij Noordwelle (de V.).
- Trifolium subterraneum* L.; Schouwen, duinen bij Noordwelle (de V.).
- Vicia grandiflora* Scop.; Zelhem, aan de weg naar de Slangenborg (W. Anema).
- Vicia melanops* Sibth. et Sm.; Nieuw- en St. Joosland, op koolzaadstoppelveld, 1945 (C. Brakman).
- Vicia narbonensis* L. var. *serratifolia* (Jacq.) Ser.; Nieuw- en St. Joosland, op koolzaadland in de Middelburgse Polder, 1945 (C. Brakman).
- Epilobium adnatum* Griseb. × *E. parviflorum* Schreb. (*E.* × *weissenburgense* F. Schultz); Rotterdam, puin langs de Kralingse Plas, 1942 (Ba.).
- Epilobium adnatum* Griseb. × *E. roseum* Schreb. (*E.* × *borbasianum* Hausskn.); braakliggend terrein bij station Bloemendaal, 1955 (B.).
- Epilobium palustre* L. × *E. parviflorum* Schreb. (*E.* × *rivulare* Wahlenb.); Schiermonnikoog, Grieënglop (Unio).
- Epilobium parviflorum* Schreb. × *E. roseum* Schreb. (*E.* × *persicinum* Rchb.); braakliggend terrein bij station Bloemendaal (B.).
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.; bij Venray, verwilderd in vochtig bosje (P. Zonderwijk).
- Ammi majus* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Angelica archangelica* L.; Lopik, aan de Lek (v. d. V.).
- Bupleurum lancifolium* Hornem.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Caucalis lappula* (Web.) Grande var. *muricata* (Gren. et Godr.); Terborg, spontaan in tuin (W. Anema).
- Coriandrum sativum* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F.); Maarn,

- spoorweguitgraving (v. O.).
- Selinum carvifolia* L.; Apeldoorn, Orderbos, op oude ijzerslakkenhopen (S. van der Werf).
- Calystegia sylvestris* (Willd.) R. et Sch.; Rhenen, ruderaal terrein (v. O.); id. (M. T. J.).
- Anchusa azurea* Mill.; Wassenaar, Meyendel, 1934 (Ba.).
- Anchusa capensis* Thunb.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Echium plantagineum* L.; Rhenen, Duistere weg, ruderaal terreintje (M.T.J. en v. d. P.).
- Myosotis sylvatica* Ehrh. ex Hoffm.; Voorne, duinbosjes ten N. van het Quakjeswater, aangeplant en verwilderd (v. O.).
- Physalis alkekengi* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Solanum rostratum* Dunal; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F.).
- Solanum triflorum* Nutt.; duinen bij Velzen (K., R., gebr. De Wilde); ca. 1 km ten W. van de Putse Moer, N. Br., 1955 (J. F. Bannink).
- Euphrasia odontites* L., met witte bloemen; Schiermonnikoog, Oosterkwelder (Unio).
- Linaria bipartita* (Vent.) Willd.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Linaria elatine* (L.) Mill.; Lienden, Marschpolder, groeve voor steenfabriek (M. T. J. en v. d. P.).
- Linaria repens* (L.) Mill.; langs bosweg bij Wehr, Zelfkant, Limb. (B. J. Lempke).
- Linaria spuria* (L.) Mill.; Lienden, Marschpolder, groeve voor steenfabriek (M. T. J. en v. d. P.).
- Mimulus moschatus* Dougl.; Arnhem, Angerenstein, massaal aan een bronbeekje (M.).
- Parentucellia viscosa* (L.) Caruel; N.O.-Polder, voet van de dijk bij Kadoelen, op spreekwenslaapplaats (B.).
- Verbascum blattaria* L.; tussen Obbicht en Grevenbicht, grintgroeve aan de Maas (v. O. en R.).
- Verbascum phoeniceum* L.; Oegstgeest, Oud-Poelgeest (Dr. D. de Visser Smits); de Pan, tussen Katwijk en Wassenaar (de J., K., v. O., en R.).
- Veronica peregrina* L.; Darthuizen bij Leersum, op kwekerij (M. T. J.).
- Utricularia ochroleuca* Hartm.; Oisterwijk, Winkelsven (J. van Dijk, R. en Dr. V. Westhoff).
- Hyssopus officinalis* L.; Camperduin, in de duinen, ook met rose bloemen, 1940 (Ba.).
- Lamium album* L., met rose bloemen; Rotterdam, koolaspad achter Woudenstein, zonder datum (Ba.).
- Scutellaria minor* L.; Wanssum, Limb. (Ir. L. G. Kop).
- Stachys palustris* L., met witte bloemen; Woerden, puinstortplaats, 1955 (A. Eisses).
- Plantago patagonica* Jacq.; Hoornwerk bij Deventer, 1924 (M. Kolvoort).
- Campanula glomerata* L.; de Waarden bij Poederooyen, gem. Brakel (v.d.V.).
- Ambrosia elatior* L., met alleen ♀ bloemen; Amsterdam, Zeeburg, stortterrein Zomerlust, 1937 (J. Prins).
- Anthemis altissima* L.; Rotterdam, Merwehaven, 1939 (Ba.).
- Anthemis mixta* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v.d.P.).
- Bidens connatus* Mühlenb. var. *anomalus* Farwell; Wassenaar, Zuidwijk, aan een vijver (v.O.). Zie Acta Bot. Neerl. 5, 1956, p. 328.
- Carduus acanthoides* L.; N.O.-Polder,

- steenhopen bij Schokkerhaven (B.).
- Carduus nutans* L., ssp. *macrocephalus* (Desf.) Gugl.; Ermelo (Ds. L. Blijdorp).
- Carthamus tinctorius* L.; Leiden, stortterrein bij de Zijl (de J., K. en R.).
- Centaurea diluta* Ait.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v.d.P.).
- Centaurea melitensis* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v.d.P.).
- Centaurea montana* L.; Havelterberg, bosrand, verwilderd, 1955 (A. Eisses).
- Chrysanthemum serotinum* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v.d.P.).
- Cichorium intybus* L., met buisvormige bloemen; tussen Terneuzen en Sluiskil, Kanaaldijk-Oost (B.J.J.R. Walrecht).
- Crepis biennis* L. f. *tubulosa* Beger; Drimmelen, N.Br., in de Worp (K. Kimstra).
- Crepis paludosa* (L.) Moench; Rotterdam, Park, 1937 (Ba.).
- Echinops commutatus* Juratzka; Leiden, wegrand bij stortterrein bij de Zijl (de J., K. en R.).
- Guizotia abyssinica* (L.) Cass.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v.d.P.).
- Hieracium aurantiacum* L.; Ubbema, gem. Vries, wegrand (v.d.V.); Esbeek, N.Br., langs roggeakkers, 1943 (Ba.).
- Hieracium caespitosum* Dum. $\times$ *H. pilosella* L. (*H. flagellare* Willd.); Ubbema, gem. Vries, wegrand (v.d.V.); bij Ossenzijl, 1955 (B.).
- Iva xanthiifolia* (Fresen.) Nutt.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v.d.P.).
- Matricaria inodora* L. f. *liguliflora* Celak.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v.d.P.).
- Rhagadiolus stellatus* (L.) Gaertn.; Wageningen, haventerrein (H. Mooi).
- Senecio vernalis* W. et K.; Rotterdam, grasveld op het Oostplein, 1946 (Ba.).
- Tagetes minuta* L.; tussen Obbicht en Grevenbicht, grintgroeve aan de Maas (v. O. en R.).
- Xanthium strumarium* L.; Hansweert, Kanaalkade (de V.).
- Alisma gramineum* C. C. Gmel.; Bergumermeer, 1925 (D. Koopmans-Forstmann en Ir. A. N. Koopmans).
- Potamogeton nodosus* Poir.; IJselmuiden, in de IJssel (v. d. V.); in de Dommel, zonder nadere vindplaats, 1918 (Unio).
- Potamogeton trichoides* Cham. et Schld.; Lexmond, slootje buitendijks van de Lekdijk (v. d. V.).
- Allium scorodoprasum* L.; Leiden, eiland in de Zijl, voormalig stortterrein (R.).
- Asphodelus tenuifolius* Cav.; De Klomp, stationsterrein (M. T. J. en v. d. P.).
- Fritillaria meleagris* L.; Ginneken, de Hondsdonk, 1932 (Ba.).
- Gagea spathacea* (Hayne) Salisb.; Marum, Gr., Coendersborg (Dr. G. A. Brouwer, Prof. Dr. H. T. Waterbolk en Dr. J. Wilcke).
- Polygonatum multiflorum* (L.) All. monstr. *bracteatum*; Wassenaar, Raaphorst, 1943 (Ba.); Ginneken, de Hondsdonk, 1946 (id.).
- Juncus bufonius* L. ssp. *ranarius* (Song. et Perr.) Hiit.; Schiermonnikoog (Unio).
- Luzula campestris* (L.) DC. ssp. *congesta* (Thuill.) Kern et Reichg.; Oostkapelle, Walch., eendenkooi, 1946 (C. Brakman).
- Carex acutiformis* Ehrh. f. *maxima* (Urb.) P. Junge; oever van de Oude IJssel, ten Z. van Kampen (v. d. V.).
- Carex appropinquata* Schum.; Brummen, 1935 (Dr. J. Brand).
- Carex aquatilis* Wahlenb.; Peperga, Fr., sterk verland petgat ten Z. van de Linde (B.); Kolderveen, Dr., 1955 (B.); Ruinerwold, Dr., 1955 (A. Neumann); tussen Meppel en IJhorst, langs de

- Reest, 1917 (A. W. Kloos Jr.); Berkum, ten N. van Zwolle, ± 1 km van de Vecht (B.).
- Carex brizoides* L.; Stolwijk, aan voormalige spoorlijn (v. d. V.).
- Carex divulsa* Good.; Ubbergen, 1928 (H. S. C. Huysman).
- Carex extensa* Good.; op de Scheelhoek bij Stellendam, 1947 (Ba.).
- Carex flava* L.; Sleenwijk, in veenachtige weide, 1915 (A. W. Kloos Jr.).
- Carex vulpina* L.; oever van een kreek in de Banwaard, gem. Wijk en Aalburg (v. d. V.).
- Scirpus fluitans* L.; Lekkerkerk, „de Schrale”, onbemest weiland, 1937 (Ba.).
- Scirpus lacustris* L. ssp. *flavensis* Bakker; Akkerwoude, Fr., 1949 (v. d. P.); veen tussen de Broeresloot en de weg van Rotsterhaule naar Rotstergaast, Fr. (B.); bij Vollenhove, Kadoelermeer (B.).
- Aegilops cylindrica* Host; Kennemerduin (G. Londo).
- Avena sativa* L. var. *subuniflora* Thell.; Brabantse Biesbosch, polder Eierwaard, tussen nieuw ingezaaid gras, 1955 (P. A. den Hollander en H. Mooi).
- Bromus carinatus* Hook. et Arn.; Hilversum, ruderaal terrein (J. van der Veen).
- Bromus diandrus* Roth (*B. gussonii* Parl.); stortterrein tussen Wartena en Eernewoude, 1955 (F. en v. d. P.).
- Bromus japonicus* Thunb.; Leiden, stortterrein bij de Zijl (R.); Rotterdam, bij meelfabriek aan de Maashaven, 1939 (Ba.).
- Glyceria fluitans* (L.) R. Br. $\times$ *G. plicata* Fr. (*G. \times pedicellata* Townsend); Schiermonnikoog, sloot aan de Reeweg, ten Z. van het dorp, 1952 (C. den Hartog en A. G. de Wilde); id. (Unio); Broek bij Akkerwoude, Fr., 1955 (v. d. P.); Nieuw- en St. Joosland, 1943 (C. Brakman); Arnemuiden, 1943 (id.).
- Hordeum jubatum* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F.).
- Hordeum vulgare* L. monstr. *trifurcatum*; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.); Maarn, spoorweguitgraving, stortplaats van de spoorwegen (v. O.); Leiden, stortterrein bij de Zijl (R.).
- Lolium remotum* Schrank; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Lolium temulentum* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Panicum miliaceum* L.; stortterrein tussen Wartena en Eernewoude (F. en v. d. P.).
- Phalaris arundinacea* L. var. *picta* L.; Schiermonnikoog, duinpannetje ten O. van het dorp, ingeburgerd (Unio).
- Goodyera repens* (L.) R. Br.; Terschelling (opgave W. J. Boer Leffef in D. L. N. 59, 1956, p. 264); Wassenaar, Kijfhoek, onder dennen, 1919 (P. J. N. Brussaard).
- Liparis loeselii* (L.) Rich.; Hoofdplaat, Zeel., inlaag Hoofdplaatpolder (de V.); nog niet op verspreidingskaartje in N. K. A. 47, 1937, p. 217.
- Listera cordata* (L.) R. Br.; Schiermonnikoog, in het noordelijke dennenbos (M. T. J.); id. (Unio); Boschoord, gem. Vledder, in de bossen van de Maatschappij voor Weldadigheid, onder Pinus sylvestris (G. Jager).

