

KONINGSHOFBroedvogelinventarisatie 1973 .

Het weer werkte dit voorjaar niet mee om tot een goede inventarisatie te komen. De zang was slecht en daarom moest het terrein vele keren bezocht worden en dan heeft men nog het gevoel, vogels gemist te hebben.

Maart was droog en zonnig. Op 3 en 20 maart passeerde er een warmtefront en op 6 maart een koudefront, waarna we in een noordelijke luchtstroming kwamen; op 25 maart wederom passage van een koudefront.

April was te koud en te nat. Op 2 april zware storm, waardoor opnieuw vele bomen omgewaaid zijn; daarna koudefront met sneeuw- en hagelbuien gepaard gaande met onweer. Op 5 april een passage van warme vochtige lucht. Daarna onstabiele lucht met veel buien en regen met meest noordwestelijke winden. Daardoor was de zang in april slecht en voor de trek was het weer ook niet gunstig.

Mei was ook te nat en te somber en daardoor aan de koude kant. Op 3 mei waren we in een warme luchtzone, die gevolgd werd door een koudefront met onweer. Op 5 mei weer warme lucht, maar met stormachtige wind; daarna veel regen of buiig weer. Op 15, 16, 17 mei nachtvorst (IJsheiligen). Op 20 en 21 mei weer een warmtefront, echter direkt overgaande in zware onweersbuien, daarna weer koud en regen, en dit hield aan tot half juni. Op 18 juni zelfs nog plaatselijk nachtvorst. Na 17 juni een weersverbetering met warm en zonnig weer, met overwegend noordoostelijke wind, maar dan is de tijd van goede zang voorbij en zijn veel jongen reeds uitgevlogen.

Met onze tellingen zijn we tot de volgende aantallen territoria gekomen, die we evenals vorig jaar weer voor de drie terreingedeelten hebben aangegeven. Deel 1 is het oostelijk deel ten noorden van het grote huis en bestaat grotendeels uit loofbos, veel opgaand eikenhout, ook oudere Eiken, Beuken, populieren, Kurkiepen, met onderbegroeiing van heesters en verder ook dennen. Naar het westen toe gaat dit over in een steile helling, boven overgaand in het dennenbos, dat het gehele midden van Koningshof beslaat. Deel 2 bestaat uit de zuidelijke helft (zuidelijk van het grote huis) en over de gehele breedte. Dit heeft dus van het oosten naar het westen eerst de begroeiing van het beboste binnenduin, dan het dennenbos en tenslotte het laag begroeide duin met hier en daar hoog opgaand hout. De zuidrand is ook open duingebied, gedeeltelijk met duindoornstruweel. Deel 3 is het terrein ten westen van deel 1, voor een groot deel dennenbos, maar in het westen wat loofhout en de lagere, dichte duinstruweelbegroeiing.

Lijst van broedterritoria

	<u>deel 1</u>	<u>deel 2</u>	<u>deel 3</u>	<u>totaal</u>
Wilde Eend	-	-	1	1
Fazant	niet geteld			
Houtsnip	4	4	2	10
Holenduif	niet waargenomen			
Houtduif	18	15	11	44
Tortelduif	5	6	4	15
Turkse Tortel	1	2	-	3
Torenavalk	2 x gezien			
Koekoek	1	3	3	7
Bosuil	3	1	-	4
Groene specht	1	2	1	4
Grote Bonte Specht	6	3	1	10
Boomleeuwerik	-	1	2	3
Boompieper	-	2	2	4
Winterkoning	19	9	1	29
Heggenus	9	4	-?	13?
Grote Lijster	-	-	1	1
Zanglijster	11	4	1	16
Merel	29	24	15	68

	<u>deel 1</u>	<u>deel 2</u>	<u>deel 3</u>	<u>totaal</u>
Gekraagde Roodstaart	5	4	1	10
Nachtegaal	1	9	9	19
Roodborst	45	15	14	74
Sprinkhaanrietzanger	-	2	-	2
Zwartkoptuinfluit	9	4	4	17
Tuinfluit	1	-	-	1
Grasmus	2	4	-	6
Braamsluiper	-	1	2	3
Fitis	10	30	22	62
Tjiftjaf	12	4	1	17
Fluit	niet waargenomen			
Goudhaantje	in juni nog zingend in deel 1			
Grauwe Vliegenvanger	niet waargenomen			
Koolmees (minimum aant.)	26	22	5	53
Pimpelmees	15	6	1	22
Glanskopmees	8	2	3	13
Staartmees	2	1	1	4
Boomklever	8	1	-	9
Boomkruiper	14	1	-	15
Groenling	5	6	2	13
Kneu	-	1	1	2
Vink	9	1	1	11
Huismus	bij de gebouwen			
Spreeuw	6	3	2	11 en een ver- der aantal bij de gebouwen?
Zwarte Kraai	-	1	-	1
Kauw	enige, in hoofdzaak bij de gebouwen			
Ekster	-	3	1	4
Vlaamse Gaai	5	7	1	13

Dit zijn totaal rond 620 territoria van 40 soorten.

We mogen de cijfers van dit jaar niet zonder meer met die van 1972 vergelijken en daaruit een toe- of afname konkluderen, vooral niet als de cijfers betrekkelijk weinig verschillen.

Maar van de volgende soorten waren de waargenomen aantallen dit jaar

dermate lager, dat we wel kunnen zeggen dat er ook werkelijk minder vogels waren. Mogelijk is het koude weer in april en mei hier ook van invloed geweest in verband met de aankomst van de vogels.

De soorten die dan in 1973 minder in aantal waren dan in 1972 zijn:

	<u>1972</u>	<u>1973</u>
Grote Bonte Specht	14 à 15	10
Heggemus	27 à 30	13 (hoewel 13 wel te laag zal zijn)
Zanglijster	24	16
Gekr.Roodstaart	17	10
Nachtegaal	30	19
Roodborst	1973 minder alleen in de delen 2 en 3	
Zwartkoptuinfluit	27	17
Grasmus	11	6
Fitis	84	62
Fluiter	in 1973 niet gekomen	
Vink	16	11

A.Antonisse-Reiman

T.Bloem-Margadant

F.Bloem

Veldlaan 8, Aerdenhout.