

ENKELE SPINNEN VAN DE HAARLERBERG (ARANEAE)

Steven IJland

Bronkhorststraat 23, 2316 SX Leiden (sijland@gmail.com)

ABSTRACT

On some spiders of the Haarlerberg (Araneae).

A short inventory was carried out on the Haarlerberg in the Nature Park Sallandse Heuvelrug in the province Overijssel, the Netherlands. The inventory was broken off because it killed too many lizards in the pitfalls. The spiders of the first catch were identified and are listed. A total number of 809 specimens belonging to 43 species were found. Eleven species appear to be new for the province Overijssel.


Key words: Haarlerberg, inventory, Netherlands, spiders

In 2006 werd op de Haarlerberg een vangpottenonderzoek naar loopkevers gestart. De Haarlerberg is een 63,2 meter hoge heuvel in de gemeente Hellendoorn in de Nederlandse provincie Overijssel. De heuvel maakt deel uit van het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug.

Na het legen van de eerste potten op 11 mei 2006 werd het onderzoek afgebroken. De vrijwilligers die de potjes leegden troffen er namelijk ook hagedisjes in aan en braken daarom het onderzoek af. De spinnen werden wel gedetermineerd. In totaal zijn 43 soorten aangetroffen, waarvan elf soorten nieuw voor Overijssel. Van de elf waren de volgende acht al bekend uit de aangrenzende provincies Friesland, Drenthe en Gelderland: *Zelotes electus*, *Cheiracanthium virescens*, *Clubiona trivialis*, *Walckenaeria atrotibialis*, *Walckenaeria acuminata*, *Alopecosa cuneata*, *Ero furcata* en *Aelurillus v-insignitus*. Twee soorten waren al bekend uit Drenthe en Gelderland (*Zelotes petrensis*, *Talavera petrensis*), en *Xysticus ferrugineus* werd eerder gemeld uit Gelderland.



Kaart 1: Overzichtsfoto van de Haarlerberg.



Kaart 2: Detail met de exacte plaatsen van de vangpotten.

LITERATUUR

Helsdingen, P.J. van 2009. Spinnencatalogus. [versie 2009.1] – <http://naturalis.nl/spinnen>

Tabel 1. Spinnen gevangen op de Haarlerberg.

Lokatie codes:

O3	Oasekop-3	Hei-Hei	RD 224.41-483.13
K1	Koningsbelt-1	Brand-Plag	RD 224.60-484.06
K2	Koningsbelt-2	Brand-Hei	RD 224.58-484.06
K3	Koningsbelt-3	Hei-Plag	RD 224.62-484.03
V2	Vliegveld-2	Brand-Hei	RD 223,57-483,62
V4	Vliegveld-4	Hei-Hei	RD 223,51-483,60

TAXON	K1		K2		K3		O3		V2		V4		Totaal m	Totaal f	Totaal
	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f	m	f			
<i>Aelurillus v-insignitus</i> (Clerck, 1757)											1		1		1
<i>Alopecosa cuneata</i> (Clerck, 1757)									1	2			1	2	3
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (Clerck, 1757)	1		1						1	1			3	1	4
<i>Centromerita bicolor</i> (Blackwall, 1833)							1							1	1
<i>Centromerita concinna</i> (Thorell, 1875)											2			2	2
<i>Centromerus dilutus</i> (O.P.-Cambridge, 1875)					1		1	2	2		3		3	6	9
<i>Centromerus sylvaticus</i> (Blackwall, 1841)				2					2		1			5	5
<i>Cercidia prominens</i> (Westring, 1851)	1		2	1	1		1	1		1	1		7	2	9
<i>Cheiracanthium virescens</i> (Sundevall, 1833)			1		2		1						3	1	4
<i>Clubiona trivialis</i> C.L.Koch, 1843							1						1		1
<i>Drassyllus pusillus</i> (C.L.Koch, 1833)	1				4		1	1		1			8		8
<i>Ero furcata</i> (Villers, 1789)	2			1							1		3	1	4
<i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)							1				1	1	2	1	3
<i>Euryopsis flavomaculata</i> (C.L.Koch, 1836)							1						1		1
<i>Gonatium rubens</i> (Blackwall, 1833)		1		4			4		5		6			20	20
<i>Hahnia helveola</i> Simon, 1875							1				1		1	1	2
<i>Hahnia nava</i> (Blackwall, 1841)	1	1	4		1			10	6	5	1		21	8	29
<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i> (Ohlert, 1865)		1												1	1
<i>Metellina mengei</i> (Blackwall, 1869)							1						1		1
<i>Micaria pulicaria</i> (Sundevall, 1832)				1					1				2		2
<i>Micrargus herbigradus</i> (Blackwall, 1854)	1		1		2	1				2	2		6	3	9
<i>Nematogmus sanguinolentus</i> (Walckenaer, 1837)				1										1	1
<i>Neon reticulatus</i> (Blackwall, 1853)											1			1	1
<i>Palliduphantes ericaeus</i> (Blackwall, 1853)				1	2	1				3			2	5	7
<i>Pardosa lugubris</i> (Walckenaer, 1802)							1				1		1	1	2
<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)	4	1	1				26	2	13		11	3	55	6	61
<i>Peponocranium ludicrum</i> (O.P.-Cambridge, 1861)	4	1	11	1	7	2			3		3	2	28	6	34
<i>Philodromus histrio</i> (Latreille, 1819)									1				1		1
<i>Robertus lividus</i> (Blackwall, 1836)	1		3		2	1	3	10		7			26	1	27
<i>Talavera petrensis</i> (C.L.Koch, 1837)									1				1		1
<i>Tenuiphantes mengei</i> (Kulczynski, 1887)		1	4		5	1	16	5	6	4	5	3	36	14	50
<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	75	12	49	4	61	9	55	4	57	10	86	11	383	50	433
<i>Walckenaeria acuminata</i> Blackwall, 1833		1								1	2			4	4
<i>Walckenaeria atrotibialis</i> (O.P.-Cambridge, 1878)								1						1	1
<i>Walckenaeria cucullata</i> (C.L.Koch, 1836)				2		1	1	7		7	2		18	2	20
<i>Walckenaeria dysderoides</i> (Wider, 1834)				1			2	1					4		4
<i>Walckenaeria obtusa</i> Blackwall, 1836											1			1	1
<i>Xysticus ferrugineus</i> Menge, 1876					1			1					2		2
<i>Zelotes electus</i> (C.L.Koch, 1839)		1												1	1
<i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878)	2		2	2	1	1	1	6		2			13	4	17
<i>Zelotes longipes</i> (L.Koch, 1866)		1		1			1	2					1	4	5
<i>Zelotes petrensis</i> (C.L.Koch, 1839)	1	2	1		1		2	4	2				7	6	13
<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)				1					2		1		4		4
Totaal													646	163	809