

Torenvalk *Falco tinnunculus* als aaseter

Guido Meeuwissen

Op 30 oktober 2005 was ik aan het wandelen in de Eemshaven Oost toen ik onverwachts op een Torenvalk stuitte die fanatiek zat te plukken aan een grote prooi. De valk viel niet op in de smalle strook gras vanwege een lange rij zandbulten en de boomsingel bij de zeedijk. Ze zat bovenop de bebloede borstkas van een meeuwachtige (?) vogel. Om haar evenwicht te bewaren fladderde de valk geregeld heftig met haar vleugels. Soms viel ze eraf, maar na een adempauze kroop ze steeds opnieuw op het kadaver. Ik sloop wat dichterbij en door de telescoop zag ik dat ze enorme moeite had kleine stukjes van de taaie borstspieren af te rukken. De veren bleven geregeld aan haar bek plakken maar toch lukte het haar kleine hapjes van het rode vlees naar binnen te werken. Het was wel een grappig gezicht: een Torenvalk met een witte kop vol plakkerige veren. Soms staken de grijze poten van het kadaver even loodrecht omhoog, de grond eromheen lag bezaaid met geplukte veren. Geregeld liet de valk haar prooi even in de steek en sloop dan weg in de boomsingel of tussen de zandhopen. Bang om verrast te worden door de oorspronkelijke eigenaar van de prooi, een Slechtvalk *Falco peregrinus* of Havik *Accipiter gentilis*? Beide soorten worden hier dagelijks jagend gezien. De Torenvalk liet zich door mij niet van de wijs brengen, ze ging gewoon met haar maaltijd terwijl ik haar op 12 m afstand fotografeerde.



Foto 1. Adult vrouwje Torenvalk bezig met het ontleden van een wulp, Eemshaven Oost, 30 oktober 2005 (Guido Meeuwissen). *Adult female Eurasian Kestrel taking morsels from Curlew, Eemshaven, 30 October 2005.*

Na anderhalf uur besloot ik met enige tegenzin toch eens te kijken met welk prooidier ze bezig was. Pas op 3 meter afstand vloog ze krijsend een zandbult op, boos dat ik haar stoorde. Toen ik me bukte zag ik meteen een losse wulpensnavel liggen, de rest van de kop ontbrak. Dus een wulp *Numenius arquata* en geen meeuw, zoals ik eerst dacht. Het geplukte, bloederige wulpenlijf was verder nog redelijk intact; er zat nog veel vlees aan.

Ik ga er niet vanuit dat een torenvalkvrouwte een prooi vangt die veel groter is dan zichzelf. Dat zij, mogelijk door honger gedreven, genoeg neemt met een vers kadaver vind ik voor een Torenvalk wel heel bijzonder. Ik had het zelf nog nooit gezien.



Foto 2. Adult vrouwte Torenvalk bezig met het ontleden van een wulp, Eemshaven Oost, 30 oktober 2005 (Guido Meeuwissen). *Adult female Eurasian Kestrel taking morsels from Curlew, Eemshaven, 30 October 2005.*

Summary

Meeuwissen G. 2006. Eurasian Kestrel *Falco tinnunculus* as scavenger. De Takkeling 14: 86-87.

On 30 October 2005, an adult female Eurasian Kestrel was seen while plucking on top of a large avian prey at the Eemshaven in northern Groningen. With substantial difficulty, she tried and succeeded to remove particles of flesh from the breast muscle. After 1,5 h the Kestrel was chased from the prey, which turned out to be a Curlew *Numenius arquata*. Given prey size, it is unlikely that the Kestrel had captured it herself. Presumably, the Curlew had been taken by a Northern Goshawk *Accipiter gentilis* or Peregrine Falcon *Falco peregrinus* (both of which occur in the area), but this was not witnessed.

Adres: Rozengaard 2, 9753 BL Haren, meeuwissenbuis@wanadoo.nl