

VERSLAG BROEDVOGELS KENNEMERDUINMEER 1956.

Bergeend

Voor zover de ouden met de jongen naar het meer komen, blijven ze daar niet langer dan 10 - 14 dagen. De volgende waarnemingen zijn daarvan gedaan: 3/6, 5/6 en 6/6 1 paar met 9 pullen; 7/6 1 paar met 8 pullen; 9/6 1 ex. met 11 pullen en 1 ex. met 7 pullen; 16/6 1 ex. met 11 pul.

Waterhoen

Twee paar hebben ieder twee maal gebroed. In augustus waren er in totaal ca. 16 exx. aanwezig. Opgemerkt zij, dat v.d. Brom op 29/8 weer een waterhoen bezig zag met nestbouw; op 3/9 trof hij een der ouden op het nest aan. Dit zou dan het vijfde broedgeval zijn.

Dodaars

Een paar heeft met succes gebroed; op 7/7 zagen wij dit paar met 3 pullen van 1 à 2 dagen oud; op 15/7 waren er 2 van de 3 pullen over, die verder regelmatig gezien zijn.

Een tweede paar was op 1/7 een nest aan het bouwen, waarop het op 8/7 broedend werd aangetroffen; op 14/7 was dit nest geheel verdwenen. Op 17/7 werd op ongeveer dezelfde plaats weer een nest gebouwd, waarin 21-22/7 eieren werden gezien. Helaas was op 26/7 ook dit nest verdwenen.

Wilde eend

Op 22/4 1 ♀ broedend op het eiland gezien; op 5/6 mei 1 ♀ met 11 jongen, op 30/5 1 ♀ met 6 jongen en op 3/6 2 ♀♀ met resp. 12 en 10 jongen.

Scholekster

Er hebben 4 à 5 paar op het eiland en de oevers gebroed. Eind mei werden de eerste broedgevallen waargenomen; midden juni verschenen de eerste jongen. Tot in augustus worden geregeld jonge scholeksters langs de oevers gezien onder de hoede van de oude vogels. Deze vogels lieten zich door het publiek niet verontrusten, zodat men regelmatig kon waarnemen, hoe de jongen door de ouden werden gevoerd.

Kievit

Hiervan hebben minstens 3 paar gebroed aan het meer. De eerste balts werd waargenomen op 19/4, het eerste broedsel geconstateerd begin mei. De eerste jongen werden tegen eind mei gezien. Op 29/7 werd nog een exemplaar met 3 kleine pullen waargenomen. Het betrof hier dus een zeer laat broedsel.

Bontbekplevier

Er hebben zeker 3 paar bontbekjes gebroed.

Kleine plevier

Ca 5 paar hebben er gebroed; de eerste vogels werden op 7/4 waargenomen; eerste balts op 22/4.

Zilvermeeuw

Eén paar heeft gebroed op het eiland; op 23/6 ouden gezien met 1 groot jong.

Stormmeeuw

De broedparen waren vanaf begin mei op hun oude plaats op het eiland aanwezig. Twee paartjes hebben er gebroed. Later werden 4 jongen waargenomen.

Kapmeeuw

Het aantal kapmeeuwen in het meer nam in de laatste dagen van mei sterk toe. Op 29/5 2 exx. baltsend waargenomen. Eind juni/begin juli waren er geregeld 3 paar op het eiland aanwezig en werden er 3 exx. in broedhouding gezien (1/7 en 8/7) Naderhand (29/7) werden er op het eiland 1 ad. met 2 pullen gezien. De andere broedsels gingen vermoedelijk verloren.

Visdief

Naar schatting hebben er ca. 25 paar op het eiland gebroed, voor het overgrote deel zonder succes. Wij zagen niet meer dan 4 jongen tegelijkertijd en wel eind juni en in de loop van juli. Mogelijk is dit slechte resultaat te wijten aan de hermelijn, die wij meerdere malen -- ook met jongen -- hebben waargenomen bij de takkenbossen, die er toen op de ZW-oever van het meer lagen.

Fazant

Vanaf begin juli waren er op de oever van het duinmeer jonge fazanten met enkele ouden aanwezig. Het aantal liep op, zodat er eind juli/begin augustus geregeld 25 à 30 exx. gezien werden.

Grauwe klauwier

Een paar heeft vlak bij het duinmeer gebroed en bracht 3 jongen groot. Op 29/7 en 1/8 werd waargenomen, dat de drie uitgevlogen jongen door de ouders werden gevoerd.

W. J. Akkerman

- . - . - . - . - . -