

SUPPLÉMENT AU CATALOGUE DES  
CHAMPIGNONS DES ENVIRONS  
DE LA HAYE

PAR

CAROLINE DESTRÉE.

BASIDIOMYCÈTES.

Hyménomycètes.

*Agaricus* (Arm.) *spissus* Fr.

Un seul exemplaire, au bois de la Haye

(Lep.) *lenticularis* Lasch.

A plusieurs endroits au bois de la Haye.

(Arm.) *robustus* A. S.

Au bois de Schéveningue.

(Clit.) *dealbatus* Sou.

A. Ockenburgh près de Loosduinen, dans un

petit bois sablonneux.

(Clit.) *suaveolens* Schum.

Au bois de Schéveningue.

(Clit.) *brumalis* Fr.

Dans une sapinière au bois de Schéveningue.

(Clit.) *fumosus* Pers. var. *caespitosus*.

Au bois de Schéveningue.

(Nol.) *piceus* Sch. et Kalchbr.

Dans les dunes de Schéveningue.

(Phol.) *adiposus* Fr.

Au bois de la Haye, sur un tronc de hêtre.

- Agaricus* (Phol.) *durus* *Bolt.*  
 Au bois de Schéveningue.
- „ (Inoc.) *maritimus* *Fr.*  
 Dans le sable des dunes à Loosduinen.
- „ (Inoc.) *geophyllus* *Sow.*  
 Au bois de la Haya et à Zorgvliet.
- Cortinarius* (Phleg.) *largus* *Fr.*  
 Dans une sapinière au bois de Schéveningue.
- „ (Myx.) *mucifluus* *Fr.*  
 Dans une sapinière au bois de Schéveningue  
 et à Wassenaar sous des pins.
- „ (Inol.) *bolaris* *Fr.*  
 Au bois de Schéveningue.
- „ (Hydr.) *castaneus* *Fr.*  
 Dans une sapinière au bois de Schéveningue.
- „ (Hydr.) *fasciatus* *Fr.*  
 Route de Leide, près de la Haya.
- Hygrophorus* *limacinus* *Fr.*  
 Au bois de Schéveningue.
- „ *olivaceo-albus* *Fr.*  
 Bois de Schéveningue.
- Lactarius* *controversus* *Fr.*  
 En groupes dans une prairie près de Wassenaar.
- „ *pubescens* *Fr.*  
 Dans les bois aux environs de Wassenaar et  
 près de Loosduinen à Ockenburgh.
- „ *zonarius* *Fr.*  
 A Ockenburgh, près de Loosduinen.
- „ *trivialis* *Fr.*  
 Dans une sapinière au bois de Schéveningue.
- Russula* *rosacea* *Fr.*  
 Dans une sapinière au bois de Schéveningue.
- „ *purpurea* *Gill.*  
 Sous des pins à Wassenaar et au bois de  
 Schéveningue.

*Russula pectinata* Fr.

Au bois de la Haye.

*Hydnum cinereum* Fr.

Route de Wassenaar, près de la Haye.

#### Gastéromycètes.

*Geaster fimbriatus* Fr.

Au bois de la Haye et dans un jardin à Rijswijk.

#### HYPODERMÉES.

##### Urédinées.

*Puccinia Centaureae* Plowr.

III Sur *Centaurea Scabiosa*, Waterververschingskanaal, près de la Haye.

„ *Polygoni* Pers.

II et III Sur *Polygonum Persicaria* à Ockenburgh, près de Loosduinen.

*Melampsora Helioscopiae* Pers.

II et III Sur *Euphorbia Helioscopia* et *Peplus* dans un jardin délaissé, près de la Haye.

##### Ustilaginées.

*Ustilago Avenae* Pers.

Sur *Avena sativa* à 's-Gravezande (Westland).

„ *olivacea* D.C.

Sur *Carex riparia*, dans un fossé près de Wassenaar.

„ *violaceae* Pers.

Sur *Silene conica*, au bord du Waterververschingskanaal, près de la Haye.

*Sphacelotheca hydropiperis* Plowr.

Dans les ovaires de *Polygonum hydropiper*, dans une prairie près de Wassenaar.

#### ASCOMYCÈTES.

##### Pyrénomycètes.

*Erysiphe Galeopsidis* D.C.

Sur *Stachys palustris*, au bois de la Haye.

- Lizonia halophila* Sacc. Bonn et Rousseau.  
 Sur *Honkenya peploides*. Dans les dunes entre Monster et ter Heide et au Hoek van Holland.
- Gloniopsis biformis* Sacc.  
 Sur des branches de peuplier dénudées, au bois de Schéveningue.
- Patinella artemisioides* Sacc.  
 Sur les tiges mortes de *l'Artemisia vulgaris*, à Loosduinen.
- Cucurbitaria elougata* Fr.  
 Sur les rameaux du *Robinia Pseudacacia*, au bois de la Haye.
- „ *Sorbi* Karst.  
 Sur les rameaux morts du *Sorbus aucuparia*, au bois de la Haye.
- Pleospora vagens*, forma pusilla Niesl.  
 Sur les feuilles mortes du *Psamma arenaria*.
- „ *moricola* Pass.  
 Sur les branches mortes du *Morus alba*, au bois de Schéveningue.
- „ *infectoria* Fckl.  
 Sur les feuilles mortes du *Psamma arenaria*, dans les dunes à Loosduinen.
- Massaria pupula* Tul.  
 Sur les branches mortes de *Acer pseudo Platanus*, au bois de la Haye.
- Melanomma hippophaës* H.  
 Sur les rameaux desséchés de *Hippophae rhamnoides*.
- Leptosphaeria vagans* Karst.  
 Sur les feuilles de *Acorus Calamus*, près de Voorburg, (trouvé également au Jardin Botanique à Leiden).
- Fenestella princeps* Sacc.  
 Sur *Populus balsamifera*, au bois de Schéveningue.
- Anthostoma melanotes* B. et Br.  
 Sur les rameaux desséchés du *Viburnum Opulus*, à Wassenaar dans les dunes.

*Didymella proximella* Sacc.

Sur des feuilles de *Carex*, à Loosduinen.

*Sphaerella Tassiana* De Not.

Sur les chaumes de *Psamma arenaria*, dans  
les dunes à Loosduinen.

„ *lineolata* Desm.

Sur les chaumes morts de *Psamma arenaria*,  
à Ockenburgh, (Loosduinen).

*Sphaerulina intermixta* Sacc.

Sur les branches mortes de *Rosa rubiginosa*, dans les dunes  
à Wassenaar.

*Metasphaeria trichostoma* Sacc.

Sur les tiges mortes de *Lycopsis arvensis* à Ockenburgh  
(Loosduinen).

*Cryptospora Corylina* Fckl.

Sur les rameaux morts du *Coryllus Avellana*, au bois de  
la Haye.

*Leptosphaeria Fuckelii* Nies.

Sur les feuilles sèches du *Psamma arenaria*, dans les dunes  
à Loosduinen.

*Ophiobolus tenellus* Sacc.

Sur les tiges mortes de *Anchusa officinalis*,  
dans les dunes de Schéveningue.

„ *arenarius* Sacc. Bromn. et Rouss.

Sur les chaumes morts de *Psamma are-*  
*naria*, à Loosduinen.

*Valsa translucens* Nke.

Sur des rameaux morts de saule à Loosduinen  
(Ockenburgh).

„ *leucostoma* Pers.

Sur les branches d'un *Rhammus* au bois de Sché-  
veningue.

*Calospora platanoides* Niessl. forma Sorbi Roll. et  
Destr. Peritheciis corticulis, aliquando solitariis, sed generatim  
gregariis et circumscissis, tunc ostioliis stipatis, in discum

nigrum, epidermidem perforantibus. Ascis clavatis aut subfusiformibus, breviter stipatis,  $90 = 20$ . Paraphysibus non visis. Sporidiis subdistichis, hyalinis, cylindricis vel subfusiformibus, utrinque rotundatis et saepe appendiculo brevi ornatis, triseptatis, guttatis,  $20-25 \text{ } \mu\text{m.} = 4-6$ .

Nous avons trouvé cette variété en grand nombre sur des *Sorbus Aria*, plantés dans le voisinage de *Acer Pseudoplatanus*, au bois de Schéveningue.

*Diaporthe (Eup.) fasciculata* Nits.

Sur les rameaux tombés du *Robinia Pseud-acacia* au bois de la Haye.

„ *(Eup.) orientalis* Sacc.

Sur les branches mortes du *Morus alba*, au bois de Schéveningue.

„ *(Eup.) semiimmersa* Nits.

Sur les rameaux morts de *Crataegus Oxycantha*. Dans les dunes près de Monster.

„ *(Eup.) forabilis* Nke.

Sur des rameaux morts de peuplier, au bois de Schéveningue.

„ *(Eup.) sylvestris* Nits.

Sur les rameaux de *Ampelopsis hederacea*, dans un jardin, à Wassenaar.

„ *(Tetr.) retecta* Fckl. et Nits.

Sur les rameaux morts du *Buxus sempervirens*, à Wassenaar.

„ *(Tetr.) exasperans* Nits.

Sur les rameaux morts du *Betula alba* au bois de Schéveningue.

„ *(Tetr.) circumscripta* Atha.

Sur les rameaux du *Sambucus nigra*, à Ockenburgh (Loosduinen).

„ *(Tetr.) inaequalis* Nits.

Sur les rameaux décortiqués du *Sarothamnus vulgaris*, dans les dunes à Loosduinen.

**Diaporthe (Tetr.) Beckhausii Nits.**

Sur les rameaux décortiqués du *Viburnum Opulus*, à Wassenaar, dans les dunes.

- „ (Tetr.) *cupulata* Berl. et Destr. nov. sp.  
Stromate ullo manifesto, peritheciis erebre sparsis vel subgregariis, cupulatis, ostiolo minuto peridermis circa ostiolum nigricante, adhaerentibus; ascis longiuscule stipitatis, clavatis, parte sporif. 45—50 = 10—12, octosporis; sporidiis cylindraceo-fusoideis, rectis vel curvulis ad medium pseudo 1—septatis, vix constrictis, 4 guttatis 18—20 = 4—5 e hyalinis—viridulis.

In ramulis siccis *Populi balsamiferae*. Peritheciis eximie cupulatis Ditopellam fusi-sporam in mentem revocat.

Au bois de Schéveningue dans une nouvelle, plantation d'arbres sur les branches desséchées du *Populus balsamifera*.

- „ (Chor.) *Castanea* Sacc.  
Sur les branches mortes du *Castanea vesca*, au bois de la Haye.

- „ (Chor.) *oncostoma* Fekl.  
Sur les branches mortes du *Robinia Pseud-acacia* au bois de la Haye.

**Phycomycètes.****Synchytrium Succisae De By et Wor.**

Sur les feuilles de *Succisa pratensis*, à Loosduinen.

**Champignons Imparfaits.****Phoma Lycii Sacc.**

- Sur les branches mortes du *Lycium barbarum* à ter Heide (Westland) (trouvé également à Katwijk).
- „ *venenosa* Sacc.  
Sur les tiges mortes du *Datura Stramonium*, au bois de Schéveningue.

- Phoma lineolata* Desm.  
 Sur des cônes de mélèze au bois de Schéveningue.
- Camarosporium quaternatum* Sacc.  
 Sur les rameaux morts du *Lycium barbarum* au Hoek van  
 Holland (Trouvé également à Katwijk).
- Coryneum pulvinatum*. Br. et Schum.  
 Sur du bois mort au bois de Schéveningue.
- Harmiscium cauliculus* Rabenh.  
 Sur des tiges desséchées d'un *Hypericum* à Ockenburgh  
 (Loosduinen).
- Cladosporium compactum* B. et C.  
 Comme le précédent.
- Scolecotrichum graminis* Fekl.  
 Sur *Dactylis glomerata*, à Loosduinen.
- Septembre 1896.