

PREMIÈRE CONTRIBUTION

AU

CATALOGUE DES CHAMPIGNONS

DES ENVIRONS DE LA HAYE.

PAR

CAROLINE DESTRÉE.

Basidiomycètes.

En livrant à l'impression ce premier essai, je me fais un devoir d'exprimer ma reconnaissance à M. le professeur C. A. J. A. Oudemans pour l'extrême obligeance dont il a fait preuve à mon égard. C'est surtout grâce à sa bienveillance et à ses renseignements utiles qu'il m'a été possible de poursuivre mes études, et je suis heureuse de pouvoir lui dire ici combien mes recherches ont été facilitées par son gracieux concours.

Cette liste est loin d'être complète et il est certain qu'un grand nombre d'espèces a échappé à mes recherches. Mais, en attendant que de nouvelles récoltes me permettent de la compléter, je crois utile d'indiquer les espèces que j'ai pu trouver en y joignant celles qui ont été observées dans nos environs par nos prédécesseurs et qui sont signalées dans les ouvrages de M. le professeur Oudemans.

Ordre I. Basidiomycètes.

Sous-ordre Hyménomycètes.

Famille Agaricinées.

Genre *Agaricus*.

Serie A. Leucosporées.

(Sous-genre *Amanita Pers.*)

A. phalloides Fr.

Commun dans les bois des environs de la Haye. Juill.—Août.

A. Mappa Batsch.

Bois de Schéveningue, Westland. Août—Oct.

A. muscarius L.

Dans les bois. Westland, Wassenaar. Sept.—Oct.

A. pantherinus D.C.

Dunes de Wassenaar, dans un petit bois de chênes. Sept.

A. rubescens Fr.

Assez fréquent dans les bois. Juill.—Oct.

A. vaginatus Bull.

Dans un petit bois de bouleaux, près de Monster. Août.

(Sous-genre *Lepiota*.)

A. procerus Scop.

Assez commun dans les bois et les dunes aux environs de la Haye.

**A. rachodes Vitt.*

Dans un jardin aux environs de Wassenaar.

A. acutesquamosus Weinm.

Au bois de la Haye, sous les hêtres. Oct.

*) Je place une astérique devant le nom des espèces indiqués par M. le professeur Oudemans et dans d'autres publications mycologiques antérieures comme croissant dans nos environs et que je n'y ai pas encore retrouvées.

A. clypeolarius Bull.

Bois de Schéveningue, dans les endroits découverts. Oct.

A. cristatus A. S.

Assez commun dans les bois. Août—Sept.

A. amianthinus Scop.

Dans les dunes, aux environs de Monster. Oct.

A. seminudus Lasch.

Dunes de Wassenaar, dans un petit bois. Oct.

(Sous-genre *Armillaria* Fr.)

A. melleus Fr.

Croît en touffes au pied des arbres dans les bois. Sept.—Oct.

A. mucidus Schrad.

Sur une souche de hêtre, au bois de la Haye. Sept.

(Sous-genre *Tricholoma* Fr.)

A. portentosus Fr.

Sous les sapins, aux environs de Wassenaar. Sept.

A. albobrunneus Fr.

Route de Leiden. Sept.

A. ustalis Fr.

Dans une sapinière, au bois de Schéveningue. Oct.

A. rutilans Schaeff.

Sapinière au bois de Schéveningue. Oct.

**A. variegatus* Scop.

Westland. Août. Oct.

A. Columbetta Fr.

Dans l'herbe au bord d'un chemin, au bois de Schéveningue.

**A. imbricatus* Fr.

Westland. Sept.—Oct.

A. terreus Schaeff.

Commun dans les bois en automne.

A. saponaceus Fr.

Bois de la Haye. Bois de Schéveningue. Août—Oct.

A. sulphureus Bull.

Assez commun dans les bois. Automne.

A. ionides Bull.

Dans l'herbe au bord de la route de Leiden. Sept.

A. albus Schaeff.

Bois de Schéveningue, Westland. Mai—Oct.

A. personatus Fr.

Assez commun dans les bois des environs de la Haye. Sept.—Oct.

A. nudus Bull.

Dans un petit bois de chênes, aux environs de Wassenaar et dans le Westland. Oct.

A. grammopodius Bull.

Bois de la Haye, dans l'herbe au bord d'un chemin. Sept.

A. melaleucus Pers.

Commun dans les bois. Sept.—Oct.

A. humilis Fr.

Dans une prairie, aux environs de Loosduinen. Oct.

(Sous-genre *Clitocybe Fr.*)*A. nebularis Batsch.*

En groupes parmi les feuilles mortes, au bois de la Haye. Sept.

A. clavipes Pers.

Bois de Schéveningue. Sept.—Oct.

A. odoratus Bull.

Assez fréquent dans les bois. Août—Oct.

A. cerussatus Fr.

Sapinière au bois de Schéveningue. Sept.

A. phyllophilus Fr.

Parmi les feuilles mortes, au bois de la Haye. Sept.—Oct.

A. candicans Pers.

Sapinière au bois de Schéveningue. Sept.

A. opacus Sow.

Bois de Schéveningue. Sept.

A. maximus Fl. Wett.

Dans les bois, aux environs de Wassenaar et de Monster. Oct.

A. infundibuliformis Schaeff.

Dans les bois parmi les feuilles mortes. Automne.

- A. gilvus Pers.*
Sapinière au bois de Schéveningue.
- A. flaccidus Sow.*
Dans les bois, aux environs de la Haye. Sept.—Oct.
- **A. catinus Fr.*
Sous les sapins dans le Westland. Déc.
- A. cyathiformis Fr.*
Assez fréquent dans les dunes aux environs de la Haye.
Sept.—Nov.
- A. fragans Sow.*
Sapinière dans le bois de Schéveningue. Oct.
- A. obsoletus Fr.*
Dans les dunes, aux environs de Monster. Oct.
- A. laccatus Scop.*
Commun dans les bois. Juill.—Oct.
- **A. tortilis Bolt.*
Croît en touffes dans les endroits ombragés. Westland. Sept.—Oct.
- (Sous-genre *Collybia Fr.*)
- A. radicans Relh.*
Commun dans les bois. Juill. Oct.
- A. longipes Bull.*
Loosduinen, bois de la Haye. Sept. — Oct.
- A. fusipes Bull.*
Bois de la Haye. En touffes au pied des arbres. Août.
- A. butyraceus Bull.*
Sapinière dans le bois de Schéveningue. Oct.
- A. velutipes Curt.*
En touffes sur les souches et les troncs. Bois de la Haye,
Westland, Wassenaar, etc.
- A. stipitarius Fr.*
Dans les dunes, aux environs de Schéveningue, sur des raci-
nes de graminées. Sept.
- A. confluens Pers.*
Commun dans les bois. Juill. — Oct.

A. cirrhatus Pers.

Sur des Russula en décomposition. Bois de Schéveningue. Oct.

A. dryophilus Bull.

Parmi les feuilles mortes. Bois de la Haye. Oct. Nov.

(Sous-genre *Mycena* Fr.)*A. pelianthinus Fr.*

Dans les bois, parmi les feuilles mortes. Sept.

A. purus Pers.

Assez commun dans les bois. Août. — Sept.

A. chlorantus Fr.

Dans une sapinière aux environs de Wassenaar. Oct.

A. luteo-albus Boll.

Sapinière dans le bois de Schéveningue. Oct.

A. lacteus P.

Parmi la mousse, dans une sapinière. Bois de Schéveningue.
Oct.

A. rugosus Fr.

Sur les souches. Bois de la Haye. Oct.

A. galericulatus Scop.

Commun sur les souches dans les bois. Sept. — Nov.

A. polygrammus Bull.

Sur des souches. Bois de Schéveningue. Oct. — Nov.

A. alcalinus Fr.

Bois de Schéveningue. Juillet. Oct.

A. filipes Bull.

Dans les bois. Oct. — Nov.

A. acicula Schaeff.

Sous les hêtres. Bois de la Haye. Oct.

A. haematopus Pers.

Sur des souches, au bois de Schéveningue. Oct.

A. galopus Pers.

Sapinière au bois de Schéveningue. Sept.

A. epipterygius Fr.

Parmi la mousse. Bois de Schéveningue. Oct.

A. vulgaris Pers.

Sur des aiguilles de pin. Bois de Schéveningue. Sept. — Oct.

**A. stylobates Pers.*

Dans les bois, sur des débris végétaux. Naaldwijk. Sept. — Nov.

A. corticola Schum.

Parmi la mousse recouvrant des souches. Westland. Oct.

**A. hymalis Osb.*

Comme le précédent. Sept. — Déc.

(Sous-genre *Omphalia Fr.*)

A. pyxidatus Bull.

Dans l'herbe, au bord des chemins. Bois de Schéveningue, Westland. Juill. — Oct.

A. hepaticus Batsch.

Dans les dunes, aux environs de Monster. Juill.

A. stellatus Fr.

Sur des troncs d'arbres pourrissants. Bois de Schéveningue. Oct.

A. fibula Bull.

Parmi la mousse, dans les endroits ombragés. Juillet. — Oct.

(Sous-genre *Pleurotus Fr.*)

**A. corticatus Fr.*

Sur les troncs d'arbres. Westland. Automne.

**A. dryinus Pers.*

Comme le précédent.

A. ulmarius Bull.

Sur le tronc d'un orme. Westland. Oct.

A. ostreatus Jacq.

Sur le tronc d'un hêtre. Bois de la Haye. Nov.

A. applicatus Batsch.

Sur du bois pourri. Westland. Oct.

A. perpusillus Fr.

Sur des débris végétaux dans les bois. Loosduinen. Août.

Série B. Rhodosporées.(Sous-genre *Volvaria* Fr.)**A. volvaceus** Bull.

Dans un bois de bouleaux, près de Loosduinen. Août.

A. speciosus Fr.

Bois de la Haye, Westland. Août.

A. Taylori Berk.

Au bord d'un fossé, au bois de la Haye. Mai.

A. gloiocephalus D. C.Dans l'herbe au bord d'un chemin, aux environs de la Haye.
Mai.(Sous-genre *Pluteus* Fr.)**A. cervinus** Schaeff.

Commun sur les souches dans les bois. Mai—Oct.

(Sous-genre *Entoloma* Fr.)**A. clypeatus** L.

Dans l'herbe au bord d'un chemin. Sept.

A. rhodopolius Fr.Dans les bois, sous les arbres. Westland, bois de la Haye, etc.
Sept.**A. sericeus** Bull.

Sur un talus herbeux, au bois de Schéveningue. Sept.

A. nidorosus Fr.Dans l'herbe au bord d'un chemin ombragé aux environs de
la Haye. Oct.(Sous-genre *Leptonia* Fr.)**A. anatinus** Lasch.

Dans l'herbe aux endroits découverts. Westland. Août.

A. euchrous Pers.

Sur une souche d'aune aux environs de Waalsdorp. Oct.

(Sous-genre *Nolanea* Fr.)**A. pascuus** Schaeff.

Assez commun dans les endroits humides parmi le gazon. Sept.

(Sous-genre *Claudopus* Fr.)*A. variabilis* Pers.

Sur les feuilles mortes et le bois pourrissant. Westland, bois de la Haye etc. Août—Nov.

A. byssisedus Pers.

Sur un tronc de hêtre aux environs de Waalsdorp. Oct.

Série C. Ochrosporeés.(Sous-genre *Pholiota* Fr.)*A. praecox* Pers.

Dans l'herbe au bord des chemins. Bois de Scheveningue. Mai.

A. radicosus Bull.

Route de Leiden. Sept.

A. aurivellus Batsch.

Au pied des arbres. Westland.

A. squarrosus Müll.

En touffes au pied des arbres. Bois de la Haye. Westland. Sept.—Oct.

A. destruens Brond.

Sur des troncs de peuplier, aux environs de Wassenaar. Oct.

A. spectabilis Fr.

Au pied des arbres. Westland. Oct.—Nov.

A. mutabilis Schaeff.

Commun sur les souches dans les bois. Août—Nov.

(Sous-genre *Inocybe* Fr.)*A. lanuginosus* Bull.

Dans un petit bois, près de Wassenaar. Sept.

A. lacerus Fr.

Sapinière au bois de Schéveningue. Sept.

A. fastigiatus Schaeff.

Bois de Schéveningue. Sept.

A. Godeyi Gill.

Dans un jardin. Bois de la Haye.

A. rimosus Bull.

Commun dans les bois en automne.

A. destrictus Fr.

Dans l'herbe, au bord des chemins. Bois de la Haye. Sept.

A. geophyllus Sow.

Commun dans les bois. Automne.

A. lucifugus Fr.

Au bord d'un chemin. Bois de la Haye. Sept.

(Sous-genre *Hebeloma Fr.*)

A. fastibilis Fr.

Bois de Schéveningue, Westland. Sept.—Nov.

A. sinapizans Fr.

Bois de Schéveningue. Sept.

A. crustuliformis Bull.

Commun dans les bois. Août—Oct.

A. longicaudus Pers.

Bois de Schéveningue. Oct.

(Sous-genre *Flammula Fr.*)

**A. lentus Pers.*

Sous un lilas, au milieu d'une touffe de *Marasmius Rotula*. Naaldwyk. Sept.

A. penetrans Fr.

Dans une sapinière au bois de Schéveningue, sur la terre. Août.

(Sous-genre *Naucoria Fr.*)

A. abstrusus Fr.

Dans l'herbe au bord d'un chemin à Loosduinen. Août.

A. pediades Fr.

Dans une prairie, aux environs de Monster. Août.

A. semi-orbicularis Bull.

Commun dans l'herbe, au bord des chemins. Août—Oct.

(Sous-genre *Galera Fr.*)

A. tener Schaeff.

Commun dans l'herbe au bord des chemins. Sept.—Nov.

A. hypnorum Fr.

Westland. Bois de Schéveningue. Sept.—Nov.

(Sous-genre *Tubaria.*)

A. furfuraceus Pers.

En groupes sur des débris végétaux. Bois de la Haye.
Sept.—Oct.

(Sous-genre *Crepidotus Fr.*)

A. mollis Schaeff.

Sur du bois pourrissant. Bois de la Haye. Sept.

Série D. Pratelleés.

(Sous-genre *Psalliota Fr.*)

A. arvensis Schaeff.

Dans une prairie, aux environs de Wassenaar. Oct.

A. campestris L.

Dans les prairies, aux environs de Schéveningue, Wassenaar
et dans le Westland. Août—Oct.

var. *praticola Vitt.* Westland.

var. *sylvicola Vitt.* Commun dans les bois.

(Sous-genre *Stropharia Fr.*)

A. aeruginosus Curt.

Assez fréquent dans les bois. Août—Oct.

A. stercorarius Fr.

Sur du fumier de vache. Dunes de Schéveningue. Sept.

A. semiglobatus Batsch.

Commun partout sur le fumier. Sept.—Nov.

(Sous-genre *Hypholoma* Fr.)

- A. sublateritius* *Schaeff.*
 Au pied des arbres. Bois de la Haye. Août., Sept.
- A. elaeodes* *Fr.*
 Partout au pied des arbres. Automne.
- A. fascicularis* *Huds.*
 Commun dans les bois sur les souches. Automne.
- A. lacrymabundus* *Fr.*
 En touffes au pied des arbres. Westland. Oct.
- A. velutinus* *Pers.*
 Dans les bois aux environs de la Haye. Sept.—Oct.
- A. Candolleanus* *Fr.*
 Bois de la Haye. Bois de Schéveningue. Sept.
- A. appendiculatus* *Bull.*
 Commun au pied des arbres dans les bois. Août—Nov.

(Sous-genre *Psilocybe* Fr.)

- A. bullaceus* *Bull.*
 Sur du fumier de cheval dans les dunes de Wassenaar.
- **A. callosus* *Fr.*
 Dans l'herbe, au bord des chemins. Naaldwijk. Oct.
- A. spadiceus* *Fr.*
 Parmi les feuilles mortes, au bois de la Haye. Oct.
- A. foenisecii* *Pers.*
 Dans un jardin, au bois de la Haye. Août.

(Sous-genre *Psathyra* Fr.)

- A. corrugis* *Pers.*
 Bois de la Haye. Oct.
- A. obtusatus* *Fr.*
 Au pied des arbres. Bois de la Haye. Oct.—Nov.

Série E. Coprinariées.(Sous-genre *Panaeolus Fr.*)**A. separatus L.**

Dans les prairies, sur du fumier de vache, Westland. Oct.

A. fimiputris Bull.

Dans les prairies, sur le fumier. Westland. Août—Oct.

A. campanulatus L.

En troupes dans les bois, Août—Oct.

A. papilionaceus Fr.

Au bord d'un chemin. Bois de la Haye, Sept.

***A. acuminatus Fr.**

Dans les prairies, au bord des chemins, etc. Westland.

A. fimicola Fr.

Sur du fumier de cheval. Westland. Août.

(Sous-genre *Psathyrella Fr.*)**A. hiascens Bull.**

Au bord d'un chemin, aux environs de Waalsdorp. Juillet.

A. atomatus Fr.

Assez commun partout au bord des chemins. Juill. Sept.

A. disseminatus Pers.En touffes au pied des arbres et sur les souches. Westland.
Bois de la Haye. Sept.**Genre Coprinus Pers.****C. comatus Fr.**Assez fréquent au bord du chemin. Bois de la Haye.
Juill.—Oct.**C. ovatus Fr.**

Bois de la Haye. Westland. Sept.

C. atramentarius Fr.

En touffes au bois de la Haye et dans le Westland. Août—Oct.

C. extincorius Fr.

Au bord d'un chemin. Bois de la Haye. Sept.

C. niveus Fr.

Sur du fumier dans une prairie aux environs de Loosduinen.
Août.

C. micaceus Fr.

Commun partout. Août—Oct.

**C. deliquescens Fr.*

En touffes parmi les feuilles mortes dans les bois. Westland.
Sept.—Oct.

C. digitalis Fr.

Route de Leiden. Sept.

**C. Trappennii Oud.*

Sur des ramilles, Naaldwyk. Août.

**C. lagopus Fr.*

Dans les champs, le long des chemins etc. Westland. Sept., Oct.

**C. radiatas Fr.*

En groupes sur du fumier de vache. Westland. Juillet—Sept.

C. stercorarius Fr.

Sur du fumier de cheval, aux environs de Monster. Sept.—Oct.

C. ephemerus Fr.

Sur du fumier aux environs de Rijswijk. Sept.

C. plicatilis Fr.

Au bord des chemins, dans les champs et les bois. Westland, bois de la Haye, Wassenaar, etc.

Genre *Bolbitius Fr.**B. hydrophilus Bull.*

Bois de Schéveningue. Sept.

B. vitellinus Fr.

Sur du fumier de cheval, aux environs de Loosduinen.

Genre *Cortinarius Fr.*

(Sous-genre *Phlegmacium Fr.*)

C. emollitus Fr.

Bois de la Haye. Août.

(Sous-genre *Myxadium* Fr.)**C. collinitus* Fr.

Bois de la Haye, parmi les feuilles mortes.

(Sous-genre *Inoloma* Fr.)*C. cinereo-violaceus* Fr.

Dans un petit bois, aux environs de Waalsdorp. Sept.

C. albo-violaceus Fr.

Environs de Wassenaar. Oct.

C. callisteus Fr.Dans le gazon au bord d'un chemin près du bois de la Haye.
Sept.(Sous-genre *Dermocybe* Fr.)*C. cinnamomeus* Fr.

Sous les sapins. Ryswyk-Westland. Sept.

C. raphanoides Fr.

Dans les bois aux environs de Wassenaar. Sept.—Oct.

(Sous-genre *Telamonia* Fr.)*C. torvus* Fr.

Dans les bois aux environs de Wassenaar. Sept.

C. incisus Fr.

Route de Leiden. Oct.

(Sous-genre *Hydrocybe* Fr.)**C. subferrugineus* Fr.

Croît en troupes dans les bois, les vergers etc. Westland.

C. armeniacus Fr.

Sapinière dans le bois de Schéveningue. Août.

C. dilutus Fr.

Dans un petit bois aux environs de Waalsdorp.

Genre *Gomphidius* Fr.*G. glutinosus* Fr.

Sous les sapins, aux environs de Wassenaar. Automne.

G. roseus Fr.

Sapinière dans le bois de Schéveningue. Sept.

G. viscidus Fr.

Sous les pins, dans le bois de Schéveningue. Sept.

Genre Paxillus Fr.**P. involutus Fr.**

Commun partout. Juill.—Oct.

P. atrotomentosus Fr.

Bois de la Haye. Sept.

Genre Hygrophorus Fr.**H. hypothejus Fr.**

Sapinière au bois de Schéveningue. Oct.

***H. pratensis Fr.**

Dans les prairies, en groupes. Westland. Sept.—Oct.

H. virgineus Fr.

Dans les prairies. Westland. Sept.—Oct.

H. niveus Fr.

Dans les dunes et les prairies. Westland. Oct.—Nov.

H. ceraceus Fr.

Parmi la mousse. Route de Leiden. Août.

***H. coccineus Fr.**

Parmi la mousse, dans les endroits humides Westland. Juill.—Oct.

H. miniatus Fr.

Dans l'herbe, au bord des chemins. Westland. Bois de la Haye. Oct.

H. conicus Fr.

Commun dans les prairies du Westland. Août—Oct.

***H. chlorophanus Fr.**

Dans les prairies, en automne. Westland.

H. psittacinus Fr.

Genre *Lactarius* Fr.*L. torminosus* Fr.

Dans les bois, aux environs de Wassenaar et dans le Westland
Sept.

L. turpis Fr.

Assez commun dans les bois. Sept.—Oct.

L. insulsus Fr.

Dans l'herbe, au bord d'un chemin. Bois de Schéveningue
Août.

L. blennius Fr.

Commun dans les bois. Sept.—Oct.

•*L. flexuosus* Fr.

Route de Leiden. Juillet—Oct.

L. pyrogalus Fr.

Bois aux environs de Wassenaar. Oct.

L. chrysoreus Fr.

Bois de Schéveningue. Sept.

L. piperatus Fr.

Commun dans les bois. Sept.—Oct.

L. vellereus Fr.

Au bord d'un chemin, aux environs de Wassenaar.

L. deliciosus Fr.

Sapinière dans le bois de Schéveningue. Juill.—Oct.

L. quietus Fr.

Assez commun dans les bois. Août.

L. thejogalus Fr.

Dans les bois. Loosduinen. Oct.

L. vietus Fr.

Dans les bois, à Wassenaar. Oct.

L. rufus Fr.

Sapinière dans le bois de Schéveningue. Sept.—Oct.

L. subdulcis Fr.

Commun dans les bois. Automne.

Ned. Kruidk. Archief. V. 3de Stukje.

Genre *Russula Pers.*

R. nigricans Fr.

Assez fréquent dans les bois. Juill.—Oct.

R. adusta Fr.

Bois de la Haye. Sept.

R. delicata Fr.

Dans un jardin, au bois de la Haye. Août.

R. furcata Fr.

Dans les bois des environs de la Haye Août—Sept.

R. lepida Fr.

Bois de la Haye. Juill.

R. rubra Fr.

Assez commun dans les bois. Oct.

R. foetens Fr.

Très commun dans les bois. Sept.—Nov.

R. emetica.

Bois de Schévéningue. Sept.

R. ochroleuca Fr.

Route de Leiden. Sept.

R. fragilis Fr.

Commun dans les bois et les sapinières Août—Oct.

R. integra Fr.

Dans les bois. Sept.—Oct.

R. aurata Fr.

A Wassenaar, dans les bois. Sept.

R. nitida Fr.

Parmi la mousse au bois de Schévéningue. Oct.

R. alutacea Fr.

Sous les hêtres, aux environs de Rijswijk.

Genre *Cantharellus Adam.*

C. cibarius Fr.

Croît en groupes dans les bois Juill.—Sept.

C. aurantiacus Fr.

Aux environs de Wassenaar en dans le Westland. Août.

C. muscigenus *Fr.*

Dans les dunes, parmi la mousse, aux environs de Schéveningue. Sept.

***C. retirugus** *Fr.*

Dans les bois, parmi la mousse, aux endroits humides. Août.—Oct.

Genre Marasmius. *Fr.***M. urens** *Fr.*

Parmi les feuilles mortes, dans les bois. Sept.—Oct.

M. peronatus *Fr.*

Comme le précédent. Août—Sept.

M. oreades *Fr.*

Commun dans les dunes et les prairies. Oct.

M. archyropus *Fr.*

Parmi les feuilles mortes, au bois de la Haye. Juill.—Oct.

M. scorodoni *Fr.*

Fréquent dans les bois. Sept.—Oct.

M. ramealis *Fr.*

Sur des branches tombées au bois de la Haye. Oct.

M. rotula *Fr.*

Sur les feuilles mortes et les débris végétaux, au bois de la Haye. Avril—Oct.

M. androsaceus *Fr.*

Sur les feuilles mortes, au bois de Haye. Avril—Oct.

M. perforans *Fr.*

Sapinière au bois de Schéveningue. Août.—Oct.

***M. saccharinus** *Fr.*

Sur des ramilles. Naaldwijk. Août.

M. epiphyllus *Fr.*

Sur des débris végétaux, au bois de la Haye. Sept.

***M. spodoleucus** *Berk.*

Sur des ramilles, dans les bois. Naaldwijk.

Genre Lentinus Fr.**L. tigrinus Fr.**

Sur des poutres et des troncs. Westland. Juill.

Genre Panus Fr.**P. stipticus Fr.**

Commun partout sur les souches et les troncs. Toute l'année.

Genre Lenzites Fr.**L. betulina Fr.**Commun pendant tout l'année sur les souches et les troncs.
Westland, Bois de Schéveningue, etc.**L. saepiaria Fr.**

Sur un tronc de sapin abattu à Monster. Mai.

***L. abietina Fr.**

Sur les planches et les poutres de bois de sapin. Westland.

Famille Polyporées.**Genre Boletus L.****B. luteus L.**Dans les sapinières, à Wassenaar et au bois de Schéveningue.
Août.—Oct.**B. flavus With.**

Sapinière dans le bois de Schéveningue. Sept.

B. flavidus Fr.

Bois de Schéveningue. Août.—Sept.

B. granulatus L.

Sapinière dans le bois de Schéveningue. Juin—Oct.

B. bovinus L.

Sapinière près de Wassenaar. Sept.

B. badius Fr.

Dans les bois et les sapinières. Westland, Bois de Schéveningue. Juill.—Oct.

B. chrysenteron Fr.

Commun dans les bois. Sept.—Oct.

- B. subtomentosus** *L.*
Bois de Schéveningue et de la Haye. Sept.—Oct.
- B. parasiticus** *Bull.*
Sur *Scleroderma vulgare*, au bois de la Haye. Sept.
- B. pachypus** *Fr.*
Sous les pins, près de Wassenaar. Sept.
- B. edulis** *Bull.*
Assez fréquent dans les bois et les dunes des environs de la Haye. Juill.—Oct.
- B. luridus** *Schaeff.*
Dans les dunes près de Monster. Août.
- B. scaber** *Fr.*
Commun dans les bois. Juill.—Oct.
- B. felleus** *Bull.*
Sous les pins, à Wassenaar et dans le Westland. Juill.—Oct.
- B. cyanescens** *Bull.*
Dans les dunes des environs de Monster. Sept.
- B. castaneus** *Bull.*
Dans les bois des environs de Wassenaar.

Genre *Fistulina* Bull.

- F. hepatica** *Fr.*
Sur les troncs des vieux chênes. Bois de la Haye. Westland.
Bois de Schéveningue. Août—Nov.

Genre *Polyporus* Fr.

A. *Mesopus*.

- P. perennis** *Fr.*
Dans les dunes, aux environs de Wassenaar. Sept.

B. *Pleuropus*.

- P. squamosus** *Fr.*
Sur les troncs de différents arbres Loosduinen, Rijswijk. Août.
- P. picipes** *Fr.*
Sur les troncs et les souches de hêtre aux environs de Wassenaar. Sept.—Oct.

P. varius Fr.

Sur des souches et des pieux. Westland. Juill.—Oct.

C. Merisma.

P. frondosus Fr.

Sur les troncs des vieux arbres. Août—Oct. Bois de la Haye.

**P. giganteus Fr.*

Au pied des vieux troncs d'arbres. Naaldwijk. Oct.

P. sulphureus Fr.

Sur des souches. Wassenaar. Westland. Août.

**P. salignus Fr.*

Au pied des vieux saules. Westland. Août.

D. Apus.

**P. tephroleucus Fr.*

Sur du bois pourri, dans les dunes près de la Haye. Oct.

P. destructor Fr.

Sur un pont au bois de la Haye. Oct.

**P. croceus Fr.*

Sur les troncs des vieux chênes. Westland. Oct.

P. nidulans Fr.

Sur des souches de bouleaux. Bois de la Haye, bois de Schéveningue. Août—Oct.

**P. fumosus Fr.*

Sur des souches et des pieux. Naaldwijk. Oct.

P. adustus Fr.

Commun sur les troncs et les souches. Westland. Juin—Oct.

P. hispidus Fr.

Sur des souches. Westland. Bois de Schéveningue. Juill.—Oct.

P. cuticularis Fr.

Sur des troncs de hêtre, au bois de la Haye.

P. fomentarius Fr.

Sur des troncs de bouleaux, aux environs de Monster et au bois de la Haye. Mai—Oct.

P. igniarius Fr.

Sur les troncs de différents arbres. Commun aux environs de la Haye.

**P. conchatus Fr.*

Sur différents arbres. Westland. Sept.—Oct.

**P. Ribis Fr.*

A la base des troncs des vieux groseillers. Westland. Sept.—Oct.

P. salicinus Fr.

Sur les troncs des saules. Westland, Rijswijk.

**P. marginatus Fr.*

Sur des pieux et des poutres. Westland. Sept.—Oct.

P. radiatus Fr.

Sur des souches de bouleaux. Westland. Sept.

**P. cryptarum Fr.*

Sur une planche de sapin vermoulue 's-Gravesande. Août.

P. hirsutus Fr.

Sur les branches de différents arbres Westland, Wassenaar. Août.

P. velutinus Fr.

Sur un tronc de bouleau, au bois de Schéveningue. Juill.

P. zonatus Fr.

Sur les souches et les troncs d'arbres. Westland. Bois de Schéveningue. Sept.

P. versicolor Fr.

Commun partout sur les souches, les pieux etc. Avril—Nov.

P. abietinus Fr.

Sur du bois de sapin, aux environs de Wassenaar. Juill.—Sept.

*E. Resupinati.**P. ferruginosus Fr.*

Sur des branches tombées, au bois de la Haye. Sept.

P. Medulla-panis Fr.

Sur du bois pourri Westland. Bois de la Haye.

P. mucidus *Fr.*

Sur du bois de chêne pourri, au bois de Schéveningue. Février.

P. obducens *Pers.*

Sur des souches, des palissades, etc. Bois de la Haye. Westland.

P. vulgaris *Fr.*

Commun sur les troncs pourris au bois de Schéveningue.

P. molluscus *Fr.*

Sur du bois pourrissant. Bois de Schéveningue. Oct.

P. vaporarius *Pers.*

Commun dans les bois sur les branches tombées.

Genre Trametes. *Fr.***T. gibbosa** *Fr.*

Sur les vieux troncs d'arbres. Rijswijk. Sept.

T. suaveolens *Fr.*

Sur les troncs d'arbres. Westland. Avril—Nov.

Genre Daedalea. *Pers.***D. quercina** *Pers.*

Sur un tronc de chêne aux environs de Monster. Août.

D. unicolor *Pers.*

Sur des troncs d'arbres au bois de Schéveningue. Juill.—Oct.

Genre Merulius. *Fr.****M. corium** *Fr.*

Sur le bois pourrissant et les vieux troncs d'arbres. Westland.

M. aurantiacus *Klotsch.*

Sur l'écorce du hêtre. Westland. Mai.

***M. molluscus** *Fr.*

Sur du bois de sapin pourrissant. Naaldwijk. Déc.

M. lacrymans *Fr.*

Sur des troncs abattus dans les endroits humides. Août Westland.

Genre Solenia. *Hoffm.***S. anomala** *Fr.*

Sur des branches de peuplier décortiquées. Dunes de Schéveningue. Westland. Mai—Sept.

S. amoena Oud.

Sur les branches décortiquées du peuplier. Bois de Schéveningue. Dec.

Famille Hydneés.

Genre Hydnum. L.

H. ferrugineum Fr.

Sous les pins, aux environs de Rijswijk. Oct.

H. zonatum Batsch.

Sapinière au bois de Schéveningue. Oct.

H. melaleucum Fr.

Au bord d'un chemin, près du bois de la Haye. Oct.

H. auriscalpium L.

Sur les cônes de pins tombés. Bois de Schéveningue. Avril — Oct.

**H. farinaceum* Pers.

Sur du bois de pin pourrissant. Westland. Oct.

H. argutum Fr.

Sur du chêne pourrissant, au bois de Schéveningue. Oct.

Genre Sistotrema. Pers.

**S. confluens* Fr.

Sur une pelouse, à Naaldwijk. Août.

**S. carneum* Bon.

Avec le précédent.

Genre Irpex. Fr.

I. obliquus Fr.

Sur les branches tombées du hêtre.

Genre Radulum. Fr.

R. quercinum Fr.

Sur des branches de chêne tombées. Westland. Août.

R. laetum Fr.

Sur des branches tombées, aux bois de la Haye. Mai.

Genre Phlebia. Fr.

P. radiata Fr.

Sur l'écorce du bouleau, au bois de Schéveningue. Dec.

Genre Grandinia. Fr.**G. crustosa Fr.**

Sur le bois de l'*Evonymus Europaeus*. Bois de Schéveningue. Nov.

Genre Odontia Pers.**O. cristulata Fr.**

Sur du bouleau. Wassenaar. Bois de la Haye. Nov.

Famille Théléphorées.**Genre Thelephora Ehrh.****T. caryophyllea Pers.**

Dans les dunes de Wassenaar et au bois de Schéveningue. Août—Sept.

T. terrestris Fr.

Bois de Schéveningue. Août—Sept.

T. cristata Fr.

Sur la terre, les feuilles, la mousse etc. Bois de Schéveningue.

Genre Stereum Pers.**S. purpureum Pers.**

Commun sur les troncs abattus dans les bois.

S. hirsutum Fr.

Sur des souches. Bois de la Haye, Westland, etc.

S. sanguinolentum Fr.

Sur des troncs de pin abattus, au bois de Schéveningue. Sept.

S. rubiginosum Fr.

Sur des souches. Westland, bois de Schéveningue.

***S. tabacinum Fr.**

Sur les troncs d'arbres. Naaldwijk. Mai—Nov.

Genre Corticium Fr.**C. giganteum Fr.**

Sur des branches tombées, dans une sapinière, au bois de Schéveningue. Mars.

C. lacteum Fr.

Sur les branches tombées. Westland. Bois de Schéveningue. Oct.—Nov.

C. laeve Pers.

Commun sur les branches tombées dans les bois.

C. roseum Pers.

Sur les branches tombées du frêne, au bois de la Haye.

C. calceum Fr.

Sur des branches mortes, au bois de Schéveningue.

C. lividum Pers.

Sur les branches tombées du bouleau, au bois de Schéveningue. Oct.

C. quercinum Fr.

Commun sur les branches mortes du chêne.

C. cinereum Fr.

Sur des branches tombées au bois de Schéveningue.

C. incarnatum Fr.

Sur des branches décortiquées, au bois de la Haye.

C. nudum Fr.

Sur des branches mortes, au bois de la Haye. Mai.

C. polygonium Pers.

Sur les branches tombées du peuplier. Dunes de Schéveningue.

C. comedens Fr.

Sur les branches mortes. Bois de Schéveningue. Westland.

C. Sambuci Fr.

Sur les vieux troncs des sureaux. Bois de la Haye. Westland. Hiver.

Genre Cyphilla Fr.*C. ampla Lév.*

Sur les branches tombées, surtout sur celles du peuplier. Bois de Schéveningue. Hiver.

**C. laeta Fr.*

Sur des débris végétaux, à Naaldwijk.

Famille Clavariées.**Genre Clavaria L.***C. flava. Schaeff.*

Dans les dunes de Schéveningue.

C. fastigiata Bull.

Au bord d'un fossé, près de Loosduinen. Sept.

C. muscoides L.

Dans les dunes du Westland. Oct.—Nov.

C. cinerea Bull.

Sur un talus, au bois de la Haye. Sept.

C. Kunzei Fr.

Au bord d'un fossé, aux environs de Wassenaar. Sept.

C. formosa Pers.

Bois de la Haye. Sept.—Oct.

**C. stricta Pers.*

Au pied des vieux arbres. Naaldwijk. Sept.—Oct.

C. inaequalis Fr.

Au bord d'un fossé, parmi le gazon. Rijswijk.

**C. argillacea Fr.*

Dans les dunes, aux endroits herbeux et parmi la mousse.
Naaldwijk. Sept.—Oct.

C. fragilis Holmsk.

Au bord d'un fossé, parmi le gazon. Rijswijk. Oct.

**C. contorta Holmsk.*

Sur les ramilles à Naaldwijk.

C. fistulosa Fr.

Sur des branches tombées, au bois de la Haye. Oct.

Genre *Typhula Fr.**T. gyrans Fr.*

Sur les feuilles tombées, dans les bois près de Wassenaar. Oct.

Genre *Pistillaria Fr.**P. quisquiliaris Fr.*

Sur des éclats de bois. Bois de la Haye, Sept.

Sous-ordre Trémellinées.

Genre *Tremella Fr.***T. fimbriata Pers.*

Sur les vieux troncs et les branches mortes de l'aune Westland. Sept.—Oct.

T. foliacea Pers.

Sur les branches mortes du chêne. Westland. Oct.—Nov.

T. mesenterica Retz.

Sur les branches mortes du chêne. Westland, bois de Schéveningue. Hivér.

T. intumescens Sow.

Sur les branches mortes du bouleau. Bois de Schéveningue. Mai

T. albida Huds.

Sur les branches tombées du hêtre, bois de la Haye. Automne.

T. violacea Relh.

Sur des branches tombées, au bois de Schéveningue. Mai.

Genre Exidia Fr.**E. glandulosa Fr.**

Sur les branches mortes du chêne. Bois de Schéveningue. Wassenaar Westland. Oct.—Jan.

Genre Auricularia Bull.**A. sambucina Mart.**

Sur les troncs des vieux sureaux, au bois de la Haye. Sept.

A. mesenterica Pers.

Sur un tronc d'arbre, au bois de la Haye. Oct.

Genre Naematelia Fr.**N. virescens Cda.**

Sur les tiges du *Sarothamnus Scoparius*, aux environs de Loosduinen. Avril.

Genre Calocera Fr.**C. cornea Fr.**

Sur des éclats de bois. Westland, Wassenaar, bois de la Haye.

Sous-ordre Gastéromycètes**Famille Lycoperdaceés.****Genre Lycoperdon Tournef.****L. caelatum Bull.**

Bois de Schéveningue. Août.

L. pusillum *Fr.*

Dans les prairies et les dunes du Westland. Sept.—Oct.

L. Bovista *L.*

Commun dans les prairies du Westland. Août—Oct.

L. aestivale *Bon.*

Dunes près de Loosduimen.

L. gemmatum *Batsch.*

Dans les dunes près de Wassenaar. Août.

L. perlatum *Pers.*

Tres commun dans les prairies du Westland. Oct.—Nov.

L. echinatum *Pers.*

Sapinières dans le bois de Schéveningue et à Wassenaar.
Août—Novembre.

***L. papillatum** *Schaeff.*

Westland.

L. pyriforme *Schaeff.*

Dans les dunes de Wassenaar.

Genre Bovista *Pers.***B. nigricans** *Pers.*

Bois de Schéveningue, Westland. Août.

B. plumbea *Pers.*

Dans les prairies du Westland et au bois de Schéveningue.
Août—Sept.

Famille Tulostomées.**Genre Tulostoma** *Pers.***T. mammosum** *Fr.*

Commun dans les dunes. Sept.—Nov.

Famille Sclerodermées.**Genre Scleroderma** *Pers.***S. vulgare** *Fr.*

Commun dans les bois.

S. verrucosum *Pers.*

Bois de la Haye, bois de Schéveningue. Août.

Famille Geastridées.

Genre Geaster *Micheli*.*G. coliformis Pers.*

Dans les dunes près de Monster. Oct.

G. Schmideli Vitt.

Dans les dunes. Schéveningue, Monster, Wassenaar. Oct.—Nov.

G. vulgatus Vitt.

Dans les dunes, près de Monster. Sept.—Oct.

G. mammosus Fr.

Dunes près de Monster, Oct.—Nov.

G. triplex Jungh.

Bois de la Haye, Bois de Schéveningue. Oct.

Famille Phalloidées.

Genre Phallus. *Micheli*.*P. impudicus L.*

Bois de Schéveningue. Août.

P. caninus Huds.

Sous les hêtres, au bois de la Haye. Sept.—Oct.

Famille Nidulariaceés.

Genre Crucibulum *Tul.**C. vulgare Tul.*

Sur les aiguilles du pin et les branches mortes. Wassenaar.
Rijswijk. Oct.

Genre Cyathus. *Haller*.*C. striatus Hoffm.*

Sur les débris végétaux. Rijswijk, Naaldwijk. Sept.—Oct.