

Kokmeeuwen *Larus ridibundus* de boom in

Peter Venema

Het voorjaar van 1996 kenmerkte zich onder andere door enorme aantallen rupsen van de Groene Eikebladroller *Tortrix viridana* en de Kleine Wintervlinder *Operophtera brumata*. Met miljoenen tegelijk vraten deze rupsjes zich door hele percelen eikenbos, wegbeplanting, brinken en tuinen. Vanaf de laatste decade van mei haalde dit verschijnsel alle kranten want hoewel deze 'rupsen-plaag' een jaarlijks terugkerend verschijnsel is, zó massaal als in 1996 was toch bijzonder.

Voor veel rupsenetende vogels was Drenthe in deze periode een luilekkerland. Spreeuwen uiteraard, maar ook mezen, kwikstaarten, Merels en Zwarte Kraaien profiteerden volop. Ook minder voor de hand liggende vogelsoorten wisten deze voedselbron te exploiteren. De Kokmeeuw bijvoorbeeld.

Op 10 juni zag ik een drietal Kokmeeuwen op deze rupsen foerageren. Het betrof één adulte vogel en twee dieren in het tweede kalenderjaar. De vogels vlogen 's morgens om half acht rond bij de wegbeplanting ten noorden van het Bongveen (km-hok 12-23-11) bij Bunne. De wegbeplanting is hier ongeveer 30 jaar oud en bestaat uit verschillende boomsoorten, vooral zomereik, maar ook berk, lijsterbes, vogelkers en meidoorn. De waargenomen meeuwen vlogen ter hoogte van de boomkruinen (6-10 m) systematisch van boom tot boom en bleven boven elke top ongeveer 5-10 sec 'bidden'. Daarbij pikten ze de rupsen uit de boom, meestal in de vlucht, soms tijdens een korte landing in de boomtoppen. Nadat een traject van zo'n 30 bomen was afgewerkt (min of meer tegen de wind in), vlogen de vogels terug naar het beginpunt en volgden de hele procedure opnieuw.

Van Kokmeeuwen is algemeen bekend dat ze in de vlucht op insecten foerageren (denk maar eens aan zwermende mieren). Dat deze vogels ook rupsen uit de boomtoppen pikken, was mij uit eigen observatie nog niet bekend.

Summary: Black-headed Gulls *Larus ridibundus* feeding on caterpillars in trees

An adult and two 2nd calendar year Black-headed Gulls systematically searched tree tops for caterpillars of *Tortrix viridana* and *Operophtera brumata*, while flying against the wind. Both species of caterpillars had an outbreak in May and June 1996, and were pecked from the tree tops after short hovering sessions by the gulls. Every once in a while, the gulls even landed briefly to collect a caterpillar. This procedure was repeated after the gulls had reached the end of the tree line.

Adres: Poelakkers 1, 9321 EW Peize.