

Niels Dingemanse vertelde vervolgens van de libellensoorten die hij op het waddeneiland Terschelling heeft waargenomen.

Niels Dingemanse (samengevat door Willem-Jan Hoeffnagel)

Libellen op Terschelling

Verspreid over Terschelling liggen een aantal wateren en vlakke duinvalleien (zogenaamde plakken). Van Dodemanskisten is op libellengebied het meest bekend. Ook bij de Kroonspolders zijn veel libellen waargenomen. Op de bekende Bosplaat vinden we echter maar weinig soorten en aantallen. Dit komt waarschijnlijk door de omstandigheden die voor libellen erg ongunstig zijn: zout, harde wind, de invloed van eb en vloed.

De volgende soorten zijn gedurende een aantal jaren waargenomen: *Ischnura elegans* (zeer algemeen), *Enallagma cyathigerum* (minder algemeen),

Aeshna cyanea (voor het eerst op het eiland in 1988?), *Aeshna mixta*, *Lestes dryas*, *Lestes barbarus*, *Sympetrum sanguineum* en *Sympetrum flaveolum*. Opvallend werd de afwezigheid van *Orthetrum cancellatum* genoemd. De volgende soorten zijn als echte soorten van Terschelling aangeduid: *Aeshna cyanea*, *Enallagma cyathigerum*, *Ischnura elegans*, *Lestes dryas*, *Lestes sponsa* en *Lestes viridis*.

De eindconclusie kan zijn, dat Terschelling een eiland is met erg weinig soorten waar wél veel zwerfers voorkomen.