

WAARNEMINGEN VAN AFWIJKEND GETEKENDE GRAUWE PIJLSTORMVOGELS *PUFFINUS GRISEUS*

In het najaar van 1984 werden bij Camperduin, Noord-Holland, bij twee gelegenheden Grauwe Pijlstormvogels *Puffinus griseus* waargenomen met een afwijkende tekening van de onderdelen. Het gaat om een exemplaar waargenomen op 25 augustus door de eerste auteur en een exemplaar op 6 oktober door beide auteurs en enkele andere waarnemers.

De eerste vogel werd op een afstand van minder dan 100 meter en onder ideale omstandigheden gezien (kalme zee, zon, mooi licht). De tweede vogel werd op ca. 700 meter waargenomen tijdens zwaar weer, maar ook dit dier was goed zichtbaar. Bij beide vogels werden op de buik, vooral juist onder de vleugel-inplant, lichte vlekken waargenomen wat de indruk van een lichte buik opleverde. Bij normaal gekleurde Grauwe Pijlstormvogels is de buik egaal donkerbruin.

Verwarring met Mediterrane Pijlstormvogels *Puffinus puffinus mauretanicus* of *P.p.yelkouan* kan gemakkelijk optreden, zeker als de vogel niet onder goede waarnemingscondities wordt gezien. Dit bleek ook bij de tweede vogel, op 6 oktober, toen diverse waarnemers het dier in eerste instantie als een West-mediterrane Pijlstormvogel determineerden. Iedereen was het er tenslotte over eens dat het hier (weer) om een afwijkend gekleurde Grauwe Pijlstormvogel

ging, op grond van de grootte, de 'jizz' en de tekening van kop en onder-vleugels. Waarnemers dienen dus beducht te zijn voor afwijkend gekleurde Grauwe Pijlstormvogels.

In de literatuur en bij diverse zeetrekwaarnemers zijn geen waarnemingen bekend van afwijkend getekende Grauwe Pijlstormvogels. Het is dan ook niet bekend met wat voor frequentie dergelijke afwijkingen voorkomen. Soortgelijke waarnemingen worden met belangstelling tegemoetgezien door de auteurs.

On 25th August and 6th October 1984 aberrant Sooty Shearwaters were observed. Both birds were seen under reasonable conditions. On the belly of both birds rather unusual light spots were seen, giving the bird a light-bellied appearance. Confusion with Mediterranean Shearwaters Puffinus p. mauretanicus or yelkouan is possible and indeed, the second bird was initially mis-identified. No other observations of aberrant Sooty Shearwaters are known to us and consequently the frequency of occurrence is unknown. We would be pleased to receive similar records.

Leo Stegeman, Sander Lagerveld, Club van
Zeetrekwaarnemers
Volkerak 6, 1826 AE Alkmaar