

**ROSSE FRANJEPOOT PHALAROPUS FULICARIUS GEASSOCIEERD MET DRIETEENMEEUWEN RISSA TRIDACTYLA.**

**GREY PHALAROPE ASSOCIATED WITH KITTIWAKES.**

In oktober zijn bij Cap Gris Nez (Noord-Frankrijk) vaak een of meerdere groepen Drieteenmeeuwen *Rissa tridactyla* te vinden. Deze vogels lijken op zee te wachten tot er een vissersschip langs komt stomen of tot een van die boten zijn bijvangst en afval overboord zet.

Tijdens een zeetrekking op Cap Gris Nez op 21 oktober 1987 werd bij een van deze groepen Drieteenmeeuwen een volwassen Rosse Franjepoot *Phalaropus fulicarius* in winterkleed ontdekt. De meeuwengroep was ongeveer 50 exemplaren groot en regelmatig kwamen er nieuwe dieren bij. Hoewel het merendeel van de Drieteenmeeuwen op het water rustte, waren er ook die actief door de groep heen zwommen. Meerdere malen werd de franjepoot achter zo'n actief zwemmende Drieteenmeeuw gezien. Ziggaggend werd de Drieteenmeeuw gevolgd, terwijl de Rosse Franjepoot links en rechts naar het wateroppervlak pikte. Er werd niet gezien of deze methode veel geslaagde pogingen opleverde, maar gezien de voorliefde van de franjepoot voor deze methode lijkt dit wel aannemelijk.

Wanneer een Drieteenmeeuw stopte met zwemmen, zwom de franjepoot dadelijk naar de dichtstbijzijnde meeuw die wel actief was om daarachter verder te fourageren. Wanneer alle Drieteenmeeuwen stil dreven zwom de franjepoot naar de rand van de groep om daar door middel van de karakteristieke tollende beweging ('spinning') zelf voedsel op te wervelen. Regelmatig keek de franjepoot daarbij op, om te zien wat er bij de Drieteenmeeuwen gebeurde. Wanneer een zwemmende Drieteenmeeuw zichtbaar was zwom, of vloog, de franjepoot onmiddellijk daar heen om bij deze meeuw verder te fourageren.

Een verklaring voor de preferentie van de Rosse Franjepoot voor fourageren in het kielzog van een Drieteenmeeuw boven het zelf opwervelen van voedsel zou kunnen zijn, dat de Drieteenmeeuwen door een krachtiger zwembeweging het water meer omwoelden dat de kleine franjepoot zelf voor elkaar kreeg, zodat het succes bij het fourageren toenam. Uit de literatuur zijn voor de beide andere soorten franjepoten gevallen bekend waarbij ze (fouragerend) andere watervogels volgden. Bij de Rosse Franjepoot is dit gedrag alleen beschreven rond walvisachtigen en achter schepen (Kumlien 1879, in Bent 1927). In de literatuur werd geen beschrijving gevonden van het volgen van vogels.

*At Cap Gris Nez (Northern France) a Grey Phalarope was observed foraging in association with Kittiwakes. The bird was repeatedly seen to follow actively swimming Kittiwakes at close range, pecking to the left and right at food particles. Apparently, it was more profitable for the phalarope to feed in a Kittiwake's wake, since it preferred this method over the more usual and characteristic 'spinning' method.*

Bent, A.C. 1927. Life Histories of North American Shorebirds. Dover Edition 1962.

Pim Wolf, Claes de Vrieselaan 50<sup>a</sup>, 3021 JR Rotterdam.