Stormvogelachtigen voor Spaanse noordwestkust, augustus 1988

Procellariiformes off northwest Spain, August 1988

Van 11-18 augustus 1988 werden zeevogels waargenomen vanaf een klein zeilschip, op zo'n 3-6 km uit de Spaanse noordwestkust, van Cedeira tot Pontevedra (een afstand van 210 km). Het schip voer overdag 6-10 uren en ankerde 's nachts in één van de vele baaien. De waarnemingen hadden geen systematisch karakter. Verschillende malen per dag werd een schatting gemaakt van de rondom het schip ontdekte zeevogels. Van de 7 waargenomen soorten stormvogelachtigen volgt hier een overzicht.

Schaarse soorten waren Noordse Stormvogel *Fulmarus glacialis* (1x), Grote Pijlstormvogel *Puffinus gravis* (maximaal 2 per dag), Grauwe Pijlstormvogel *Puffinus griseus* (max. 5 per dag) en Wilsons Stormvogeltje *Oceanicus oceanites* (max. 9 per dag). Aanmerkelijk talrijker waren Kuhls Pijlstormvogels *Calonectris diomedea* (minimaal 100, maximaal 200 per dag), Vale Pijlstormvogels *Puffinus yelkouan* (2500-3800) en Stormvogeltje *Hydrobates pelagicus* (250-330). Kuhls Pijlstormvogel en Stormvogeltje broeden in klein aantal aan de Atlantische kust van het Iberisch schiereiland (Bárcena *et al.* 1984). De enkele honderden Vale Pijlstormvogels die op korte afstand werden waargenomen behoorden vermoedelijk alle

tot de westmediterrane ondersoort *P. y. mauretanicus*. Hierbij ging het dikwijls om groepen van tientallen dieren, waarvan vele slagpen- en staartrui vertoonden, vaak zodanig dat ze nauwelijks meer konden vliegen. Ook waren Vale Pijlstormvogels de enige stormvogelachtigen die ook zeer dicht onder de kust, tot ver in de baaien, fouragerend werd waargenomen.

Tijdens zeetrektellingen bij Cabo Finisterre in begin augustus 1983 (Woutersen 1984) waren Kuhls- en Vale Pijlstormvogel en het Stormvogeltje eveneens de talrijkste stormvogelachtigen. Aan boord van het H.M.S. Tydeman, op 80-100 km uit de kust op 12 augustus 1986 (Haase ongepubl.), werd geen enkele Vale Pijlstormvogel en slechts een enkel Stormvogeltje gezien, terwijl Grote Pijlstormvogel (38 exemplaren) en Wilsons Stormvogeltje (100) relatief algemeen waren. Van de laatste soort werden ook op 30 juli 1985 enkele honderden exemplaren gezien op 50-100 km uit de kust (van den Berg *et al.* 1991). De Kuhls Pijlstormvogel is in deze tijd van het jaar normaal behoorlijk talrijk tussen Gibraltar en Ierland (Moerbeek 1982, Bourne 1986). Zowel van deze soort als van het Stormvogeltje zijn de waargenomen aantallen groter dan op grond van de broedpopulatie alleen zou mogen worden verwacht.

Summary *During a trip on a small sailing vessel, 6-8 km off the coast of northwest Spain (Cedeira tot Pontevedra, 210 km), 11-18 August 1988, seabirds were recorded in an unsystematic manner. Cory's Shearwater, (moulting) Balearic Shearwater, and British Storm Petrel were the most numerous tube-noses seen, while Fulmar (1x), Great and Sooty Shearwater, and Wilsons Petrel were scarce.*

Bárcena F., Teixeira A.M. & Bermejo A. 1984. Breeding seabird populations in the Atlantic sector of the Iberian Peninsula. *In:* Croxall J.P., Evans P.G.H. & Schreiber R.W. (eds). Status and Conservation of the World's Seabirds. ICBP Techn. Publ. No. 2: 335-345, Cambridge.

Berg van den A.B., Bosman C.A.W., Haase B.J.M., Niet A.M. van der & Smeenk C. 1991. Wilson's Petrel off southwestern Europe and northern Africa in June 1984 and July 1985. Dutch Birding 13: 9-10.

Bourne W.R.P. 1986. Late summer seabird distribution off the west coast of Europe. Irish Birds 3: 175-198.

Haase B.J.M. (ongepubl.) Zeevogelwaarnemingen tijdens de CANCAP VII-expeditie (1986) tussen Den Helder en de Kaapverdische Eilanden. Ongepubliceerd verslag.

Moerbeek D. 1982. De pelagische verspreiding van Kuhls Pijlstormvogel. Verslag hoofdvak Bijz. Dierk., Inst. Tax. Zool., Amsterdam.

Woutersen K. 1984. Een paar dagen zeevogels tellen op Cabo Finisterre. Meded. CvZ 7: 8.

Michiel Versluys, Korvetpad 11, 8862 ZH Harlingen