

Korte bijdragen

Eerste waarneming van Donsstormvogel *Pterodroma mollis* in Nederland

First record of Soft-plumaged Petrel Pterodroma mollis in The Netherlands

Op 24 oktober 1992 werd gedurende harde, aanlandige wind, vaak met regenbuien, bij de Hondsbossche Zeewering een Donsstormvogel *Pterodroma mollis* waargenomen door twee, onafhankelijk van elkaar kijkende groepjes zee- en oerpluimers: het eerste geval voor het vasteland van Europa. Omdat de vogel op geringe afstand langs vloog, konden details zoals de donkere boven- en ondervleugel, grijze rug en staart, witte buik, keel en onderstaart en het donkere 'oogmasker' waargenomen worden. De grootte van het dier (iets groter dan een Noordse Pijlstormvogel *Puffinus puffinus*), de lichaamsbouw en de vliegwijze sloten verwarrend met andere soorten uit. Ofschoon de taxonomische positie van de diverse (onder)soorten van de Donsstormvogel onduidelijk is, kan vanwege het ontbreken van een borstband redelijkerwijze worden aangenomen dat het hier één van de (onder)soorten betreft die op Madeira of de Kaapverdische Eilanden broeden. Meest waarschijnlijk lijkt *Pterodroma (mollis) feae*, daar de populatie van *P. (m.) madeira* bijzonder klein is. Het voorkomen van deze soort lijkt erg onwaarschijnlijk, maar sinds 1989 zijn er jaarlijks enkele exemplaren waargenomen op de Britse Eilanden, vooral in de maanden augustus en september. In de herfst van 1992 werden er op de Britse Eilanden drie waargenomen (A. Webb, pers. comm.).

Summary During a seawatch on 24 Oct 1992, a Soft-plumaged Petrel was observed by two independent groups of seawatchers. The lack of a breast-band suggests one of the North-Atlantic (sub-)species, with Pterodroma (mollis) feae being most likely. This is the first record for continental Europe, but there is a remarkable series of records since 1989 around the British Isles.

Leo Stegeman, Melis Stokelaan 173, 1813 DE Alkmaar