

# VERSLAG STELTLOPERRINGGROEP FFF, 1987/1988

Ook in 1987 en 1988 hebben verschillende FFF-ers steltlopers, meeuwen en sterns geringd. In dit verslag zijn de gegevens verwerkt van de ringers: Meinte Engelman, Arend Timmerman en Klaas Koopman. Met name Jakob Bijlsma, Bram en Ineke Meijer, Reinder v.d. Meulen, Freek Nijland, Jaring Roosma en Keimpe Visser hebben intensief geholpen bij het vangen van de vogels.

Het verslag is veel korter dan voorgaande verslagen. Vangsten en terugmeldingen zijn "compact" weergegeven in tabelvorm. Het uitlichten van een soort ter bespreking zoals dat in het verleden wel gebeurd is, was ditmaal niet goed mogelijk.

De aantallen gevangen vogels zijn weergegeven in tabel 1.

| Soort                                         | 1987 | 1988 |
|-----------------------------------------------|------|------|
| Scholekster <i>Haematopus ostralegus</i>      | 82   | 387  |
| Kluut <i>Recurvirostra avosetta</i>           | 83   | 139  |
| Bontbekplevier <i>Charadrius hiaticulata</i>  | -    | 2    |
| Goudplevier <i>Pluvialis apricaria</i>        | -    | 1    |
| Zilverplevier <i>Pluvialis squatarola</i>     | 1    | 12   |
| Kievit <i>Vanellus vanellus</i>               | 2    | 1    |
| Kanoetstrandloper <i>Calidris canutus</i>     | -    | 16   |
| Kleine Strandloper <i>Calidris minuta</i>     | -    | 1    |
| Krombekstrandloper <i>Calidris ferruginea</i> | -    | 4    |
| Bonte Strandloper <i>Calidris alpina</i>      | 50   | 23   |
| Kemphaan <i>Philomachus pugnax</i>            | 35   | 9    |
| Bokje <i>Lymnocyrtus minimus</i>              | -    | 1    |
| Watersnip <i>Gallinago gallinago</i>          | 24   | 60   |
| Poelsnip <i>Gallinago media</i>               | -    | 1    |
| Houtsnip <i>Scolopax rusticola</i>            | -    | 1    |
| Grutto <i>Limosa limosa</i>                   | 12   | 3    |
| Rosse Grutto <i>Limosa lapponica</i>          | -    | 12   |
| Regenwulp <i>Numenius phaeopus</i>            | -    | 5    |
| Vulp <i>Numenius arquata</i>                  | 3    | 4    |
| Tureluur <i>Tringa totanus</i>                | 28   | 6    |
| Groenpootruiter <i>Tringa nebularia</i>       | -    | 1    |
| Kokmeeuw <i>Larus ridibundus</i>              | 408  | 160  |
| Stormmeeuw <i>Larus canus</i>                 | 158  | 16   |
| Zilvermeeuw <i>Larus argentatus</i>           | 4    | -    |
| Visdief <i>Sterna hirundo</i>                 | 24   | 50   |
| Noordse Stern <i>Sterna paradisea</i>         | 1    | 23   |
| Totaal                                        | 915  | 938  |

Tabel 1. Aantallen gevangen volgroeide steltlopers, meeuwen en sterns in 1987 en 1988.

Als nieuwe soort werd aan onze lijst een Poelsnip toegevoegd, die door Arend Timmerman werd gevangen. Opvallend hoog is het aantal Kanoetstrandlopers dat in 1988 bij Holwerd werd gevangen, zeker in verhouding tot het kleine aantal Bonte Strandlopers.

In tabel 2 zijn de terugmeldingen weergegeven, die via het Vogeltrekstation zijn binnengekomen. Terugmeldingen middels aflezen van ringen in de directe omgeving van de ringplaats zijn weggelaten. In 1987 kwamen 26 terugmeldingen binnen van Scholeksters uit Frankrijk, vrijwel alle uit de maanden januari en februari, in 1988 slechts 2. Een en ander wordt duidelijk veroorzaakt door de weersomstandigheden in de winter bij ons.

| Soort                   | NL | BL | FR | GB | DF | DD | PL | DK | NO | SV | SF | SU | MA | NU | GY | Tot. |
|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| Scholekster             | 66 | 1  | 28 | 2  | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 98   |
| Kluut                   | 32 | 2  | 2  |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    | 1  | 1  |    | 53   |
| Kievit                  | 1  |    | 3  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 4    |
| Kanoetstrandloper       |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1    |
| Bonte Strandloper       | 1  |    |    |    |    | 1  |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 3    |
| Kemphaan                |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    | 2  |    | 4    |
| Watersnip               | 1  |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    | 3    |
| Grutto                  | 1  |    | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  | 1  | 1  | 6    |
| Vulp                    | 1  |    | 2  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 3    |
| Tureluur                |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1    |
| Kokmeeuw                | 34 | 3  |    | 8  | 2  | 1  |    | 2  |    |    | 1  | 4  |    |    |    | 55   |
| Stormmeeuw              | 10 | 2  |    |    | 4  |    | 1  | 3  |    |    | 2  | 1  |    |    |    | 23   |
| Grote Mantelmeeuw       |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    | 1    |
| <i>Larus marinus</i>    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |
| Visdief                 | 4  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 4    |
| Noordse Stern           | 1  |    |    |    |    |    |    | 1  |    |    |    |    |    |    |    | 2    |
| Dwergstern              |    |    |    |    |    |    |    | 2  |    |    |    |    |    |    |    | 2    |
| <i>Sterna albifrons</i> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |

Tabel 2. Aantal terugmeldingen (opgenomen in het archief van de ringgroep) in 1987 en 1988. Verklaring der tekens: NL=Nederland, BL=Belgie, FR=Frankrijk, GB=Groot-Brittannië, DF=West-Duitsland, DD=Oost-Duitsland, PL=Polen, DK=Denemarken, NO=Norwegen, SV=Zweden, SF=Finland, SU=Europees Rusland, MA=Marokko, NU=Senegal, GY=Guinée-Bissau.

De terugmelding van een Kanoetstrandloper (vuurtorenslachtoffer) uit West-Duitsland is de eerste melding van deze soort. Aan de Groninger kust werd een Noordse Stern gevangen die in 1979 als nestjong in Denemarken was geringd. De twee terugmeldingen van Dwergsterns betreffen dezelfde vogel. Geringd als nestjong in 1979 op Engelsmanplaat werd deze vogel zowel in 1987 als 1988 broedend aangetroffen in Denemarken.

Klaas Koopman, Diligencelaan 11, 9351 PR Leek.