

Waarnemingenrubriek

Veel van de onderstaande waarnemingen zijn overgenomen uit de zweefvliegenwebsite (fly.to/syrphidae). Het is slechts een greep uit de vele interessante waarnemingen van dit jaar.

Volucella zonaria in Amsterdam door Rene Verbrugge, 3 augustus 2000

1 augustus jongstleden liep ik in mijn lunchpauze van mijn werk in Amsterdam-west, langs een ongemeaaide berm met onder andere bloeiende Berenklauw. Natuurlijk kon ik het niet laten om hier en daar een blik te werpen, want jaweet maar nooit of er nog iets leuks te zien is. Wie schetst mijn verbazing als ik plotseling een enorme zweef ziefourageren op zo'n prachtig Berenklauw-scherm. Onmiskenbaar een *Volucella zonaria*.

Cheilosia caerulea door Leendert-Jan van der Ent, 1 augustus 2000

Cheilosia caerulea in Malden en Eibergen. Op een druilerige zaterdag (15 juli) keek ik uit het keukenraam en zag ik op een gele tuincomposiet een vrij grote *Cheilosia* zitten waarvan ik zag dat het geen gewone *Cheilosia* was. Toen schoot me het artikel van Jaap van der Linden (toch?) te binnen en was ik in mum van tijd buiten met een netje. En ja hoor, een vrouwtje *Cheilosia caerulea*. De vlekken in de vleugel zijn wel heel karakteristiek voor deze soort en lijken een beetje op die van *Ch. illustrata* maar zijn helder in het midden. Verder is ze ongeveer zo groot als *Ch. albitarsis* en heeft ze enigszins opvallende witte haren op het borststuk en in de vorm van witte banden op het achterlijf. Vandaag (2 augustus) ving ik weer een vrouwtje *Ch. caerulea*. Deze keer op het industrieterrein van Eibergen, op een gewone Bereklauw. Een invasie dit jaar???

Zweefjes bij Eibergendoor Leendert-Jan van der Ent, 1 augustus 2000

In de afgelopen maanden heb ik op en om het industrieterrein van Eibergen in totaal 51 soorten zweefjes verzameld. Naast bovengenoemde *Ch. caerulea* ook onder andere *Eupeodes lapponicus* (in de verste verte geen naaldbomen te vinden!) en *Meligramma triangulifera*.

Midden-Limburg blijft boeien door Willem Renema, 24 juli 2000

Met een voorjaars gevoel (al een hele tijd geen vlieg in handen gehad) zaterdag deindelijk weer eens wat vliegen gevangen. Dit ging zo goed dat ik het zondag (23/7) maar in Midden Limburg ben gaan proberen. In 't Hoosten vlogen *Chrysogaster chalybeata* en *Chrysotoxum veralli* (2e waarneming

in dit gebied). Verder vlogen er op twee plekken *Volucella inanis* (de Doort en 't Hoosten). Ook in de Doort vloog *Didea alneti*. In het IJzeren Bos vloog (na lang zoeken) *Cheilosia barbata*.

Zomerse namiddag Amsterdam door Bastiaan Wakkie, 23 juli 2000

Vandaag in de namiddag langs de Weesper trekvaart (Amsterdam Oost) vlogen een paar *Volucella zonaria* rond! Altijd kikken! Meestal op schermbloemen aan de rand van struiken in het volle zonnetje. Ook wel vermeldens waard was dat ik *Sphaerophoria rueppelli* 3 keer zag vliegen en een *Xanthandrus comtus* voorbij kwam.

Epistrophe diaphana en *E. flava* door Gerard Pennards, 5 juli 2000

Voor nu wil ik melden dat ik op 3 juni op de Sint Pietersberg bij Maastricht was, en in uurhok 175-314 verzamelde ik op boterbloemen 5 *Epistrophe* vrouwtjes, waarvan er 4 *E. diaphana* bleken te zijn, en 1 *E. flava*.

Voorjaars vangsten op een rij door Ben Brugge, 28 juni 2000

Met hemelvaart was ik met njn zuid bij Roermond alwaar we de Meinweg van 1-4 juni onveilig hebben gemaakt. *Temnostoma vespiforme* 3 x, *Serico-myia lappona* 3x w.v. 1 net in Duitsland, *Microdon* sp. 1 ex, *Doros conopseus* 1x. Het was er erg heet en dat deed de vangsten een goed. Er moet nog wat gedetermineerd worden dus misschien zit daar nog wat leuks bij.

Van Joris van Walt van Praag kreeg ik een mannetje *Callicera aenea* gevangen bij Tegelen in het Jammerdal (v.Aartsen noemt dit Venlo) gevonden 7 mei zwevend bij de bosrand. Het derde ex. voor Nederland. Menno's ex. is dus het vierde ex. Hij staat nu veilig op het ZMA in de collectie.

Op 26 mei ving ik op een oude boomwond van een iep in Purmerend een *Brachyopa insensilis*.

Maar dan zondag 1 juli in mijn eigen tuin te Purmerend. *Chrysotoxum festum*, *Anasimyia contracta* en *interpuncta*, *Melangyna* sp(annend) en als klap op de vuurpijl een *Cheilosia caerulea* vrouwtje, zonnend op een tuingeranium. Tja dit is dus een tuinsoort geworden!

Ceriana conopsoides bij Nuenen door Robert Kete-laar, 28 juni 2000

Tijdens een venneninventarisatie voor libellen in Brabant bezocht ik op 17 juni de ijsbaan bij Nuenen. Hoewel er vrijwel geen leuke libellen rondvlogen zag ik wel een *Conops*-achtig dier rondvliegen. Ik doe helaas al jaren niet erg veel meer aan zweefvliegen, vandaar dat ik het beest eerst voor een blaaskopvlieg aanzag. Toen ik het beest nonchalant met de hand probeerde te pakken rook ik pas onraad. Met het net zekerde ik de vangst maar en het

bleek een mannetje van *Ceriana conopsoides* te zijn. Na vier jaar weer een nieuwe zweefvliegsoort voor mij!

Callicera aenea

Deze zeer zeldzame soort is dit jaar twee keer verzameld: op 7 mei in Tegelen (Joris van Walt) en op 14 mei in Heemstede (Menno Reemer).

Chalcosyrphus piger

Op 14 mei verzamelde Jan Smit (de vader van John, onze veelgeprezen projectmedewerker) een vrouwtje *Chalcosyrphus piger* op landgoed Huis ter Heide bij Tilburg. Dit is de eerste vangst na een afwezigheid in Nederland van meer dan 100 jaar. De soort houdt van goed ontwikkelde naaldbossen met veel dood hout.

Temnostoma bombylans

Deze fopwesp laat zich steeds vaker in het kustgebied zien. In de duinstreek rondom Den Haag, Leiden en Heemstede is de soort al op verschillende plaatsen gevonden.

Criorhina floccosa

Criorhina floccosa werd op 26 mei gevonden bij Wassenaar door Willem Renema. Dit is de eerste vangst van de soort in de duinstreek.

Ceriana conopsoides

Op 26 mei werd deze soort door Willem Renema gevangen in de duinen bij Wassenaar. Dit is de eerste vangst in de duinstreek.