

son: presencia de una única y ancha banda dorsal negra en el pterotórax, y los cercos denticulados. Brinda, además, una breve descripción del patrón general de coloración y menciona la presencia de 15 / 14 nervaduras postnodales (postcubitales) en las alas anteriores y los pterostigmas que abarcan dos celdas.

El estudio del paratipo hembra, el cual se halla depositado en la colección del Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität de Berlin (No. 2837), posibilitó observar aquellos caracteres no mencionados en la descripción original y compararlo con las demás especies del género *Lestes* conocidas para la Región Neotropical. Los resultados de estos estudios permitieron establecer la sinonimia de *L. sublatus* con *L. alacer* Hagen, 1861, debido a la similitud de los patrones de coloración, ovipositor y caracteres biométricos. Para tal fin se contó con dos ejemplares hembra de *L. alacer* de la colección privada del Dr Rosser W. Garrison provenientes de Arizona (USA) y Oaxaca (México), así como con los trabajos donde se describe esta especie (HAGEN, 1861; SELYS, 1862; CALVERT, 1901-1908).

A continuación se brinda una lista sinónfmica que incluye los cambios de nombre, así como las principales descripciones.

***Lestes alacer* Hagen, 1861**

- 1861 *L. alacer* HAGEN, Synopsis of the Neuroptera of North America, *Smithson misc. Collns.*: 67.
- 1862 *L. alacris* SELYS, *Bull. Acad. r. Belg.* (II) 13: 304-305.
- 1862 *L. sublatus* Hagen in SELYS, *Bull. Acad. r. Belg.* (II) 13: 307-308.
- 1890 *L. alacer*: KIRBY, *A synonymic catalogue of Neuroptera Odonata*, Guerne y & Jackson, London p. 161.
- 1890 *L. sublatus*: KIRBY, *A synonymic catalogue of Neuroptera Odonata*, Guerne y & Jackson, London p. 161.
- 1901-1908. *L. alacer*: CALVERT, *Biologia cent.-am.* 50: 47-49.
- 1909 *L. sublatus*: CALVERT, *Ann. Carnegie Mus.* 6: 92.

Material examinado: Surinam, Cordua coll. sin fecha de collección, 1 ♀; - EEUU, Arizona, cochise Co., springs just E of Slaughter Ranch, 17 mi E of Douglas, 24-VII-1987, R.W. & J.A. Garrison coll., 1 ♂, 1 ♀ en cópula; -

LESTES SUBLATUS HAGEN, 1862, SINÓNIMO DE *L. ALACER* HAGEN, 1861 (ZYGOPTERA: LESTIDAE) - *LESTES SUBLATUS* HAGEN, 1862, A SYNONYM OF *L. ALACER* HAGEN, 1861 (ZYGOPTERA: LESTIDAE)
The paratype ♂ L. sublatus was compared with 2 ♀ L. alacer, and found conspecific. A list of synonyms of L. alacer is given.

El género *Lestes* Leach está representado en la Región Neotropical por aproximadamente 36 especies, algunas de las cuales son conocidas unicamente por sus descripciones originales, siendo en su mayoría incompletas y ambiguas.

L. sublatus Hagen in Selys, 1862 pertenece a este grupo de especies de difícil determinación. La única referencia en la literatur es su descripción original, la cual fue realizada en base a un único ejemplar hembra procedente de Surinam (SELYS, 1862). En la misma, Selys establece que los caracteres diferenciales de esta especie

Mexico, Oaxaca, 20 km S of Oaxaca, by Hwy 175, 7-VIII-1982, J.E. Hafernik Jr coll., 1 ♂, 1 ♀ en tandem.

Deseo expresar mi sincero agradecimiento al Dr K.K. GÜNTHER del Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität de Berlin por el envío del paratipo de *L. sublatus*, y al Dr. Rosser W.

GARRISON de Azusa (California) por el envío de ejemplares y sus inestimables consejos y sugerencias.

J. M u z ó n , Instituto de Limnología "Dr Raúl A. Ringuelet", Universidad Nacional de La Plata, C.C. 712, AR-1900 La Plata, Argentina