

van het duin, waardoor bij Noordwijk en nog meer bij Katwijk een sterke concentratie optreedt.

Uitgebreid komt ook de trek over zee ter sprake. In 1986 is begonnen met het regelmatig waarnemen vanaf een strandpost bij Bloemendaal aan Zee. De lijst met hoogste dagtotalen biedt interessant vergelijkingsmateriaal met de Noordwijkse lijst van hoogste uurtotalen. Er zijn nogal wat Noordwijkse uurtotalen die de Bloemendaalse dagtotalen overtreffen. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door de langere periode (vanaf 1972) waarin bij Noordwijk over zee wordt getuurd.

Na dit hoofdstuk over vogeltrek volgen hoofdstukken over overwinterende watervogels, slaappleatsen (ook een slaappleats van Waterpiepers!) en gestrande vogels. In dit laatste hoofdstuk zijn ook alle strandtellingen van Noordwijk tot Zandvoort verwerkt.

Het laatste hoofdstuk bevat een uitvoerig avifaunistische overzicht. Hierin is een geweldige hoeveelheid informatie verwerkt.

Duidelijk wordt hierbij dat Zuid-Kennemerland niet

alleen een boeiend gebied is voor broedvogels, maar dat ook heel wat zeldzaamheden de weg naar dit gebied weten te vinden.

Hierbij speelt natuurlijk de aanwezigheid van gebieden als de AW-duinen en de Zuidpier van IJmuiden een rol, maar ook de grote deskundigheid van veel Haarlemse waarnemers. Wat dat betreft is de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een club om jaloers op te worden. De ruim 400 leden vormen een mixture van sympathisanten, actieve tellers, onderzoekers en soortenjagers.

Met de publicatie van dit vogelboek heeft de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland een mijlpaal in haar geschiedenis bereikt. Dat is een felicitatie waard! Omdat het Haarlemse gebied direct aansluit op het onze en veel plekken (AW-duinen, Kennemerduinen, Zuidpier IJmuiden, Ruigoord, Elswout) ook regelmatig door onze leden worden bezocht, is dit boek niet alleen voor Haarlemmers interessant. Van harte aanbevolen!

## Broedvogelinventarisaties in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 1998

*Samenstelling Rien Sluys*

In dit artikel worden de resultaten van vijf, jaarlijks geïnventariseerde gebieden in het zuidelijke deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen beschreven.

### 1 Gijs Kokkieshoek

*geïnventariseerd door E. Aartse*

**Terreinomschrijving:** Het geïnventariseerde gebied wordt in het noorden begrensd door de Halfwegeslag, in

duindoorn / vlierstruweel circa 5 ha. stuifzand en stuifplekken circa 20 ha. open duin met Duinriet, Zandzegge en Helm. Volgens het beheersplan wordt een beperkte verstuing toegelaten. Het terrein is erg geaccidenteerd. Vanaf de Langevelderberg (27 m + NAP) loopt het terrein glooiend af naar de Langevelderslag en de Halfwegeslag. Paden komen in het terrein niet meer voor. De oude voerbanen zijn thans geheel dichtgegroeid. De Rozendel is nauwelijks meer begaanbaar.

### Broedvogels van Gijs Kokkieshoek: 1994 t/m 1998

| Soort         | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|---------------|----|----|----|----|----|
| Fazant        | -  | -  | 1  | 1  | -  |
| Holenduif     | 1  | -  | -  | -  | -  |
| Houtduif      | 7  | 6  | 10 | 8  | 3  |
| Zomertortel   | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  |
| Koekoek       | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Boomleeuwerik | -  | -  | 1  | 1  | 3  |
| Boompieper    | -  | -  | -  | 1  | 2  |
| Graspieper    | -  | 2  | 2  | 3  | 5  |
| Winterkoning  | 3  | 3  | 2  | 3  | 1  |
| Heggenmus     | 23 | 17 | 24 | 23 | 22 |



Fitis

het oosten door het rijwielpad, in het zuiden door de Langevelderslag en in het westen door de Houtweg.

Het terrein heeft een oppervlakte van circa 47 ha. waarvan: circa 7 ha. duinberkenbos circa 15 ha.

| Soort                 | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Roodborst             | 1   | 1   | -   | 2   | 1   |
| Nachtegaal            | 21  | 18  | 21  | 24  | 22  |
| Gekr. Roodstaart      | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| Roodborsttapuit       | 1   | 3   | 3   | 2   | 5   |
| Tapuit                | 4   | 3   | 3   | 1   | 1   |
| Merel                 | 4   | 5   | 6   | 1   | 5   |
| Zanglijster           | 1   | -   | 2   | -   | 1   |
| Sprinkhaanzanger      | 2   | 1   | 3   | 1   | 1   |
| Bosrietzanger         | 1   | -   | -   | -   | -   |
| Braamsluiper          | 5   | 4   | 5   | 4   | 4   |
| Grasmus               | 16  | 15  | 22  | 25  | 23  |
| Zwartkop              | 2   | 2   | 1   | 1   | 2   |
| Tuinfluit             | 1   | -   | -   | -   | -   |
| Tjiftjaf              | 2   | 2   | 3   | 2   | 3   |
| Fitis                 | 24  | 21  | 22  | 22  | 25  |
| Staartmees            | 1   | -   | 1   | -   | -   |
| Glanskop              | 1   | -   | -   | 1   | -   |
| Pimpelmees            | 2   | -   | 1   | 2   | 1   |
| Koolmees              | 5   | 4   | 5   | 4   | 3   |
| Vlaamse Gaai          | 2   | 2   | 2   | 1   | 2   |
| Ekster                | 5   | 5   | 5   | 5   | 4   |
| Kneu                  | 5   | 4   | 6   | 7   | 6   |
| Goudvink              | 1   | -   | 1   | -   | -   |
| Vink                  | -   | -   | -   | -   | 1   |
| Totaal aantal soorten | 29  | 22  | 26  | 27  | 27  |
| Aantal broedgevallen  | 145 | 123 | 157 | 155 | 152 |

### Toelichting 1998

De Houtduif is in 1998 meer dan gehalveerd (van 8 naar 3). Effect Havik?

De Boomleeuwerik is toegenomen. Ook in de Noordduinen heb ik diverse Boomleeuweriken horen zingen evenals in De Blink en verder in het zuidelijk deel van de AWD.

De Roodborsttapuit is flink toegenomen (van 2 naar 5). De oorzaak is mij onbekend.

De Vink is een nieuwkomer in het gebied. Vermoedelijk heeft deze soort gebroed in het bosje aan de noordzijde van de Halfwegse Slag. Dit gebied wordt niet geïnventariseerd. De soort is toch als broedvogel meegeteld omdat het territorium zich zuidwaarts over de Halfwegse Slag uitstrekte.

### 2 Boeveld-West

geïnventariseerd door W. Baalbergen en J. Veeffkind

**Terreinomschrijving:** Het geïnventariseerde gebied wordt in het Noorden begrensd door het Finnlayweggetje, in het oosten door de Houtweg en een stukje onverhard wandelpad, in het zuiden door het raster langs de Langevelderslag en in het westen door het voormalige Van Limburg Stirumkanaal. Het onderzochte gebied kan men grofweg in twee delen verdelen. Het zuidelijke deel wordt grotendeels bepaald door een vrij kaal duinenplateau met toppen van 18 m. Het noordelijke deel is begroeid met struweel. De oppervlakte bedraagt circa 28 ha. De recreatiedruk is er, mede als gevolg van de dichtbij gelegen ingang, erg groot.

### Broedvogels van Boeveld-West: 1994 t/m 1998

| Soort                | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|----------------------|----|----|----|----|----|
| Wilde Eend           | 1  | -  | -  | -  | -  |
| Fazant               | 3  | -  | 1  | 1  | 2  |
| Scholekster          | 1  | -  | -  | -  | -  |
| Houtduif             | 4  | 2  | 2  | 2  | 2  |
| Zomertortel          | 1  | -  | 1  | -  | 1  |
| Koekoek              | 1  | 1  | 1  | 1  | -  |
| Boomleeuwerik        | -  | -  | -  | -  | 1  |
| Boompieper           | 1  | 1  | 1  | 1  | -  |
| Graspieper           | 2  | 2  | 4  | 1  | 2  |
| Winterkoning         | 4  | 2  | -  | 2  | -  |
| Heggemus             | 12 | 10 | 12 | 10 | 7  |
| Roodborst            | 1  | -  | -  | -  | -  |
| Nachtegaal           | 11 | 9  | 5  | 6  | 7  |
| Gekraagde Roodstaart | 1  | -  | 1  | 1  | -  |
| Roodborsttapuit      | 4  | 2  | 4  | 2  | 3  |
| Tapuit               | 1  | -  | 1  | 1  | -  |
| Merel                | 3  | 2  | 1  | 2  | 2  |
| Sprinkhaanzanger     | 2  | 1  | -  | 1  | 2  |
| Bosrietzanger        | 1  | -  | -  | -  | -  |
| Kleine Karekiet      | 1  | -  | -  | -  | -  |
| Braamsluiper         | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  |
| Grasmus              | 12 | 10 | 14 | 9  | 9  |
| Tjiftjaf             | 2  | 1  | -  | 3  | 2  |
| Fitis                | 14 | 12 | 9  | 7  | 10 |

| Soort                 | 94  | 95 | 96 | 97 | 98 |
|-----------------------|-----|----|----|----|----|
| Staartmees            | 1   | -  | -  | -  | -  |
| Glanskop              | 1   | -  | -  | -  | -  |
| Pimpelmees            | -   | 1  | 1  | 1  | -  |
| Koolmees              | 3   | -  | 1  | 1  | 3  |
| Vlaamse Gaai          | 1   | 1  | 1  | 1  | 2  |
| Ekster                | 4   | 4  | 2  | 2  | 1  |
| Zwarte Kraai          | 2   | 1  | 2  | -  | 1  |
| Kneu                  | 7   | 6  | 7  | 4  | 7  |
| Goudvink              | 1   | 1  | 1  | -  | -  |
| Rietgors              | 3   | 1  | -  | -  | -  |
| Totaal aantal soorten | 32  | 21 | 22 | 22 | 19 |
| Aantal broedgevallen  | 108 | 71 | 74 | 61 | 66 |

### 3 Wolfsveld-West

geïnventariseerd door B. Heethuis en J. Jacobs

**Terreinomschrijving:** Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Ruigenhoeker Schulpweg, in het oosten door het Finnlayweggetje en in het verlengde daarvan door een denkbeeldige lijn over de Kop van het Ronde Vlak en rechts langs het Spejendel, in het zuiden door het Finnlayweggetje en in het westen door de stuivende zandvlakte van het voormalige Van Limburg Stirumkanaal. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 35 ha., waarin 5 delen n.l. Lange Vlak, Spejendel, Abelendel, Biezenvlakje en Ronde Vlak grotendeels bestaan uit Meidoorn, Liguster, Berk, Zomereik, Kardinaalsmuts, Vlier en Duindoorn.

**Broedvogels Wolfsveld-West: 1994 t/m 1998**

| Soort        | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|--------------|----|----|----|----|----|
| Buizerd      | -  | -  | -  | 1  | -  |
| Fazant       | 4  | 2  | 2  | 2  | 1  |
| Houtduif     | 6  | 3  | 4  | 4  | 2  |
| Koekoek      | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Zomertortel  | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  |
| Boompieper   | -  | -  | -  | 1  | 1  |
| Graspieper   | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  |
| Winterkoning | 7  | 8  | 3  | 4  | 3  |
| Heggemus     | 20 | 13 | 13 | 14 | 12 |

| Soort                 | 94  | 95  | 96  | 97  | 98 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| Roodborst             | 1   | -   | -   | -   | -  |
| Nachtegaal            | 13  | 11  | 13  | 11  | 14 |
| Roodborsttapuit       | 4   | 4   | 4   | 4   | 5  |
| Merel                 | 2   | 6   | 3   | 3   | 2  |
| Zanglijster           | 1   | 2   | -   | 1   | -  |
| Sprinkh. zanger       | 2   | 1   | 4   | 2   | 3  |
| Braamsluiper          | 2   | 3   | 3   | 3   | 1  |
| Grasmus               | 16  | 14  | 19  | 13  | 17 |
| Tjiftjaf              | 1   | 1   | 2   | 3   | 4  |
| Fitis                 | 20  | 17  | 20  | 14  | 14 |
| Staartmees            | 1   | -   | -   | -   | -  |
| Pimpelmees            | 5   | 2   | 2   | 6   | 3  |
| Koolmees              | 5   | 7   | 4   | 5   | 4  |
| Vlaamse Gaai          | 2   | 1   | 2   | 1   | 1  |
| Ekster                | 5   | 4   | 5   | 4   | 3  |
| Zwarte Kraai          | 1   | 1   | 2   | 2   | -  |
| Kneu                  | 6   | 2   | 3   | 4   | 4  |
| Goudvink              | 1   | -   | 1   | -   | -  |
| Rietgors              | -   | 1   | -   | -   | -  |
| Totaal aantal soorten | 25  | 23  | 22  | 24  | 21 |
| Aantal                | 128 | 107 | 112 | 106 | 98 |

### Toelichting 1998

1998 is geen bijzonder jaar geweest voor de broedvogels. De licht dalende trend heeft zich weer doorgezet: 8% minder broedsels dan in 1997. Het aantal soorten is met 3 teruggelopen tot 21. We verloren de Zanglijster en de



Zanglijster

Buizerd, beide waren naar ons gevoel twijfelachtige soorten in ons gebied. Ook verloren we de Zwarte Kraai als broedvogel, terwijl deze toch altijd een vaste soort is


geweest. Zeer waarschijnlijk heeft de opmars van de Havik in de AWD daarmee te maken. Wij hebben deze roofvogel verschillende malen in ons gebied zien jagen. Van de overige broedvogels valt te melden dat de Nachtegaal zijn hoogste score heeft bereikt (14 broedsels), en dat de Pimpelmees weer op zijn oude niveau is. Verder resteert nog maar 1 Braamsluiper.

## 4 Westhoek/Haasvelderbeken

*geïnventariseerd door J. van Saase en W. van Leeuwen*

### Terreinomschrijving:

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Nieuwe Haasvelderweg of Heiweg, in het oosten door de slag van de Westhoek, in het zuiden door de



Merel

Starrenbroekerweg en in het westen door de Haasvelder Klugtweg. Het terrein is niet sterk geaccidenteerd. De Trapjesberg is met ruim 16 meter + NAP de hoogste duintop. In de omgeving van het Haasveld (oorspronkelijk Haags-Veld) zijn nog vele sporen aanwezig van een vroegere landbouwvestiging, zoals oude teelthoeken (=duinkrochten) en weiljes, droge wateringen, greppels en oude beekbeddingen. De vlakke gedeelten zoals de "Lange Velletjes" en "Het Weitje van de Wilgenpoort" zijn sterk verruigd.

### Broedvogels van Westhoek - Haasvelderbeken: 1994 t/m 1998

De vernatting van het tracé van het Van Limburg Stirumkanaal lijkt nu door te zetten. We hopen dat dit nu in de vogelpopulatie van 1999 merkbaar zal zijn door nieuwe of verdwenen soorten zoals de Rietgors opnieuw te kunnen begroeten.

| Soort                 | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Fazant                | 19  | 24  | 15  | 9   | 10  |
| Houtduif              | 4   | 4   | 6   | 3   | -   |
| Zomertortel           | 1   | 1   | -   | -   | -   |
| Koekoek               | 3   | 4   | 3   | 3   | 3   |
| Groene Specht         | 1   | 1   | -   | -   | -   |
| Boompieper            | 12  | 9   | 8   | 5   | 9   |
| Graspieper            | -   | 1   | 1   | 1   | -   |
| Winterkoning          | 17  | 14  | -   | 2   | 4   |
| Heggemus              | 9   | 9   | 9   | 6   | 5   |
| Roodborst             | -   | 1   | 1   | 1   | -   |
| Nachtegaal            | 10  | 11  | 15  | 11  | 9   |
| Gekr. Roodstaart      | 3   | 1   | 3   | 3   | 3   |
| Roodborsttapuit       | 2   | 3   | 5   | 3   | 5   |
| Merel                 | 2   | 4   | 6   | 2   | 5   |
| Zanglijster           | -   | -   | -   | -   | 1   |
| Sprinkhaanzanger      | 9   | 10  | 10  | 8   | 9   |
| Braamsluiper          | 2   | 4   | 4   | 1   | 2   |
| Grasmus               | 20  | 21  | 24  | 16  | 21  |
| Tuinfluit             | -   | 1   | -   | -   | 1   |
| Tjiftjaf              | 3   | 5   | 4   | 5   | 9   |
| Fitis                 | 61  | 59  | 58  | 49  | 44  |
| Glanskop              | -   | 1   | -   | -   | -   |
| Pimpelmees            | 3   | 3   | 2   | 3   | -   |
| Koolmees              | 10  | 9   | 14  | 7   | 8   |
| Vlaamse Gaai          | 1   | 1   | 2   | 1   | -   |
| Ekster                | 4   | 7   | 4   | -   | -   |
| Zwarte Kraai          | 1   | 1   | -   | 1   | -   |
| Vink                  | -   | -   | -   | 2   | 1   |
| Kneu                  | 7   | 7   | 8   | 6   | 4   |
| Totaal aantal soorten | 23  | 27  | 21  | 23  | 19  |
| Aantal broedgevallen  | 204 | 216 | 202 | 148 | 153 |

# 5 Hoekgatterduin

*geïnventariseerd door S. Vos*

**Terreinomschrijving:** Het onderzochte gebied is c. 50 ha groot. In het noorden en oosten wordt het terrein begrensd door de Hoekgatterweg, in het zuiden door de Zikerslag (Joppeweg) en in het westen door het Oosterkanaal. Door het gebied lopen enkele zandpaden. Het gebied kenmerkt zich door een rug van vrij kale duinen met veel stuifgaten. We vinden verspreid over het terrein enkele bosjes van voornamelijk eikenhakhout zoals b.v. het Amerikaanse Bosje. Langs het Oosterkanaal vinden we enkele bosjes van de Oostenrijkse den.

## Broedvogels van Hoekgatterduin: 1994 t/m 1998

| Soort            | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|------------------|----|----|----|----|----|
| Knobbelzwaan     | -  | -  | -  | -  | 1  |
| Nijlgans         | -  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Bergeend         | -  | 1  | -  | 1  | -  |
| Wilde Eend       | 4  | 1  | 1  | 4  | 3  |
| Kuifeend         | -  | -  | -  | 1  | 2  |
| Boomvalk         | 1  | 1  | 1  | -  | 1  |
| Fazant           | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Meerkoet         | -  | -  | -  | 1  | 2  |
| Houtduif         | 8  | 6  | 5  | 4  | 6  |
| Zomertortel      | -  | -  | -  | -  | 1  |
| Koekoek          | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Groene Specht    | 1  | 2  | 2  | 1  | -  |
| Gr. Bonte Specht | -  | 1  | 1  | 1  | 2  |
| Boomleeuwerik    | -  | -  | -  | -  | 1  |
| Boompieper       | 7  | 7  | 6  | 6  | 8  |
| Graspieper       | 1  | -  | -  | -  | -  |
| Winterkoning     | 8  | 13 | 2  | 5  | 3  |
| Heggemus         | 16 | 12 | 4  | 9  | 8  |

| Soort                 | 94  | 95  | 96  | 97  | 98 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| Roodborst             | 7   | 6   | 1   | 2   | 2  |
| Nachtegaal            | 12  | 15  | 17  | 14  | 17 |
| Gekr. Roodstaart      | 3   | 7   | 6   | 8   | 10 |
| Paapje                | -   | -   | 1   | -   | -  |
| Roodborsttapuit       | -   | -   | 1   | 1   | 1  |
| Merel                 | 5   | 4   | 3   | 6   | 7  |
| Zanglijster           | 1   | 2   | 2   | 1   | 2  |
| Sprinkhaanzanger      | -   | 1   | 1   | 3   | 3  |
| Braamsluiper          | 1   | -   | -   | 1   | -  |
| Grasmus               | 11  | 11  | 11  | 16  | 17 |
| Tuinfluit             | 1   | 1   | 1   | -   | 1  |
| Zwartkop              | -   | -   | 1   | 2   | 1  |
| Tjiftjaf              | 5   | 4   | 3   | 4   | 8  |
| Fitis                 | 22  | 32  | 27  | 28  | 36 |
| Staartmees            | 3   | 2   | -   | -   | -  |
| Glanskop              | -   | 1   | 1   | -   | -  |
| Kuifmees              | 1   | -   | -   | -   | -  |
| Pimpelmees            | 11  | 10  | 6   | 8   | 11 |
| Koolmees              | 19  | 12  | 9   | 14  | 15 |
| Wielewaal             | -   | -   | -   | -   | 1  |
| Vlaamse Gaai          | 1   | 5   | 5   | 2   | 1  |
| Spreeuw               | -   | -   | -   | 2   | 1  |
| Ekster                | 5   | 5   | 5   | 3   | 3  |
| Kauw                  | -   | -   | -   | 1   | 1  |
| Zwarte Kraai          | 2   | 3   | 3   | 2   | 2  |
| Ringmus               | 2   | 1   | -   | -   | -  |
| Vink                  | -   | 2   | 2   | 3   | 3  |
| Kneu                  | 1   | 2   | 2   | 2   | 2  |
| Goudvink              | -   | 1   | -   | -   | -  |
| Totaal aantal soorten | 29  | 33  | 32  | 34  | 37 |
| Aantal                | 161 | 174 | 131 | 159 | 18 |



*kauwtje*

Totaal van de kavels 1 t/m 5

| Soort             | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
|-------------------|----|----|----|----|----|
| Knobbelzwaan      | -  | -  | -  | -  | 1  |
| Nijlgans          | -  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Bergeend          | -  | 1  | -  | 1  | -  |
| Wilde Eend        | 5  | 1  | 1  | 4  | 3  |
| Kuifeend          | -  | -  | -  | 1  | 2  |
| Biuzerd           | -  | -  | -  | 1  | -  |
| Boomvalk          | 1  | 1  | 1  | -  | 1  |
| Fazant            | 27 | 27 | 20 | 14 | 14 |
| Meerkoet          | -  | -  | -  | 1  | -  |
| Scholekster       | 1  | -  | -  | -  | -  |
| Holenduif         | 1  | -  | -  | -  | -  |
| Houtduif          | 29 | 21 | 27 | 21 | 13 |
| Zomertortel       | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  |
| Koekoek           | 7  | 8  | 7  | 7  | 6  |
| Groene Specht     | 2  | 3  | 2  | 1  | -  |
| Gr. Bonte Specht  | -  | 1  | 1  | 1  | 2  |
| Boomleeuwerik     | -  | -  | 1  | 1  | 5  |
| Boompieper        | 20 | 17 | 15 | 14 | 20 |
| Graspieper        | 4  | 6  | 8  | 6  | 9  |
| Winterkoning      | 39 | 40 | 7  | 16 | 12 |
| Heggemus          | 80 | 61 | 62 | 62 | 54 |
| Roodborst         | 10 | 8  | 2  | 5  | 3  |
| Nachtegaal        | 67 | 64 | 71 | 66 | 69 |
| Zwarte Roodstaart | 1  | -  | -  | 12 | 19 |
| Gekr. Roodstaart  | 8  | 10 | 12 | 14 | 15 |
| Paapje            | -  | -  | 1  | -  | -  |
| Roodborsttapuit   | 11 | 12 | 17 | 12 | 19 |
| Soort             | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| Tapuit            | 5  | 3  | 4  | 2  | 1  |

| Soort                 | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merel                 | 16  | 21  | 19  | 14  | 17  |
| Zanglijster           | 3   | 4   | 4   | 2   | 2   |
| Sprinkh.zanger        | 15  | 14  | 18  | 15  | 18  |
| Bosrietzanger         | 2   | -   | -   | -   | -   |
| Kleine Karekiet       | 1   | -   | -   | -   | -   |
| Braamsluiper          | 12  | 12  | 14  | 11  | 9   |
| Grasmus               | 75  | 71  | 90  | 79  | 87  |
| Tuinfluit             | 2   | 2   | 1   | -   | 2   |
| Zwartkop              | 2   | 2   | 2   | 3   | 3   |
| Tjiftjaf              | 13  | 13  | 12  | 17  | 27  |
| Fitis                 | 141 | 141 | 136 | 120 | 129 |
| Staartmees            | 6   | 2   | -   | -   | -   |
| Glanskop              | 2   | 2   | 1   | 1   | -   |
| Kuifmees              | 1   | -   | -   | -   | -   |
| Pimpelmees            | 21  | 16  | 12  | 17  | 15  |
| Koolmees              | 42  | 32  | 33  | 31  | 33  |
| Vlaamse Gaai          | 7   | 10  | 12  | 6   | 7   |
| Ekster                | 23  | 25  | 21  | 14  | 11  |
| kauw                  | -   | -   | -   | 1   | 1   |
| Zwarte Kraai          | 6   | 6   | 7   | 5   | 3   |
| Ringmus               | 2   | 1   | -   | -   | -   |
| Vink                  | -   | 2   | 2   | 5   | 5   |
| Kneu                  | 26  | 21  | 26  | 23  | 23  |
| vink                  | -   | 2   | 2   | 5   | 5   |
| Goudvink              | 3   | 2   | 3   | -   | -   |
| Rietgors              | 3   | 2   | -   | -   | -   |
| Totaal aantal soorten | 42  | 40  | 36  | 40  | 40  |
| Aantal broedgevallen  | 747 | 691 | 675 | 622 | 601 |

Broedvogelinventarisatie van het Landgoed Nieuw-Leeuwenhorst

*Geïnterviewd door Rien Sluys*  
Vanaf 1984 werd dit kavel jaarlijks, met uitzondering van 1996, geïnterviewd.  
Het gebied wordt in het westen begrensd door het Westeinde, in het oosten door de Goeweg in het zuiden door de Hoogweg en in het noorden door het pad aan de zuidkant van de vijver. Het afgelopen jaar hebben zich een aantal veranderingen voorgedaan in dit terrein. Het beheer richt zich meer op de natuurwaarden dan op de

recreatie. De toegangsregels zijn verscherpt. Het terrein is nu alleen nog toegankelijk voor begunstigers van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en voor Noordwijkers die in het bezit zijn van een door de Gemeente Noordwijk verstrekte wandelkaart. Verder zijn veel paden verwijderd of afgesloten. Wij zijn benieuwd of deze maatregelen effect zullen hebben op de broedvogelpopulatie in dit terrein.