

Waarnemingen april, mei en juni 2017

Peter Spiereburg

Waarnemingen zijn overgenomen van www.waarneming.nl. Hier is een volledig overzicht te vinden van de vogels die deze maanden in ons waarnemingsgebied zijn waargenomen.

Iberische Tjiftjaf

Noordwijk was afgelopen winter goed bedeed met zeldzaamheden. De Siberische Taling was nog maar net weg en de Dwerggorzen waren zelfs nog aanwezig, toen zich alweer een nieuwe klapper aandeede. Casper Zuyderduyn hoorde langs de Prins Hendrikweg een bijzondere zang die hij al gauw wist te koppelen aan Iberische Tjiftjaf. De vogel bleef de hele dag door zingen en was makkelijk terug te vinden in de tuinen waar hij zich ophield. Ook de volgende dagen liet hij fanatiek zijn zang horen. Hij bleef meer dan een maand en was het laatst op 12 mei te horen. De zang had geen succes en hij bleef ongepaard. De Iberische Tjiftjaf is tot vrij recent (eind jaren negentig) beschouwd als ondersoort van de Tjiftjaf. In de vorige eeuw zijn er allerlei soorten gesplitst, wat dan vaak eerst even wennen was. Maar nadat vogelaars de 'nieuwe' soorten beter leerden kennen, was het vaak niet meer goed voor te stellen dat ze ooit als één waren beschouwd. Thijsse had het begin 20^e eeuw nog over Zwartkopmees, die we nu als vanzelfsprekend kennen als Glanskop en Matkop. Dezelfde vanzelfsprekendheid geldt ook voor recentere splitsingen van soorten als Oeverpieper-Waterpieper, Toendarietgans-Taigarietgans, Zilvermeeuw-Geelpootmeeuw-Pontische Meeuw. Heel verschillende vogels qua verspreiding en gedrag. Zelfs herkenning van overvliegende vogels van deze soorten op trektelposten is binnen bereik gekomen.

De Iberische Tjiftjaf is ook niet zomaar een Tjiftjaf met een afwijkende zang. Degenen die de vogel goed bekeken hebben zullen hebben gezien dat het echt een andere vogel is: langgerechter door langere snavel en vleugel en helderwit van onder als een Fitis. Een aparte soort, ook in zijn habitat en gedrag. Is de Tjiftjaf een generalist die in veel habitats voorkomt, de Iberische Tjiftjaf is veel meer een specialist van gematigd loofhout, vaak op hellingen. Het kerngebied is het NW Iberisch schiereiland. Een verschil is ook dat de Iberische Tjiftjaf een lange afstand trekker is die in een relatief klein gebied in W Afrika overwintert. Hij heeft de lange vleugels niet voor niets. Als in Spanje onze Tjiftjaffen arriveren om te overwinteren, dan is de Iberische Tjiftjaf al vertrokken. Zelf ken ik ze ook uit hun overwinteringsgebied in W Afrika. Je associeert een Tjiftjaf met een korte afstandstrekker en het was een verrassing te zien dat in het gebied in Z Mali waar ik zat ze talrijker waren dan de Fitis, een bekende Afrikaganger. In het voorjaar schieten soms Iberische Tjiftjaffen door en duiken dan in ons land op. De laatste jaren wordt er jaarlijks wel ergens een vogel ontdekt, vaak in de kuststreek. De Noordwijkse vogel was met 9 april één van de vroegste ooit, de tweede na een Friese vogel op 8 april in 2002.



Iberische Tjiftjaf foto: René van Rossum

Bijzondere broedvogels


Nadat vorig jaar het doek definitief gevallen leek voor de Zomertortel waren er dit jaar toch weer 2-3 territoria. In de AWD Paardenkerkhof, in de rand tegen de N206 aan, waren op 18 mei twee koerende vogels te horen (ML). Een week later was nog minimaal één van deze territoria bezet (MK). Ook in de kern van het voormalige bolwerk rond het Oosterduinse Meer was de Zomertortel weer terug (RJ). De IJsvogel heeft mogelijk ook weer ergens in ons waarnemingsgebied gebroed, getuige de waarneming van 9 mei in de Elsgeesterpolder (JZ). De opnames van de nachttrek leverden ook roepende jonge Ransuilen op in de omgeving van de Kraaierslaan in de Noordzijderpolder (MW). Dit was het enige bekende broedgeval van Ransuil dit jaar. Bergeenden broeden tegenwoordig in het bollenland en grasland. In de Hogeveense Polder zaten drie paren met jongen (SH MMo ea). Voor een broedgeval in de duinen moeten we ver terug. De aanwezigheid van Vossen heeft de duinen als broedgebied ongeschikt gemaakt. Het was daarom bijzonder dat er op 31 mei een paar Bergeenden met 9 jongen in de Binnenwatering zwom (AM). Helaas hadden ze uiteindelijk geen succes want al de volgende dag waren alle jongen verdwenen (MD). De Blauwborst in de Hogeveense Polder blijft terug keren naar de ongebruikelijke broedlocatie langs brede zandsloten in het bollenland. Dit keer zat hij in de buurt van de golfbaan Tespelduin, waar een voerend paar actief was (SH). De waarneming van een Rouwkwikstaart op 25 juni (JDo) , op de vaste locatie langs de Oosterduinen in Noordwijkerhout is een teken dat deze hier ook dit jaar weer een territorium had. Het braakliggend terrein aan de Achterweg bleek een geweldige aantrekkingskracht te hebben op Roodborsttapuiten, een soort die we bij ons niet zo kennen als broedvogel buiten de duinen. Meerdere paren hadden zich hier gevestigd. (HV CZ). Een aantal zangers zijn in Nederland vrij algemeen, maar in ons waarnemingsgebied bijzonder dun gezaaid. Maar op twee plekken zongen er eind mei nog Spotvogels: in de Hogeveense Polder (RG) en in het Hoekgatterduin in de AWD (ML). Bosrietzangers zaten op 7 plekken (JDo ea). Bij het Oosterduinse Meer broedde een Rietzanger succesvol (JD) en verder zat er één bij Tespelduin in de Hogeveense Polder (SH). De Grauwe Vliegenvanger is één van de lokaal schaarse soorten die steeds meer voet aan de grond lijkt te krijgen in ons waarnemingsgebied met dit jaar in totaal 10 territoria. In het kerngebied in de AWD en de duinvoet van Langeveld zaten 6 territoria (AM MK ea). Daarbuiten waren er territoria bij De Blink, in de Noordduinen bij de Aardbeidel (CZ), op Sancta Maria (RJ) en op Willem v.d. Bergh (ML). Dit zijn grotendeels nieuwe vestigingen. Appelvinken zijn inmiddels wijd verspreid met o.a. 3 territoria in het Langeveld (AR), maar ook in Nieuw-Leeuwenhorst (MH) en Klein Leeuwenhorst (CZ ea). Op nog maar één plek is in het broedseizoen een Ringmus waargenomen: in de Elsgeesterpolder (JW). Dit is inmiddels één van de zeldzame broedvogels van ons waarnemingsgebied geworden.



Appelvink 6 mei 2017 Noordwijkerhout - Klein-Leeuwenhorst © Casper Zuyderduyn

Eenzame kwikstaarten

De Engelse Kwikstaart deed het dit jaar niet slecht. Van de bekende plekken waren het Vinkeveld (1), Zwitterpolder (2), Hogeveense Polder, (1) Zilkerpolder (2) bezet (PS) en zat er daarnaast een man in de Elsgeesterpolder (HSt). Eén vogel in de Zilkerpolder was een hybride. Dit was de specifieke vorm die ook bekend is uit de grens van het verspreidingsgebied in Noord-Frankrijk, de 'Channel Wagtail'. Deze lijkt niet op Engelse noch op Gele Kwikstaart, maar heeft een hele lichte grijze kop, zoals die van de oostelijke ondersoort *beema*. In de Zwitterpolder was naast de twee zuivere mannen nog een derde vogel aanwezig met wat hybride kenmerken. Waarschijnlijk was dit geen directe afstammeling van een gemengd paar, maar had hij wel wat 'engels' bloed. De broedpopulatie in Nederland is waarschijnlijk sterk afhankelijk van regelmatige aanvoer vanuit de bronpopulatie in Engeland. Na een dramatische afname heeft deze zich in de laatste jaren gestabiliseerd. Dit biedt ook hoop voor 'onze' Engelse Kwikken. Dat de Engelse Kwikstaart desondanks op het randje van verdwijnen balanceert zie je als je individuele vogels wat langer volgt. Eén van de Engelse Kwikstaarten in de Zwitterpolder bleef het hele seizoen zingen, maar bleef uiteindelijk ongepaard en eenzaam. Blijkbaar waren er geen Engelse vrouwen blijven hangen en wilde het ook met de lokale vrouwen niet vlotten.



Grote Gele Kwikstaart Langeveld 13 mei 2017 foto: Reinder Genuit

Bijzonder was dat zich nog een andere eenzame kwikstaart ophield in de Zwitterpolder. Een Grote Gele Kwikstaart man hield hier een groot deel van het jaar territorium. De vogel arriveerde eind maart en bakende in het bollenland in eerste instantie een groot territorium af. Zo gauw de eerste mannen Gele Kwikstaarten arriveerden begonnen territoriumgevechten. Uiteindelijk vestigde hij zich bij een brede zandsloot. De nabijheid van water was in zijn gedrag het enige dat deed denken aan een Grote Gele Kwikstaart. In alle andere opzichten gedroeg hij zich als een Gele Kwikstaart. Net als die zat hij bovenin de tulpen te zingen, een bijzonder gezicht. De zang was afwijkend: een herhaling van schrille tonen die in alles deed denken aan Gele Kwikstaart. De normale zang van Grote Gele Kwikstaart is aangepast aan het normale habitat, met hoge noten om boven het geraas van snelstromende beken uit te komen. Hij hield het een groot deel van het broedseizoen vol. Er diende zich geen vrouwelijke soortgenoot aan, Gele noch Grote Gele Kwikstaart. Pas begin mei zag de vogel zijn fout in en gaf het op. Het bollenland heeft blijkbaar zodanig veel te bieden voor broedvogels, dat zelfs een soort die we kennen uit een heel ander habitat, toch een poging doet zich te vestigen. Eerder zagen we dat met de Blauwborst in de Hogeveense polder. Mogelijk ging het in dit specifieke geval om een vogel die op de één of andere manier is opgegroeid met Gele Kwikstaarten als ouders. Dat het niet helemaal is toe te schrijven aan één afwijkend individu bewees een tweede Grote Gele Kwikstaart die begin mei gelijktijdig opdook in bollenland in het Langeveld. Broedgevallen van Grote Gele Kwikstaarten, en daarmee waarnemingen in april en mei zijn uitzonderlijk in het westen van het land. Voor volgend jaar houden we weer een vinger aan de pols om te zien of het blijft bij een eenmalige eenzame kwikstaart in het verkeerde habitat, of dat we toch een nieuwe bollenvogel kunnen verwachten.

Inventarisatie Coepelduynen

De Coepelduynen tussen Katwijk en Noordwijk is een bijzonder duingebied. Afgezien van het fietspad langs de zeereep en de wandelpaden direct aan de dorpsranden, wordt het gebied niet doorsneden door paden. In het broedseizoen is het afgesloten en rust voert er de boventoon. Ook is het één van de meest open duingebieden van de omgeving, met alleen hier en daar een met struiken begroeide noordhelling en veel stuivend zand. Het is geen gebied met hoge dichtheden aan vogels, maar wel heel geschikt voor karakteristieke duinvogels van open landschap. In de inventarisatie van ons werkgebied van 2004-2008 zat hier nog de laatste broedpopulatie Tapuiten van ons werkgebied, met nog 4 paar in 2003. Op initiatief van Staatsbosbeheer en Stichting Berkheide - Coepelduynen is er dit jaar gestart met een jaarlijkse broedvogelinventarisatie van de hele Coepelduynen. De tellers waren Ben ter Haar, Annelies Marijnis, Joop de Leeuw, Lenard Onderwater, Job de Ridder en Casper Zuyderduyn. De laatste volledige inventarisatie dateert van 1997 en de ontwikkeling van de broedvogelbevolking heeft sindsdien niet stil gestaan. Bij deze alvast een eerste voorproefje van de resultaten. Soorten als Tapuit, Veldleeuwerik, Zomertortel en Ringmus zijn verdwenen, wat geen verrassing is. Wel verrassend zijn de nieuwkomers: Sperwer, Holenduif, Blauwborst, Vink, Blauwborst en Goudvink. De struweelbroeders hebben de wind in de rug gekregen, zoals Heggenmus, Grasmus en Nachtegaal. In de jaren tachtig ontbrak de Nachtegaal nog helemaal in het gebied en in de jaren negentig en tweeduizend was er een bescheiden vestiging met tot 10 paar. Inmiddels is dat aantal ruim verdubbeld. Ook de Boomleeuwerik ontwikkelt zich spectaculair. Hij heeft zich pas rond 2007 in de Coepelduynen gevestigd, maar inmiddels herbergt het gebied al meer dan 10 territoria. Zo geeft de inventarisatie waardevolle nieuwe inzichten over hoe de broedvogelstand in dit bijzonder gebied zich ontwikkelt. Tegelijkertijd levert het inventariseren ook andere leuke waarnemingen op. De Coepelduynen liggen tenslotte op een snelweg voor de voorjaarstrek. Beflijsters, Slechtvalk, Bruine Kiekendieven, Tapuiten, Steppekiekendief en Wielewaal. Het was goed toeven voor de inventariseerders in de Coepelduynen dit voorjaar!

Maandoverzicht

april

Na een zachte maartmaand volgde een koude april. De eerste tien dagen lagen de temperaturen met een zuidelijke stroming nog boven normaal. Daarna bepaalden storingen en lagedrukgebieden het weer. De wind zat veel in het noorden, waarmee koude lucht werd aangevoerd en het vaak stevig waaide. Het was daarbij zonnig en er viel weinig neerslag.



Dwerggors – 1 mei 2017 Noordwijk - Achterweg © Jaap Dijkhuizen

De **Siberische Taling** bleef nog tot 5 april in Polder Hoogeweg (RG e.a.). De overwinterende **Dwerggorzen** zaten tot 14 april bij de Achterweg (WB), een gebruikelijke timing voor de terugtrek naar de broedgebieden. Ook de influx van burgemeesters ijde nog wat na. In de tweede helft van de maand deden 3 verschillende **Kleine Burgemeesters** af en toe de Binnenwatering aan, met de laatste op 28 april (AM PS). Ook de **Grote Burgemeesters** leken in maart vertrokken, maar op 14 april verscheen er weer één bij de Binnenwatering die zich tot het einde van de maand regelmatig liet zien (AM) en ook af en toe langs de zeetrekhut vloog (JD PS). Op 2 april vloog een **Zeearend** over de Zilkerduinweg (SP). Op het strand van de AWD zat op 3 april een hybride **Bonte x Zwarte Kraai** (MM). Met het koude weer waren de sterns laat. De eerste **Grote Stern** vloog pas op 9 april langs de zeetrekhut

(JD). Normaal komen de **Visdieven** daarna, maar die waren al vanaf 2 april te zien (PS). Op 10 april vlogen groepjes van 8 **Grote Zee-eenden** en 5 **Toppers** langs (JD). De piek van de doortrek van **Dwergmeeuwen** lag rond het midden van de maand, met 1142 vogels op 17 april (JD PS). Ondanks het koude weer waren de aankomsten van zomergasten rond de normale tijd of een paar dagen vroeg, met o.a. **Nachtegaal** op 7 april in De Blink (JL), **Sprinkhaanzanger** op 9 april langs de boulevard (CZ) en **Gierzwaluw** op 23 april boven Noordwijkhout (SP). Laat was **Tapuit** met de eerste op 2 april in de Coepelduynen (GB), **Oeverzwaluw** op 21 april in de Zwetterpolder en **Koekoek**, met de eerste op 26 april in de AWD (KV) en bij de Noordwijkse Golfclub (RG). De **Fluiter** die op 22 april in Nieuw-Leeuwenhorst (HV WB) was de op één na vroegste ooit. Op 29 en 30 april was er op 3 verschillende plekken in de zuidelijke AWD één te horen (MK EB). Casper Zuyderduyn ontdekte op 9 april de zingende **Iberische Tjiftjaf** aan de Prins Hendrikweg in Noordwijk aan Zee (CZ). Op 10 april liet een **Hop** zich even zien bij de Noordwijkerhoek in de Elsgeesterpolder (SG). In de eerste helft van de maand vlogen één tot twee **Raven** rond in de AWD (MK e.a.). De laatste waarneming was van 2 overvliegende vogels over



Bosruiter – 30 april 2017 Amsterdamse Waterleidingduinen - Weitje van de Blauwe Paal © Marc Kolkman

het Langeveld (RG). In de Van Limburg Stirumvallei in de AWD streken op 18 april 3 **Morinelplevieren** neer (WB JV). Op 21 april vloog een **Rode Wouw** over de AWD (JW). De laatste twee dagen van de maanden leverden aardige roofvogeltrek, met minimaal 7 **Bruine Kiekendieven** op 30 april (CZ ea) en op beide dagen een **Visarend** (PS CZ ea). Op 30 april vloog boven 's Gravendijk ook de eerste **Boomvalk** van het seizoen (CZ). Op 29 april vlogen 2 **Kraanvogels** over de Elsgeesterpolder (RG). In de laatste week van april was er veel doortrek van **Tapuiten**, met tot 8 vogels in de Elsgeesterpolder (JZ ea). Op 30 april zat er een **Bonte Vliegenvanger** in de AWD in het Achterhaasveld (RD). Op het Weitje van de Blauwe Paal was die dag een **Bosruiter** neergestreken (MK).

Op 16 april liep er een **Wezel** in De Blink (PS). Op 29 april vloog een **Oranjetipje** bij de Kraaierslaan in de Noordzijderpolder (JB).



*Koekoek 7 mei 2017 ©Casper Zuyderduyn
Noordwijk (gemeente)*

Mei

Het droge weer zette zich voort in mei. De maand begon somber en koel. Daarna werd het onder invloed van een hogedrukgebied warmer. Met een heldere nacht en aanvoer van koude polaire wind ging op 9 mei de temperatuur nog richting het vriespunt. De tweede helft van de maand bracht een zuidelijke stroming warme lucht en de maand eindigde met extreem warm weer met zomerse temperaturen.




Hop – 6 mei Coepelduynen © Johnny van der Zwaag

De **Iberische Tjiftjaf** bleef aanwezig t/m 12 mei (CZ). Op 1 mei vloog een **Kraanvogel** over de Achterweg (KV). Op 11 mei trok een tweedejaars **Steppekiekendief** over de Coepelduynen (CZ) en de Noordzijderpolder (MW) naar noord. De vogel was al aangekondigd vanaf de trektpost Berkheide. Dezelfde dag vloog een **Zwarte Wouw** over de AWD (CD). Later in de maand vloog er op 22 mei een **Wespendief** over de Noordzijderpolder en op 27 mei een **Visarend** over de Luchter Zeeduinen (MW). Een **Draaihals** verbleef op 3 mei op Solassi (RJ) en op 6 mei was er een **Hop** mooi te zien bij de camping Noordduinen in Katwijk (PD ea). In het Langeveld was een **Noordse Kwikstaart** neergestreken (CF ea). Tussen 5 en 9 mei was er met noordenwind goede zee trek, vooral van honderden sterns. Massale steltloper trek bleef uit, met 5 mei als enige uitschieter met 611 **Kanoeten** en een mooie variatie van andere soorten (JD HV). Op 7 mei passeerden meer dan 2400 **Zwarte Zee-eenden** (uurrecord voor mei) en 2 **Kleine Jagers** (JD PS). Beste dag voor de sterns was 8 mei toen bijna 1700

Visdieven/Noordse Sterns langs de hut trokken, waarvan zeker 29 **Noordse Sterns** (JD HV). Verder passeerden 115 **Zwarte Sterns** en een **Kleine Jager**. Doortrekkende **Paapjes** zijn schaars in het voorjaar. Op 3 mei zat er één in AWD de Wouwen (MK) en op 6 mei één in AWD Westhoek (JZ) en langs de Duindamse Slag (JB). Daar zaten op 4 en 6 mei ook minimaal 10 **Tapuiten** (RM ea). Op 11 mei zaten een **Bonte Vliegenvanger** man en een **Spotvogel** in Rijnsoever (AM PD). Over de Coepelduynen vloog die dag een vrouw **Wielewaal** (CZ). Op 19 mei vloog er één over de Noordduinen (KB). In de zuidelijke AWD zongen tussen 13 en 21 mei minimaal twee **Wielewalen** (LS ea). Ook zong er een **Fluiter** van 3 tot 17 mei in de AWD Schrama (MK ea). Op 10 mei was een zingende Fluiter aanwezig in de binnenduintrand van de Noordduinen bij het Staatsbosbeheer kantoor (CZ ea). Op 8 mei liet een laat **Bokje** zich opstoten in de Coepelduynen (CZ ML). Een late **Beflijster** zat op 12 mei in de Noordduinen bij de Duindamseslag (KB). De tweedejaars **Grote Burgemeester** gaf op 13 mei nog een keer acte de présence op het Wantveld Katwijk (AM). Veel buiten zijn en goed letten op het karakteristieke geluid kan tegenwoordig in het voorjaar zomaar **Bijeneters** opleveren. Op 21 mei vlogen er minimaal 3 over de Noordduinen (MW) en op 28 mei 1 over Willem v.d. Bergh (CZ). Die dag zat er ook een **Kwartel** in het Middengebied van Noordwijk (CZ). Op 24 mei vloog er een **Europese Kanarie** over Noordwijkerhout (JDo).

Op 17 en 23 mei was een **Oranjetipje** aanwezig in de Noordduinen, noordrand Noordwijk (KB). Een **Vuurjuffer** was op 14 mei aanwezig langs de Achterweg (CZ) en op 28 mei twee in Rijnsoever (ML). Op 22 en 25 mei zaten er **Tengere Grasjuffers** in AWD bij het Weitje van de Blauwe Paal (MO ea). Op 28 mei dook de zeldzame **Gevlekte Witsnuitlibel** op in de duintrand van Willem vd Bergh (CZ ML). Op 31 mei zaten er twee in de Noordduinen (CZ).



Bokje – 1 april 2017 Amsterdamse Waterleidingduinen - Westhoek © Marc Kolkman



Gevlekte witsnuitlibel – 28 mei 2017 Noordwijk - Willem v.d. Bergh (Stichting) © Casper Zuyderduyn

juni

De junimaand was de warmste van de eeuw, samen met die van de warme zomer van 1976. Alleen van 3 juni tot 7 juni was het wat frisser met een zuidwestelijke stroming. Op 6 juni stond er een zomerstorm. De rest van de maand bracht rustig zomerweer met hoge temperaturen. De laatste week bracht onweersbuien en, voor het eerst in het voorjaar behoorlijke hoeveelheden regen.

Maarten Wielstra volgt over de Noordzijdepolder de nachttrek door het maken van geluidsopnames. Dat leverde in juni een aantal voor Noordwijk zeer bijzondere soorten op: op 3 juni een overvliegende **Kwak**, op 13 juni een **Porseleinhoen**, op 14 juni een **Nachtzwaluw** en een **Kleinst Waterhoen** (MW). De laatste is een nieuwe soort voor Noordwijk. Daarnaast leverde dit 3 **Kwartels**, 3 **Waterrallen** en een **Kluut** op (MW). Op 1 juni was nog een **Oeverloper** aanwezig in het Langeveld (JD). De vogel op 22 juni bij de Binnenwatering (AM) was waarschijnlijk al weer een vroege najaarstrekker. Op 4 juni streek, samen met een **Bonte Strandloper**, een **Temminck's Strandloper** neer op het Weitje van de Blauwe Paal in de AWD (MK). Dit is pas de tweede waarneming voor ons waarnemingsgebied. In de Hogeveense Polder zat op 4 juni nog een late vrouw **Tapuit** (PS). Op 10 en 14 juni trokken er late **Visarenden** over, de eerste over Noordwijk aan Zee (CZ), de tweede over de AWD (AP). **Slechtvalken** kunnen tegenwoordig het hele jaar door worden gezien. Op 9 juni vloog er één over het Langeveld (RG). Op 26 juni cirkelden 2 **Wespendieven** boven Solassi (RJ) en ook de volgende dag was er één aanwezig in het Langeveld (RG), waarschijnlijk vogels van een broedpaar ergens in de duinstreek. Op 10 juni was er sterke trek van **Kruisbekken** over het duin, met ca. 250 over de Coepelduynen (CZ AM). Op 11 juni vloog een **Bijeneter** over het Wantveld Katwijk (PG). Op 20 juni was er opvallende trek van **Gierzwaluwen**. Ook langs de zeetrekhut trokken er meer dan 300 langs (JD). Langs de zeetrekhut vloog op 20 juni een **Reuzenster**, op 28 juni een **Velduil** en 29 juni een man **IJseend** (JD). Voor de Reuzenster was dit de tweede juniwaarneming voor ons waarnemingsgebied, voor Velduil en IJseend de eerste. Andere bijzondere waarnemingen voor de zeetrek in juni waren een **Bruine Kiekendief** op 15 juni en een adulte **Drieteenmeeuw** op 21 juni (JD).

Op 18 mei liep er een **Wezel** langs de Oosterduinen, Noordwijkerhout (PH) en op 21 mei één in De Blink (RG). De zeldzame **Duinparelmoervlinder** dook op twee plekken op: op 4 juni in De Blink (FS) en op 11 juni in de Coepelduynen (RG). Op 25 juni vloog een **Eikenpage** in Klein Leeuwenhorst (FS).

Waarnemers

AM	Annelies Marijnis	JL	Jan Hendrik Labots	MW	Maarten Wielstra
AP	André van der Plas	JV	Jan Veeffkind	PD	Peter van Duijn
AR	August van Rijn	JW	Jan Wierda	PG	Paul Gnodde
CD	Camilla Dreef	JZ	Jos Zonneveld	PS	Peter Spierenburg
CF	Cornelis Fokker	KD	Klaas van den Berg	RD	Rineke Dedding en Axel Duivenvoorden
CZ	Casper Zuyderduyn	KV	Koene Vegter	RG	Reinder Genuit
EB	Edwin Beijeman	LS	Leo Schaap	RJ	Rob Jansson
FS	Frank Peter Scheenstra	MD	Menno van Duijn	RM	Rob de Mooij
GB	Gijsbert van der Bent	MH	Max Hazenoot	SH	Sarah Humphrey
HSt	Hans ter Steeghe	MK	Marc Kolkman	SG	Sam Gobin
HV	Hein Verkade	ML	Maarten Langbroek	SP	Sven Pekel
JB	Joost Bouwmeester	MM	Mars Muusse	WB	Wijdelt Boelema
JD	Jelle van Dijk	MMo	Maud Mommers	WBa	Willem Baalbergen
JDo	Joris van Duivenvoorden	MO	Micha d'Oliveira		

bron: www.waarneming.nl



Gierzwaluw met een volle krop voer voor de jongen.
foto: René van Rossum