

Alk	-	5	4	-	1
Kleine Alk	-	1	1	-	-
Turkse Tortel	-	1	1	-	-
duif	4	6	4	3	3
Roodborst	-	1	1	-	-
Merel	-	3	2	1	-
Zanglijster	1	2	2	1	-
Goudhaantje	-	2	1	1	-
Ekster	-	1	-	1	-
Kauw	-	2	2	-	-
Huismus	-	1	1	-	-
Valkparkiet	-	1	-	1	-
Egel	-	1	-	1	-
Totaal	11	56	32	21	14

Op vrijdag 9 oktober werd er een zeer verzwakte Buiszard afgeleverd bij het asiël. We dachten in eerste instantie aan een vergiftiging of infectie, maar, naar later bleek, had het beest geruime tijd klem gezeten onder

## Rondje Groen

W. Andelaar

*Als geen andere plaats leent Noordwijk zich voor een rondje strand en duin. Met de vuurtoren als middelpunt iets oppikken van wat de natuur te bieden heeft.*

Niet na de storm maar tijdens de storm moet je op het strand zijn, schreef Jan Verwey in de Levende Natuur. Rond 1920 vogelde hij actief rond Noordwijk en deed daar verslag van in het genoemde tijdschrift. In het artikel waar ik uit citeerde vertelde hij over waarnemingen van enkele Vorkstaartmeeuwen tijdens een zware storm langs het strand.

Nu zullen er ongetwijfeld leuke dingen te zien zijn tijdens een storm en is alleen het lekker uitwaaien op het strand al de moeite waard. Toch is er ook na een storm op het strand veel te beleven. In de eerste plaats is datgene wat is angespoeld het bekijken waard. Op de eilanden gaat de kreet: "Van alles op het strand" zo nu en dan door het dorp, maar in Noordwijk kan er ook van alles op het strand liggen. Geen vaten rum meer zoals in de dertiger jaren die met klompen vol werd opgedronken, maar vooral veel dierlijk en plantaardig materiaal. Zo kan het strand soms vol liggen met een soort zeemos, afkomstig uit de Oostzee. Grijs-bruinig spul dat hele stukken strand kan bedekken. Ik hoorde van iemand dat hij in dit mos stukjes barnsteen had gevonden. Versteend hars dat juist rond de Oostzee wordt gezocht om er sieraden van te maken.


Ook is het goed op de vogels te letten. Zelf zag ik een aantal jaren geleden op een dag na een storm een Vaal Stormvogeltje boven de inmiddels kalm geworden zee.

een stuk kippegaas. Het doorspoelen met norritsuspensie en de antibioticakuur zijn dus achteraf overbodig geweest. Niettemin was de Buiszard na een paar dagen al niet meer zonder handschoenen aan te pakken. Kuikens, paardevlees en levertraan deden het verdere werk en ruim een week later kon hij weer gelost worden in de buurt van waar hij gevonden was, bij de wassertoren ten zuiden van Katwijk.

De twee Jan van Genten zaten allebei zwaar onder de olie. De eerste kon, na te zijn schoongemaakt en weer een beetje te zijn aangesterkt, verder revalideren bij zijn soortgenoten te Ecomare op Texel. De tweede was eigenlijk al een stuk minder fel als de eerste toen hij gebracht werd en is na een week overleden aan de gevolgen van de olie.

Twee andere olieslachtoffers waren een Roodkeelduiker en een Roodhalsfuut. De Roodhalsfuut is een beetje een probleemgeval. Hij eet goed en blijft goed op gewicht, maar we (of liever gezegd de fuut) kunnen er maar niet in slagen om z'n verenpak waterdicht te krijgen. Hij is daarom nu al drie maanden een vaste gast in het asiël.

Voor het overige was het een rustig kwartaal. Voor een Egel werd in Valkenburg voor verdere opvang gezorgd en een Waterral werd na enkele dagen op Offem weer gelost.



Het beestje fladderde over het water, hier en daar iets oppikkend. Meeuwen zijn ook de moeite waard om er goed naar te kijken. Natuurlijk zo'n Vorkstaartmeeuw waar Verwey over sprak, maar dat blijft een zeldzaamheid. Maar na een echt zware storm, die meerdere dagen aanhoudt komen de meeuwen van de open zee, met name de Drieteenmeeuwen in moeilijkheden. Zij zien geen kans meer te foerageren op het woelige water en komen vermoeid en uitgehongerd naar het strand. Na de storm zijn ze dan op en langs het strand te zien. Ze komen daar tot rust en vinden voedsel in het angespoelde materiaal.

Het is een fraai meeuwtje met, zoals de gidsen aangeven, in inkt gedoopte vleugelpunten. Dat betreft dan de volwassen vogels. De jonge beesten hebben een v-vormige zwarte tekening op de bovenzvleugel en wat zwart aan kop en hals. ook missen ze nog de kenmerkende gele snavel. Het is wat je noemt een lief meeuwtje. Dit in tegenstelling tot b.v. de Zilvermeeuw die iets wreeds over zich heeft.



Drieteenmeeuw

In het broedgebied, de vogelrotsen in het noorden zijn ze vaak zo tam dat je ze haast op het nest kan aanraken. Dat doet me denken aan die keer dat we op een kiezelstrandje stonden met boven ons wat lage rotspartijen die bezaaid waren met broedende Drieteentjes.

Uit enkele nesten waren wat jongen gevallen, waarvan er één nog leefde. Natuurlijk wisten wij het beter dan de natuur en werd het beestje teruggezet in het nest er boven. De moeilijkheid was echter dat we niet wisten uit welk nest het kwam, zodat er op goed geluk één werd uitgekozen waar geen meeuw opzat. Toen deze terugkwam ging hij of zij op de rand van het nest zitten, kennelijk volkomen in de war. Je kon het dier horen denken: wat heb ik nou aan m'n klomp hangen. Lieve meeuwtjes, die hun nesten soms maken op de kozijnen van de pakhuizen in Noorse stadjes. In één van die stadjes, Alesund, staat in het centrum een rots met daarop ook een groot aantal broedende vogels. Totdat men er later een net over spande. De bewoners hadden last van de roep van de Drieteenmeeuw, het melodieuze "Kittiwake", waaraan het dier ook de Engelse naam te danken heeft.

De lieve Drieteenmeeuw tegenover de wrede Zilvermeeuw. Natuurlijk is dat maar onzin. We willen de dieren maar al te graag menselijke maatstaven aanleggen. Lief en wreed bestaan in de natuur niet. Dieren handelen maar uit één motief: zorg dat je blijft voortbestaan.

## Bijzondere Soorten Project 1992, de broedvogels

### Ab Steenvoorden

Sinds een aantal jaren verzamelt SOVON (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) gegevens over aantallen, verspreiding en aantalsverloop van broedvogels in Nederland. Omdat bij gewone inventarisaties lang niet alle delen van Nederland in z'n geheel worden geteld, heeft men voor een aantal "bijzondere soorten" broedvogels het BSP project opgezet. Hieronder vallen een aantal broedvogelsoorten, die landelijk of regionaal weinig voorkomen, en vrijwel alle soorten kolonievogels.

Het voordeel van dit BSP is dat het maar om een beperkt aantal soorten gaat, waar gericht naar gezocht kan worden. Hierdoor kunnen betrekkelijk grote gebieden in een relatief korte tijdsduur onderzocht worden. Het streven van SOVON is om de soorten die opgenomen zijn in het BSP jaarlijks landdekkend te inventariseren.

Ook onze vogelwerkgroep doet al verschillende jaren aan dit project mee. Wij beperken ons voorlopig nog tot een aantal soorten die in het project zijn opgenomen en bij ons in de omgeving als broedvogel voorkomen. Het ligt wel in de bedoeling om het aantal te tellen soorten in de komende jaren flink uit te breiden.

De vogelsoorten waarom het in dit project gaat zijn ingedeeld in vier verschillende categorieën:

- Kolonievogels
- Zeldzame Broedvogels
- Schaarse Broedvogels
- Algemene Broedvogels


Helaas komen er geen soorten bij ons in de omgeving tot broeden die in de categorie Zeldzame Broedvogels vallen.

De soorten die wij hebben geteld zijn:

**Kolonievogels:** Blauwe Reiger, Stormmeeuw en Visdief.

**Schaarse Broedvogels:** Boomvalk, Geelgors, Kuileeuwerik, Patrijs, Sperwer, Torenvalk, Zomertaling en Groene Specht.

**Algemene Broedvogels:** Gierzwaluw, Huiszwaluw, Kuifmees en Zwarte Roodstaart.



Kuifleeuwerik

### Resultaten van 1992

#### Kolonievogels

Blauwe Reiger; alleen in landgoed Offem in Noordwijk, 27 bewoonde nesten.

Stormmeeuw; één paar heeft gebroed op een gebouw