

Broedvogelinventarisatie in de duinen en landgoederen rond Noordwijk in 1993

samenstelling Rien Sluys

In dit artikel worden de resultaten van vijf, jaarlijks geïnterviewde, gebieden beschreven.

1 Coepelduynen

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar werd dit duingebied in z'n geheel geïnterviewd. Het deel dat grotendeels in de gemeente Katwijk ligt, werd onderzocht door *Bram Schoonenberg* (in 24 uren), terwijl *Kees Verweij* (13 uren) en *Jelle van Dijk* (15 uren) het Noordwijkse deel voor hun rekening namen. De gegevens op de veldkaarten werden volgens de richtlijnen van de "Handleiding SOVON Broedvogel Onderzoek" (uitgave 1993) uitgewerkt.

Het onderzochte gebied omvatte ook dit jaar weer het terrein van camping "de Noordduinen". Om de ontwikkelingen in het duingebied beter te belichten, worden de aantallen van het campingterrein hier in een eigen kolom gepresenteerd.

Tabel 1: Broedvogels van de Coepelduynen: 1989 t/m 1993

Soort	89	90	91	92	93	camping	Coepelduynen
Bergeend	2	1	1	1	1	-	1
Wilde Eend	4	2	2	1	-	-	-
Patrijs	10	9	7	8	5	-	5
Fazant	3	3	2	3	3	-	3
Wulp	1	1	1	1	1	-	-
Tortelduif	-	1	1	1	1	-	1
Houtduif	6	7	4	2	3	-	3
Groene Specht	-	-	1	-	-	-	-
Koekoek	7	4	4	3	3	-	3
Veldleeuwerik	26	20	16	6	5	-	5
Graspieper	38	41	39	22	18	-	18
Witte Kwikstaart	-	-	1	-	-	-	-
Winterkoning	3	9	5	1	2	-	2
Heggenmus	34	47	27	28	29	2	27
Roodborst	-	-	2	-	1	-	1
Nachtegaal	6	6	4	-	3	3	-
Roodborttapuit	6	8	7	2	6	-	6
Tapuit	9	11	12	5	4	-	4
Merel	16	20	16	14	16	6	10
Sprinkhaanzanger	2	1	1	1	1	-	1
Bosrietzanger	3	-	-	-	1	-	1
Braamsluiper	1	1	1	3	2	1	1
Grasmus	35	35	23	34	33	3	30
Tuinfluit	-	-	-	1	-	-	-
Zwartkop	1	1	1	-	2	1	1

Spotvogel	-	1	1	-	-	-	-
Tijftjaf	1	6	1	3	3	-	3
Fitis	30	24	9	8	7	4	3
Pimpelmees	-	-	1	-	-	-	-
Koolmees	3	2	2	3	4	2	2
Ekster	5	6	7	3	11	1	10
Kneu	43	51	47	38	34	1	33
Roodmus	-	-	-	-	1	-	1
Totaal soorten	26	26	30	24	27	10	25
Totaal broedparen	297	317	243	196	198	24	174
Inventarisatietijd in uren	49	74	65	46	54	44	

In het verslag over het broedseizoen 1992 werd opgemerkt dat de afname van het aantal broedvogels die in 1991 was vastgesteld, in 1992 onverminderd was doorgegaan. De resultaten van 1993 wekken de indruk dat de toestand zich nu enigszins stabiliseert. Als de aantallen op het campingterrein in alle jaren niet worden meegeteld zijn de jaartotalen voor de periode 1989-93: 269 - 284 - 231 - 175 - 174.

Om te kijken of deze stabilisatie voor alle groepen broedvogels geldt, zetten we de cijfers voor bodembroeders en struweelbroeders eens op een rijtje. Voor de bodembroeders tellen we de aantallen van de volgende soorten bij elkaar op: Patrijs, Veldleeuwerik, Graspieper, Tapuit, Fitis. Voor de struweelbroeders nemen we de aantallen van de volgende soorten bij elkaar: Heggenmus, Merel, Grasmus, Kneu. De aantallen van de camping zijn hierbij niet meegeteld.


Soort/Jaar	1989	1990	1991	1992	1993
bodembroeders	108	98	81	44	35
struweelbroeders	116	135	110	104	100

De bovenstaande cijfers laten duidelijk zien dat de afname van het aantal broedvogels vooral op conto van de bodembroeders kan worden geschreven. De achteruitgang bij deze groep lijkt zelfs nu nog niet gestopt te zijn.

Toen in de winter van 1992/93 nieuwe hekken werden geplaatst en het grootste deel van het terrein gedurende het broedseizoen voor het publiek werd afgesloten, spraken sommige optimisten de verwachting uit dat met name de grondbroeders hiervan zouden profiteren. Hoewel het erg vroeg is om na één seizoen hierover al een uitspraak te doen, zou een dergelijke ontwikkeling hoogst opmerkelijk zijn geweest. Immers de spectaculaire afname van het aantal grondbroeders ging niet gepaard met een opvallende toename van de recreatie in dit gebied.

Er viel de laatste jaren weliswaar een lichte toename van het aantal wandelaars waar te nemen, maar deze toename heeft vermoedelijk niets te maken met het instorten van de stand van de grondbroeders.

Al in eerdere verslagen is opgemerkt dat de aanwezigheid van vossen in het terrein waarschijnlijk van veel grotere betekenis is. In 1993 werden door een medewerker van Staatsbosbeheer zeven bouwen gelokaliseerd. Voor een terrein als de Coepelduynen met een oppervlakte van een kleine 200 ha is dit een respectabel aantal.



graspieper

Met de grotere grondbroeders is het droevig gesteld. Dit jaar zijn nog enkele roepende Fazanten waargenomen, maar hennen, laat staan hennen met jongen, worden de laatste jaren niet meer waargenomen. Patrijzen zijn moeilijk te tellen, maar dat de aantallen sterk zijn afgenomen is een feit. Waarnemingen in juni van paartjes zonder jongen doen vermoeden dat het broedresultaat slecht genoemd kan worden. De Wulp komt nog wel ieder voorjaar terug in de Coepelduynen, maar een alarmerende vogel (dit duidt op uitgelopen jongen) is na 1984 niet meer waargenomen. Ook de Bergeenden komen ieder jaar terug. Van deze vogels is het broedresultaat bijzonder moeilijk vast te stellen. In ieder geval bleven ze langer in het terrein dan de Wulpen, zodat wellicht het broeden toch nog tot een goed einde is gebracht.

De ontwikkelingen bij de kleine bodembroeders stemmen ook niet bepaald vrolijk. Het gebied Coepelduynen vormde tot voor kort nog een bolwerk voor typische soorten van het open zeedorpenlandschap zoals Tapuit, Veldleeuwerik en Graspieper. Veldleeuwerik en Tapuit staan bijna op het punt uit deze duinen te verdwijnen. Werde er in 1992 nog een paartje Tapuiten met jongen waargenomen, nu was zelfs dat niet meer het geval. Het aantal Graspiepers loopt minder snel terug, maar de verspreiding is nu vrijwel beperkt tot de zeereep. Twee jaar geleden broedden nog 19 paren ten oosten van het fietspad, nu zijn het er nog maar vier. Dat een algemene vogel als de Fitis ook vrijwel uit deze duinen zou verdwijnen, leek enkele jaren geleden nog een onmogelijkheid. De drie paren die nu nog konden worden ingetekend, bevonden zich aan de uiterste oostgrens van het terrein, namelijk vrijwel op het terrein van de Van den Bergh-Leefgemeenschap en het ESTEC-terrein.

Gelukkig valt er ook nog iets positiefs te melden. De Roodborsttapuit deed het verrassend goed. Er waren zes paartjes aanwezig en bij zeker vier paren was van een goed broedresultaat sprake. Het is bekend dat het nest van deze soort bijzonder moeilijk te vinden is. Het ligt diep weggestopt in ruige vegetatie en is van bovenaf meestal niet te zien. Wel is het zo dat nu alle territoria in de zeereep liggen.

Voor het eerst kon het Paapje op de broedvogellijst worden geplaatst. Het broeden werd niet met zekerheid vastgesteld, maar de aanwezigheid van een zingend mannetje tot in juni voldoet volgens de SOVON richtlijnen aan de norm voor een territorium. Datzelfde kan gezegd worden van de Roodmus, die op 31 mei door Leo van Ruiten werd ontdekt en nog op 13 juni zingend in de noordelijke Coepelduynen werd waargenomen.

2 Noordduinen-west.

Géinventariseerd door Arie Cramer en Jan Glasbergen.

Grootte: 53 ha. Voor het negende achtereenvolgende jaar werd deze kavel onderzocht. Het gebied bestaat voornamelijk uit duingraslanden, struweel en laag, aangeplant loofhout. Plaatselijk is nog een restant naalddhout aanwezig. Ook in deze kavel gaat de Veldleeuwerik langzaam achteruit. De vogels broeden hier voornamelijk op een voormalige kapvlakte, met een mozaiek van schaars begroeide mosvlakten met lage kruiden en helmgraslanden. Langzamerhand begint dit gebied blijkbaar te veel begroeid te raken.

Tabel 2: Broedvogels van de Noordduinen-west 1984-1993

Soort	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
								(1)		
Bergeend	-	-	-	1	1	1	-		-	-
Wilde Eend	1	1	2	2	1	1	-	2	-	-
Torenvalk	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrijs	2	4	3	3	2	3	2	1	-	-
Fazant	1	2	2	1	1	1	1	1	1	3
Kievit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wulp	2	1	1	1	1	1	-	-	-	
Houtduif	10	13	14	9	7	7	8	8	5	8
Tortelduif	3	1	3	1	1	3	4	3	3	2
Koekoek	2	3	2	2	3	2	1	1	2	2
Veldleeuwerik	15	16	14	12	12	13	12	11	4	1
Boompieper	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Graspieper	12	7	7	6	9	18	22	17	22	17
Winterkoning	-	1	1	-	1	8	8	3	1	1
Heggenmus	20	19	25	24	27	17	16	14	18	18
Roodborst	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
Nachtegaal	6	9	14	16	13	11	11	15	14	12
Roodborsttapuit	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Tapuit	5	4	6	6	7	9	7	6	2	4
Merel	5	5	5	3	5	6	3	2	2	4
Sprinkhaanriet-zanger	-	1	2	1	1	1	-	1	-	-
Bosrietzanger	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Braamsluiper	-	3	2	2	1	2	2	2	1	2
Grasmus	15	15	11	17	21	15	13	10	9	12
Fitis	21	14	13	16	24	22	16	10	7	7
Koolmees	2	3	1	3	3	1	-	-	-	2
Vlaamse Gaai	1	1	1	1	1	1	1	3	1	2
Ekster	5	7	7	8	8	8	8	7	6	8
Zwarte Kraai	-	2	2	2	2	1	-	-	1	1
Ringmus	-	1	2	3?	-	1	-	-	-	-
Kneu	35	30	25	14	12	12	10	9	9	6
Inventarisatie-tijd in uren	35	32	33	33	33	36	33	33	32	32

3 Noordduinen-oost


Geïnvventariseerd door Jelle van Dijk

Grootte: ca 32 ha. SOVON-nr. 721. Er werden in totaal tien inventarisatierondes gelopen, die bij elkaar veertien uren in beslag namen. Het gebied bestaat grotendeels uit dennenbos. Alleen langs de binnenduinarand en langs de Weideweg is loofhout aanwezig. Langs de binnenduinarand loopt een verkeersweg die intensief wordt gebruikt. Het gebied werd voor het vijfde achtereenvolgende jaar onderzocht.

Tabel 3: Broedvogels van de Noordduinen-oost in 1989 t/m 1993

soort	1989	1990	1991	1992	1993
Fazant	2	2	2	2	1
Houtsnip	–	–	–	1	–
Holeduif	1	–	2	2	–
Houtduif	9	10	16	7	6
Tortelduif	1	1	–	1	–
Bosuil	–	–	–	1	–
Zwarte Specht	1	–	–	–	–
Grote Bonte Specht	1	1	1	1	1
Groene Specht	–	–	–	1	1
Boompieper	5	5	2	–	–
Winterkoning	13	10	4	3	5
Heggemus	2	3	3	2	–
Roodborst	21	13	11	9	6
Nachtegaal	4	2	3	–	–
Merel	9	9	3	4	5
Zanglijster	1	–	–	–	–
Grote Lijster	2	1	–	–	1
Tuinfluit	1	–	–	–	–
Zwartkop	5	5	3	5	3
Fluiter	–	1	–	–	–
Tijftjaf	11	9	10	8	8
Fitis	10	7	4	1	–
Staartmees	–	–	–	1	–
Glanskop	3	1	2	2	3
Kuifmees	2	3	4	2	2
Pimpelmees	2	–	1	1	2
Koolmees	4	4	5	3	2
Boomkruiper	4	4	4	3	2
Vlaamse Gaai	3	3	5	1	2
Ekster	2	–	–	–	–
Zwarte Kraai	1	3	2	–	–
Vink	8	11	8	9	10
Groenling	1	2	4	3	–
Totaal aantal soorten	28	23	22	24	17
Totaal aantal broedgevallen	129	110	99	73	60

Uit de tellingen van de afgelopen jaren blijkt duidelijk dat het aantal broedvogels in dit deel van de Noordduinen sterk is teruggelopen. In het terrein zelf zien wij weinig veranderingen. Hier en daar zou het gebied iets aantrekkelijker geworden kunnen zijn door het tot ontwikkeling komen van enige struikgroei onder de dennen. Aan de andere kant heeft het hoger worden van jonge aanplant ongetwijfeld een negatieve invloed gehad op de aantallen van Boompieper en Fitis.



Vink

Van groter belang dan de kleine veranderingen in de begroeiing, is vermoedelijk de toegenomen recreatie in dit gebied. Het vogelrijkste gedeelte is de binnenduinarand waar het meeste loofhout is te vinden. Deze smalle strook wordt over de gehele lengte doorsneden door de Randweg, die de laatste jaren steeds drukker is geworden. In het boekje "Het voorspellen van het effect van snelverkeer op broedvogelpopulatie" (Reijnen, Veenbaas & Foppen 1992), wordt aangegeven dat bij een geringe verkeersintensiteit en een maximumsnelheid van 80 km per uur toch al tot op enkele tientallen meters van een negatieve invloed sprake is.

Soort/Jaar	1989	1990	1991	1992	1993
bodembroeders	35	22	18	10	6
struweelbroeders	31	27	20	18	16

De strook loofhout tussen de Randweg en de polder is hier en daar niet meer dan tien meter breed. Het verdwijnen van veel broedvogels uit juist deze zone zou hiermee verband kunnen houden. Ook de recreatie in het bos zelf (wandelaars al of niet met honden, trimmers) is vermoedelijk nog verder toegenomen. Dat er in dit terrein andere invloeden spelen dan in de Coepelduynen moge blijken uit een vergelijking tussen bodembroeders (Roodborst, Nachtegaal, Fitis) en struweelbroeders (Winterkoning, Heggemus, Zwartkop, Tijftjaf).

In de Coepelduynen bleven de struweelbroeders in deze periode vrijwel op hetzelfde niveau (14% achteruit) en liep het aantal bodembroeders terug met 68%. Voor dit deel van de Noordduinen gelden de percentages: bodembroeders 83% achteruit en struweelbroeders 48% achteruit. De komende jaren zal blijken of met de aantallen van 1993 het dieptepunt is bereikt.

4 Nieuw-Leeuwenhorst

Geïnvventariseerd door Marian Bos en Dick Hoek.

Groote ca. 15 ha. Voor het tiende achtereenvolgende jaar werd dit terrein volgens BMP-methode onderzocht.



Boomkruiper *Certhia brachydactyla*

Tabel 4: Broedvogels van een gedeelte van Nieuw-Leeuwenhorst: 1984-1993

Soort	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
Blauwe Reiger	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Wilde Eend	3	5	6	5	5	9	5	13	8	5
Sperwer	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
Torenvalk	1	1	1	1	0	-	-	-	-	0
Fazant	1	2	2	2	2	3	3	3	1	-
Waterhoen	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Meerkoet	-	2	1	2	2	-	-	1	-	-
Houtsnip	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Holeduif	4	7	6	7	8	7	8	11	8	6
Houtduif	20	15	16	15	12	12	13	15	20	
Turkse Tortel	2	1	2	2	2	2	3	3	3	3
Tortelduif	5	5	6	6	4	1	1	1	4	1
Koekoek	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-
Bosuil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ransuil	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Groene Specht	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
Grote Bonte Specht	7	7	7	6	5	5	5	6	6	5
Kl. Bonte Specht	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winterkoning	17	17	12	16	21	26	24	16	17	18
Heggemus	9	8	5	5	2	4	4	5	6	4
Roodborst	16	19	20	14	20	19	24	21	24	23
Nachtegaal	-	-	1	3	2	2	2	4	4	3
Gekr. Roodstaart	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Merel	19	17	18	14	15	17	18	14	16	17
Zanglijster	4	4	5	5	4	4	4	4	6	5
Grote Lijster	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1
Bosrietzanger	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-
Grasmus	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-
Tuinfluit	2	4	5	7	8	5	4	4	2	2
Zwartkop	9	11	9	7	8	9	9	4	9	9
Fluiter	-	-	-	2	4	-	1	-	-	1
Tijftjaf	12	10	9	10	11	10	11	10	8	11
Fitis	13	10	8	7	6	5	5	5	2	5
Grauwe Vliegenvanger	1	3	-	4	1	3	2	3	3	2
Staartmees	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Glanskop	3	2	4	5	4	4	3	3	4	3
Matkop	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Pimpelmees	20	22	15	21	18	15	15	21	21	19
Koolmees	35	34	31	26	25	22	21	24	23	26
Boomklever	2	1	-	2	1	-	-	-	1	-
Boomkruiper	5	7	6	5	5	6	6	6	6	5
Wielewaal	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Vlaamse Gaai	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4
Ekster	2	2	2	2	2	3	4	4	4	5
Kauw	25	25	20	25	20	30	20	25	25	33
Zwarte Kraai	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2
Spreeuw	22	20	12	15	5	10	3	2	7	1
Huismus	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-
Ringmus	16	8	2	2	2	-	-	-	-	-
Vink	2	4	2	4	5	4	1	1	3	1
Groenling	1	4	1	1	1	-	-	-	-	-
Inventarisatietijd in uren	25	25	20	20	18	30	31	30	31	30

Min of meer bijzondere waarnemingen:

10 april: 1 paartje baltsende Mandarijneenden in boom op circa 6 meter hoogte.

5 mei: 1 Bonte Vliegenvanger mannetje.

10 mei: 3 zingende Fluiters.

17 juni: 1 fluiternest met jongen.

Van de Bosuil vlogen 2 jongen uit.

Zoogdieren:

Vleermuis op 8 april en 28 juni: 1 ex. (waarschijnlijk Dwergvleermuis).

Vos: 3 en 10 mei: 1 ex.

Eekhoorn: 2 ex. op 18 en 30 maart en op 10 april. 1 ex. op 9 maart.

Opvallende trends e.d. vanaf 1984

Ringmus: Sinds 1989 geen broedvogel meer. In 1984 nog 16 paar.

Spreeuw: Sterk verminderd van 22 paar in 1984 naar 1 paar in 1993.

5 Offem

Geïnvventariseerd door Hein Verkade en Richard Zonneveld.

Grootte: ca. 32 ha. Voor het 22e achtereenvolgende jaar werd Offem geïnvventariseerd op broedvogels. Opvallend zijn de vijf vraagtekens welke in de tabel voorkomen. Het genoteerde aantal broedparen is het aantal territoriumhoudende paren dat er volgens de landelijk SOVON-methode op Offem zou huizen. Bij een aantal soorten valt echter sterk te twijfelen of dit daadwerkelijk het geval is geweest of dat er vrij zeker niet tot broeden werd overgegaan.



Boomvalk

Zo hebben de Turkse Tortel en de Nijlgans vrij zeker buiten het landgoed gebroed. De Wielewaal betrouwt waarschijnlijk een doortrekker en geen territoriumhouder. Het aantal paren Sperwers is volgens de genoemde methode één, maar in werkelijkheid vermoedelijk twee. De Boomvalk tenslotte betreft een ander probleem. Niet eenmaal werd tijdens de bezoeken aan het landgoed de Boomvalk aangetroffen. Toch bleek bij navraag dat deze roofvogel zeer waarschijnlijk succesvol gebroed te hebben! Het nest zou zich vlak bij de plaats bevonden hebben waar in 1992 gebroed werd. Toen bleef de Boomvalk bij geen enkel bezoek in mei en juni onopgemerkt. De achteruitgang van de Blauwe Reiger lijkt niet te stuiten. In vier jaar tijd is het aantal broedparen meer dan gehalveerd. Strengere winters zouden zo'n daling kunnen verklaren. De afgelopen winters kenmerkten zich echter door opvallend hoge temperaturen.

Tabel 5: Broedvogels van Offem: 1984-1993

Soort	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
Fuut	2	1	1	3	-	-	-	-	2	-
Blauwe Reiger	15	22	18	21	21	28	40	33	27	19
Wilde Eend	5-10	5-10	-	-	-	-	-	-	-	-
Sperwer	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1?
Torenvalk	1-2	1	1?	-	-	-	-	1	-	-
Boomvalk	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1?
Fazant	2	2	2	3	3	4	3	2	3	3
Waterhoen	5	1-3	2-4	-	-	-	-	-	-	-
Meerkoet	-	-	1	-	3	5	8	7	2	5

Holeduif	5	3-4	4	7	6	10	10	8	10	12
Houtduif	20	25	20	15	19	32	24	20	24	28
Turkse Tortel	4	3	3	1-2	2	1	3	-	-	1?
Tortelduif	3	4	-	1	1	2	-	1	3	
Bosuil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Gierzwaluw	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
Groene Specht	2-3	1	-	1	-	1	1	2	1	2
Grote Bonte Specht	2-3	2-3	4	3	4	4	4	4	5	6
Zwarte Specht	1?	-	-	-	-	-	-	-	-	
Winterkoning	23	14	15	19	23	31	43	37	38	30
Heggenmus	6	7	5	4	3	5	6	8	6	6
Roodborst	10	9	17	17	12	24	28	25	21	18
Nachtegaal	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Merel	19	15	12	18	16	36	32	37	33	27
Zanglijster	3	1	3	5	5	7	5	3	7	4
Tuinfluitier	4	?	3	5	7	7	6	6	4	5
Zwartkop	6	7	7	6	6	10	10	8	10	11
Fluitier	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Tijftjaf	12	9	8	10	11	17	29	20	20	21
Fitis	8	6	8	10	7	8	7	7	5	2
Grauwe Vliegenvanger	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
Staartmees	2	-	2	-	1	2	2	2	2	2
Glanskop	-	0-1	-	1	-	1	2	1	1	1
Pimpelmees	15	12	4	16	13	16	21	26	19	20
Koolmees	35	33	15	33	23	27	36	39	30	29
Boomklever	-	1	1?	2	1	1	1	2	-	-
Boomkruiper	6	6	7	4	5	6	9	9	6	6
Wielewaal	1?	-	-	-	-	-	-	-	-	1?
Vlaamse Gaai	2-4	2-3	3-4	3	2	4	2	4	4	3
Ekster	2	1	1	1	1	1	2	3	3	3
Kauw	12-15	15-20	-20	15-20	7	12	8	10	11	16
Zwarte Kraai	-	1-2	1	1	1	3	2	3	3	3
Spreeuw	15	10	25	15	?	14	13	13	11	8
Huismus	8	5	7	?	?	4	?	3	4	7
Vink	2	-	-	2	2	1	-	-	-	-
Groenling	3	0-2	0-2	2	2	2	-	1	-	-
Nijlgans	1?	-	-	-	-	-	-	1	1	1
Inventarisatietijd in uren	24	10-5	18	21	21	28-5	29	43	33	

?: aanwezig als broedvogel, aantal niet bekend