

Broedvogelinventarisaties in de Amsterdamse Waterleidingduinen in 1993

Samenstelling Rien Sluys


In dit artikel worden de inventarisaties die plaatsvonden in de 5 kavels in de Amsterdamse Waterleidingduinen beschreven.

1 Gijs Kokkieshoek

geïnventarieerd door E. Aartse & H. van Emmerik

Terreinomschrijving:

Het geïnventarieerde gebied wordt in het noorden begrensd door de Halfwegse Slag, in het oosten door het rijwielpad, in het zuiden door de Langevelderslag en in het westen door de Houtweg. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 47 ha. waarvan:
circa 7 ha. duinberkenbos
circa 15 ha. duindoorn/vlierstruweel
circa 5 ha. stuifzand en stuifplekken
circa 20 ha. open duin met Duinriet, Zandzegge en Helm.



Tapuit

Volgens het beheersplan wordt een beperkte verstui-
ving toegelaten.

Het terrein is erg geaccidenteerd. Vanaf de Langevel-
derberg (27 m + NAP) loopt het terrein glooiend af
naar de Langevelderslag en de Halfwegse Slag. Paden
komen in het terrein niet meer voor. De oude voerb-
anen zijn thans geheel dichtgegroeid. De Rozendel is
nauwelijks meer begaanbaar.

Het terrein is 17 maal bezocht. Het totaal aantal tel-
uren was 48, waardoor de gemiddelde
inventarisatieduur 2.8 uur bedroeg.

Tabel 1: Broedvogels van Gijs Kok-
kieshoek: 1986 t/m 1993

Soort	86	87	88	89	90	91	92	93
Bergeend	-	-	-	1	-	-	-	-
Patrijs	1	1	1	-	-	-	-	-
Fazant	3	3	3	3	3	2	1	-
Scholekster	-	-	-	1	-	-	-	-
Wulp	2	2	-	1	1	1	-	1
Houtduif	16	14	12	9	6	7	5	7
Zomertortel	2	2	2	2	1	1	1	2
Koekoek	1	1	1	1	1	1	1	1
Boomleeuwerik	1	1	1	2	1	1	1	-
Boompieper	5	3	3	3	5	4	1	1

Graspieper	1	-	2	2	-	2	1	-
Winterkoning	3	3	4	6	5	2	3	3
Heggenmus	18	19	16	18	19	17	23	17
Roodborst	1	-	-	2	1	1	1	-
Nachtegaal	15	16	14	10	13	16	13	15
Gekraagde Rood- staart	-	-	-	-	-	1	-	-
Roodborsttapuit	1	1	1	2	2	1	1	1
Tapuit	8	12	11	10	3	2	3	4
Merel	8	8	8	10	8	6	3	5
Zanglijster	1	1	1	1	1	-	-	1
Sprinkhaanzan- ger	3	3	4	3	1	1	1	1
Braamsluiper	1	2	2	3	4	4	1	5
Grasmus	12	11	10	11	13	10	13	13
Zwartkop	2	1	2	1	1	-	-	2
Tijftjaf	1	-	1	2	2	3	2	2
Fitis	23	24	26	20	22	18	15	17
Staartmees	-	-	-	-	-	-	-	1
Pimpelmees	1	1	-	-	1	-	-	1
Koolmees	6	7	4	3	5	3	3	4
Vlaamse Gaai	2	2	2	1	1	1	1	1
Ekster	9	10	7	5	4	5	4	6
Ringmus	4	2	-	1	-	-	-	-
Kneu	11	9	8	6	5	4	4	4
Geelgors	-	-	1	-	-	-	-	-
Totaal aantal soorten	30	26	25	29	26	25	23	24
Totaal aantal broedgevallen	162	159	147	140	129	114	102	115

2 Boeveld-West

geïnventarieerd door W. Baalbergen en Mevr. H. Veeffkind-
Lieneman

Terreinomschrijving:

Het geïnventarieerde gebied wordt in het Noorden
begrensd door het Finnlayweggetje, in het oosten
door de Houtweg en een stukje onverhard wandel-
pad, in het zuiden door het raster langs de Langevel-
derslag en in het westen door het Van Limburg
Stirumkanaal.

Het onderzochte gebied kan men grofweg in twee de-
len verdelen. Het zuidelijke deel wordt grotendeels
bepaald door een vrij kaal duinenplateau met toppen
van 18 m. Het noordelijke deel is voorzien van struwe-
len. De oppervlakte bedraagt circa 28 ha.

De recreatiedruk is er, mede als gevolg van de dichtbij
gelegen ingang, erg groot.

Tabel 2: Broedvogels van Boeveld-West: 1986 t/m 1993

Soort	86	87	88	89	90	91	92	93
Wilde Eend	-	-	-	-	-	-	1	1
Fazant	3	2	1	1	2	3	2	1
Meerkoet	-	-	-	-	-	2?	1	1
Scholekster	-	-	-	-	-	1?	-	-
Houtduif	4	3	3	4	3	5	3	2
Zomertortel	1	1	1	1	1	1	-	1
Koekoek	1	1	1	1	1	1	1	1
Boompieper	1	2	2	2	2	1	2	1
Graspieper	1	1	2	2	2	3	2	2
Winterkoning	2	3	5	8	7	2	4	3
Heggemus	15	14	15	16	16	7	12	12
Roodborst	1	1	1	1	1	1	4	-
Nachtegaal	8	11	7	9	8	8	7	9
Paapje	-	-	-	-	-	1	-	-
Gekraagde Roodstaart	-	-	-	-	-	-	1	1
Roodborsttapuit	4	3	4	4	3	3	5	2
Tapuit	4	3	2	2	1	-	-	1
Merel	2	3	5	6	4	5	4	2
Zanglijster	-	-	-	-	-	1	1	1
Sprinkhaanzanger	2	2	2	2	2	1	2	1
Bosrietzanger	1	1	1	1	1	1	1	1
Kleine Karekiet	-	-	-	-	-	1	-	1
Braamsluiper	2	2	1	1	1	1	2	3
Grasmus	14	15	14	10	10	13	12	14
Tuinfluit	-	-	-	-	-	-	-	1
Tijftjaf	-	-	2	1	1	1	2	2
Fitis	19	19	21	20	18	16	10	13
Staartmees	-	-	-	-	-	-	1	2
Glanskop	1	1	-	-	1	1	-	-
Pimpelmees	1	1	1	-	1	1	-	-
Koolmees	4	2	4	3	3	3	4	2
Vlaamse Gaai	1	-	-	2	1	3	-	-
Ekster	2	2	4	4	3	5	5	4
Zwarte Kraai	1	1	1	1	1	1	1	1
Kneu	4	3	4	3	3	10	7	6
Goudvink	-	-	-	-	-	-	-	1
Rietgors	-	-	-	-	-	-	2	2
Totaal aantal soorten	25	24	24	24	26	28	27	31
Totaal aantal broedgevallen	99	97	104	105	97	104	99	94



nachtegaal

3 Wolfsveld-West

geïnventariseerd door B. Heethuis

Terreinomschrijving:

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Ruigenhoeker Schulpweg, in het oosten door het Finnlaweggetje en in het verlengde daarvan door een denkbeeldige lijn over de Kop van het Ronde Vlak en rechts langs het Spejndel, in het zuiden door het Finnlaweggetje en in het westen door het Van Limburg Stirumkanaal. Het terrein heeft een oppervlakte van circa 35 ha., waarin 5 delen n.l. Lange Vlak, Spejndel, Abelendel, Biezenvlakje en Ronde Vlak grotendeels bestaan uit Meidoorn, Liguster, Berk, Zomereik, Kardi-naalsmuts, Vlier en Duindoorn.

Tabel 3: Broedvogels Wolfsveld-West: 1986 t/m 1993

Soort	86	87	88	89	90	91	92	93
Wilde Eend	-	-	-	1	1	-	-	-
Fazant	4	3	3	3	3	3	3	3
Houtduif	7	5	7	9	9	9	6	5
Koekoek	1	1	1	1	1	1	1	1
Zomertortel	2	1	1	1	2	1	-	-
Boomleeuwerik	-	-	-	1	-	-	-	-
Boompieper	4	4	5	6	4	2	-	-
Graspieper	-	-	1	1	1	1	-	-
Winterkoning	1	3	5	10	14	5	5	9
Heggemus	14	16	13	16	19	20	15	16
Roodborst	-	-	-	-	-	1	-	-
Nachtegaal	11	13	13	16	11	11	9	11
Gekraagde Roodstaart	-	-	-	-	1	-	-	-
Roodborsttapuit	2	1	2	2	1	2	3	5
Tapuit	-	1	-	-	1	1	-	-
Merel	6	5	4	5	8	5	2	3
Zanglijster	-	1	-	2	1	2	-	1
Sprinkhaanzanger	5	4	2	5	5	2	2	-
Braamsluiper	3	4	2	2	2	1	-	-

Grasmus	14	18	22	25	14	13	10	12
Tuinfluitier	-	-	1	-	-	-	-	-
Zwartkop	-	2	-	1	1	-	-	-
Tijftjaf	1	-	-	2	1	1	2	3
Fitis	19	18	16	26	26	21	13	15
Pimpelmees	2	-	1	1	-	-	-	1
Koolmees	6	5	3	8	5	4	3	7
Vlaamse Gaai	3	2	1	1	1	2	1	1
Ekster	6	3	4	3	4	4	3	6
Zwarte Kraai	-	-	-	-	1	1	1	1
Kneu	4	1	1	4	6	6	3	-
Totaal aantal soorten	20	21	21	25	26	24	17	17
Totaal aantal broedgevallen	115	111	108	152	143	119	82	100

4 Westhoek/Haasvelderbeken

geïnventariseerd door J. van Saase en W. van Leeuwen

Terreinsomschrijving:

Het terrein wordt in het noorden begrensd door de Nieuwe Haasvelderweg of Heiweg, in het oosten door de slag van de Westhoek, in het zuiden door de Starrenbroekerweg en in het westen door de Haasvelder Klugtweg. Midden door het gebied loopt de Scheidingsbaan, een smal voetpad langs een voormalige eigendoms- en jachtgrens waarop nog oude grensstenen voorkomen met het monogram van mr. Jan Six (1668-1750), een van de eerste eigenaren van dit gebied na de grote verkoop van domeingronden. Ten



Paapje

oosten van de scheidingsbaan ligt de Westhoek, vroeger behorend tot het jachtveld "Paardenkerkhof". Het terrein is niet sterk geaccidenteerd. De Trapjesberg is met ruim 16 meter + NAP de hoogste duintop. In de omgeving van het Haasveld (oorspronkelijk Haags-Veld) zijn nog vele sporen aanwezig van een vroegere landbouwvestiging, zoals oude teelthoeven (=duinkrochten) en weiltes, droge wateringen, greppels en oude beekbeddingen.

Tabel 4: Broedvogels van Westhoek/Haasvelderbeken: 1986 t/m 1993


Soort	86	87	88	89	90	91	92	93
Fazant	8	7	7	10	20	19	18	18
Kievit	-	-	1	-	-	-	-	-
Wulp	1	1	-	-	-	-	-	-
Houtduif	8	10	16	5	5	6	4	5
Zomertortel	2	2	3	1	4	2	3	1
Koekoek	2	2	2	3	3	3	4	5
Bosuil	-	1	-	-	-	-	-	-
Groene Specht	1	-	1	-	1	1	1	2
Boompieper	14	9	9	10	14	11	12	13
Winterkoning	3	7	9	16	22	9	9	19
Heggenmus	11	15	21	17	12	13	9	8
Roodborst	1	1	1	3	1	2	2	1
Nachtegaal	14	15	12	13	10	10	11	10
Gekraagde Roodstaart	2	2	2	1	2	5	4	1
Paapje	6	6	7	5	4	3	1	4
Roodborsttapuit	1	1	2	2	2	2	6	6
Tapuit	3	1	1	-	-	-	-	-
Merel	4	3	6	5	7	2	4	2
Zanglijster	-	1	1	1	-	-	-	-
Sprinkhaanzanger	6	12	10	17	15	10	10	9
Braamsluiper	4	3	6	6	7	6	3	2
Grasmus	12	14	18	26	25	19	21	22
Tuinfluitier	1	-	-	-	-	-	1	-
Zwartkop	1	-	2	-	-	1	-	-
Tijftjaf	-	-	4	3	5	3	4	3
Fitis	47	44	51	46	52	47	44	64
Staartmees	2	-	-	-	1	-	-	-
Glanskop	1	1	-	-	-	-	-	-
Pimpelmees	2	2	2	3	4	5	4	4
Koolmees	7	7	14	18	15	14	11	8
Vlaamse Gaai	1	2	3	2	4	4	2	-
Ekster	3	5	7	7	6	7	9	5
Zwarte Kraai	2	2	1	-	2	2	2	1
Ringmus	-	1	1	-	2	-	-	-
Vink	-	1	-	-	1	1	-	-
Kneu	11	12	7	8	10	10	6	8
Barmsijs	-	-	1	-	-	-	-	-
Totaal aantal soorten	30	29	31	24	28	27	26	25
Totaal aantal broedgevallen	182	190	228	218	256	219	205	246

5 Hoegatterduin

geïventariseerd door R. Sluys

Terreinomschrijving:

Het onderzochte gebied is c. 50 ha groot. In het noorden en oosten wordt het terrein begrensd door de Hoegatterweg, in het zuiden door de Zilkerslag (Joppeweg) en in het westen door het Oosterkanaal.



Gekraagde roodstaart

Door het gebied lopen enkele zandpaden. Het gebied kenmerkt zich door een rug van vrij kale duinen met veel stuifgaten. We vinden verspreid over het terrein enkele bosjes van voornamelijk eikehakhout zoals b.v. het Amerikaanse Bosje.

Langs het Oosterkanaal vinden we enkele bosjes van de Oostenrijkse den.

Tabel 5: Broedvogels van Hoegatterduin: 1986 t/m 1993

Soort	86	87	88	89	90	91	92	93
Bergeend	-	-	-	-	-	1	1	1
Wilde Eend	-	-	4	3	1	3	2	-
Kuifeend	-	-	-	-	-	1	1	2
Boomvalk	-	-	-	-	-	-	-	1
Fazant	6	3	4	6	4	2	-	2
Waterhoen	-	-	-	1	-	-	-	1
Meerkoet	-	-	-	-	-	-	-	1
Houtsnip	-	-	1	-	-	-	-	-
Wulp	-	-	1	-	-	-	-	-
Houtduif	4	3	7	7	13	15	10	9
Zomertortel	-	1	1	1	2	2	3	-

Koekoek	1	1	1	1	1	1	-	1
Ransuil	-	-	-	-	1	-	-	-
Groene Specht	2	2	2	2	3	3	2	2
Grote Bonte Specht	1	3	3	-	2	1	-	-
Boomleeuwerik	1	1	-	1	-	-	-	-
Veldleeuwerik	1	1	-	-	-	-	-	-
Boompieper	7	8	9	9	6	5	4	6
Graspieper	-	1	-	1	1	-	1	1
Witte Kwikstaart	1	-	-	-	-	-	-	-
Winterkoning	1	2	4	6	5	3	5	9
Heggemus	8	7	7	15	10	11	11	13
Roodborst	4	3	2	4	4	6	5	2
Nachtegaal	8	9	12	9	11	10	11	17
Gekraagde Roodstaart	1	3	3	5	6	8	7	5
Roodborsttapuit	-	1	-	-	1	-	-	-
Tapuit	2	1	1	1	-	1	-	-
Merel	4	5	6	6	8	9	8	4
Zanglijster	1	1	-	2	-	3	1	-
Sprinkhaanzanger	-	3	1	3	4	-	1	-
Braamsluiper	-	1	2	2	2	3	2	5
Grasmus	4	5	10	16	12	11	14	12
Tuinfluit	2	1	2	1	1	-	-	-
Zwartkop	1	-	-	-	1	-	1	-
Tijftjaf	-	1	2	4	4	1	3	3
Fitis	21	23	28	30	42	24	22	33
Staartmees	1	1	-	2	1	2	2	1
Glanskop	1	-	-	-	1	-	2	-
Pimpelmees	4	2	3	3	5	9	9	8
Koolmees	8	7	8	11	9	15	10	16
Wielewaal	-	-	1	-	1	-	-	-
Vlaamse Gaai	3	2	2	4	2	4	3	2
Ekster	4	5	6	7	8	12	8	5
Zwarte Kraai	-	-	-	-	1	4	3	1
Ringmus	-	-	1	-	-	1	-	-
Vink	-	-	2	2	2	3	3	1
Groenling	-	-	-	1	-	-	-	-
Kneu	2	1	3	2	5	2	2	2
Geelgors	-	1	-	-	-	-	-	-
Totaal aantal soorten	29	33	32	31	35	31	30	30
Totaal aantal broedgevallen	105	110	140	167	181	176	157	195

Totaal van de kavels 1 t/m 5

Tabel 6: Vastgesteld aantal broedgevallen per soort: Kavels 1 t/m 5
1986 t/m 1993

Soort	86	87	88	89	90	91	92	93
Bergeend	-	-	-	1	-	1	1	1
Wilde Eend	-	-	4	4	2	3	3	1
Kuifeend	-	-	-	-	-	1	1	2
Waterhoen	-	-	-	1	-	-	-	1
Patrijs	1	1	1	-	-	-	-	-
Fazant	24	18	19	23	32	29	28	24
Meerkoet	-	-	-	-	-	2?	1	2
Scholekster	-	-	-	-	-	1?	-	-
Kievit	-	-	1	-	-	-	-	-
Houtsnip	-	-	1	-	-	-	-	-
Wulp	3	3	1	1	1	1	-	1
Houtduif	39	35	45	34	36	42	28	28
Zomertortel	7	11	8	6	10	7	7	4
Koekoek	6	6	6	7	7	7	7	9
Ransuil	-	-	-	-	1	-	-	-
Bosuil	-	1	-	-	-	-	-	-
Groene Specht	3	2	3	2	4	4	2	4
Grote Bonte Specht	1	3	3	-	2	1	-	-
Boomleeuwerik	2	2	1	4	1	1	1	-
Veldleeuwerik	1	1	-	-	-	-	-	-
Boompieper	31	26	29	30	31	23	19	21
Graspieper	2	2	5	6	4	6	4	3
Witte Kwikstaart	1	-	-	-	-	-	-	-
Winterkoning	10	18	27	46	53	21	26	43
Heggemus	66	71	72	82	76	68	70	66
Roodborst	7	5	4	10	7	10	12	3
Nachtegaal	56	64	58	57	53	57	51	62
Gekraagde Roodstaart	3	4	4	6	9	14	12	7
Paapje	6	6	7	5	4	4	1	4
Roodborsttapuit	8	7	9	8	9	8	15	14
Tapuit	17	18	15	13	5	4	3	5
Merel	24	24	29	32	35	27	21	16
Zanglijster	2	4	2	6	2	7	2	3
Sprinkhaanzanger	16	24	19	30	27	14	16	11
Bosrietzanger	1	1	1	1	1	1	1	1
Kleine Karekiet	-	-	-	-	-	1	-	1
Braamsluiper	10	12	13	14	16	15	8	14
Grasmus	56	63	74	88	74	66	70	73

Tuinfluitier	3	1	3	1	1	-	1	-
Zwartkop	4	3	4	2	3	1	1	2
Tijftjaf	2	1	9	11	13	9	13	13
Fitis	129	128	142	142	160	126	104	142
Staartmees	3	1	-	2	2	2	3	4
Glanskop	3	2	-	-	2	1	2	-
Pimpelmees	10	6	7	7	11	15	13	13
Koolmees	29	28	33	43	37	39	31	37
Wielewaal	-	-	1	-	1	-	-	-
Vlaamse Gaai	10	8	8	10	9	15	7	4
Ekster	24	25	28	26	25	33	29	26
Zwarte Kraai	3	3	2	1	5	8	7	4
Ringmus	4	3	2	1	2	1	-	-
Vink	-	1	2	2	3	4	3	1
Kneu	32	26	23	23	29	32	22	20
Barmsijs	1	1	2	-	-	-	-	-
Goudvink	-	-	-	-	-	-	-	1
Geelgors	1	1	-	-	-	-	-	-
Rietgors	-	-	-	-	-	-	2	2
Totaal aantal soorten	42	43	42	39	40	43	40	42
Totaal aantal broedgevallen	663	667	727	782	806	732	650	683

Toelichting:

In de vijf geïnventariseerde gebieden hebben drie nieuwe soorten gebroed, d.w.z. soorten die sinds de Noordwijkse vogelwerkgroep in het zuidelijk duingebied inventariseert nog niet eerder als broedvogel zijn vastgesteld, nl. de Goudvink in Boeveld-West, het Waterhoen en de Boomvalk in Hoekgatterduin.

De activiteit van de Vos in Gijs Kokkieshoek was gering. In de stuifgaten werden nauwelijks sporen gevonden en ook werden geen Vossen waargenomen. Wellicht heeft dit een positieve uitwerking gehad op de Wulp en de Tapuit.

De Houtduif blijft met 28 broedgevallen op het zelfde niveau als vorig jaar.

De Zomertortel heeft met vier broedgevallen de laagste stand bereikt sinds 1986.

Opvallend is de sterke achteruitgang bij zowel de Roodborst als de Gekraagde Roodstaart.

Verheugend is de terugkeer van vier exemplaren van het Paapje in de Westhoek-Haasvelderbeek.

De Fitis heeft zich sterk hersteld en de Braamsluiper die vorig jaar zo'n sterke terugval beleefde, heeft zich prima hersteld en is met 14 territoria weer bijna op het oude niveau terug.