

Voorts zijn in de inventarisatieperiode nog waargenomen:
wulp, regenwulp, oeverloper, zwarte ruiter, kemphaan, zilvermeeuw,
stormmeeuw, gierzwaluw, veldleeuwerik, boerenzwaluw, huiszwaluw,
roek, kauw, koolmees, pimpelmees, staartmees, roodborst, graspieper,
witte kwikstaart, gele kwikstaart (de 3 laatstgenoemde broedvogel
langs dijk aan ZW-zijde van Botshol, evenals de - eerdergenoemde -
veldleeuwerik), groenling, vink, keep, huismus en ringmus.

Samengesteld door: A. Hartog
Admiralengracht 205hs,
Amsterdam - 15

Litteratuur: Vogelverslag 1967 Botshol - uitgave NJN afd. 9, Amsterdam.

=====

"Kleine wetenswaardigheden": OVER GOUDVINKEN, BARMSIJZEN en BONTE
STRANDLOPERS, door A.N. Swart

Er zijn enkele merkwaardige overeenkomsten bij de 3 bovengenoemde soorten.

De eerste overeenkomst is, dat de nominaatvormen *Pyrrhula p. pyrrhula* ("Grote goudvink"), *Carduelis f. flammea* ("Grote barmsijs") en *Calidris a. alpina* ("Grote bonte strandloper") alle 3 iets groter zijn dan de vormen *Pyrrhula p. europaea* (Goudvink), *Carduelis f. cabaret* (Kleine barmsijs) en *Calidris a. schinzii* (Kleine bonte strandloper). Deze grote vormen komen, zoals meestal, uit koudere streken.

De tweede overeenkomst is, dat deze grote vormen *P.p. Pyrrhula*, *C.f. flammea* en *C.a. alpina*, alleen maar trekvogel en/of wintergast zijn, terwijl de kleine vormen *P.p. europaea*, *C.f. cabaret* en *C.a. schinzii* bovendien broedvogel van Nederland zijn.

De derde overeenkomst is, dat de herfsttrek van de drie grote vormen later plaats vindt en de voorjaarstrek vroeger dan van de drie kleine vormen.

We weten dat de late voorjaarstrek van vele alpina's in Nederland overgaat in overzomereren, maar door de zeer moeilijke herkenbaarheid van *schinzii* is het nog niet bewezen dat dit met laatstgenoemde vorm minder het geval is. Het zou wel eens kunnen blijken, dat het overzomereren van *schinzii* een zeer algemeen verschijnsel is.

Dit overzomereren is zo belangrijk, omdat het vaak een aanloop is tot een of meerdere broedgevallen in de daaropvolgende jaren.

Voorbeelden: Grote zaagbek, Grauwe gans, Oeverloper, Sijs, Kleine barmsijs, Keep, Bonte kraai. In Duitsland en Engeland is *schinzii* evenals in Nederland een zeldzame broedvogel, vnl. in de kustgebieden.

Als wintervogel is onze broedvogel *Pyrrhula p. europaea* helemaal niet zeldzaam. Van *Carduelis f. cabaret* zijn mij minstens 16 winterwaarnemingen bekend, terwijl van de zeer moeilijk te herkennen *Calidris a. schinzii* slechts twee zekere winterwaarnemingen bekend zijn (21-1-1901, Tholen en 19-1-1940, Terschelling). Ook in Duitsland is deze vorm een zeer zeldzame overwinteraar. Op 14-1-1912 werden twee exemplaren geschoten op de broedplaats Priwall, in de monding van de Trave bij Lubeck (Werner Hagen).

A.N. Swart,
President Steynstraat 8^I,
Amsterdam - 5.
TF. 944625