

niele Purperreigers, afwijkingen in het verenkleed van de Blauwe Kieken-dief, de herkomst van een geringde Zeearend, de pootkleur van een Reuzenzwartkopmeeuw en de keelkleur van Roodkeelpieper in de winter. Temidden van deze waarnemingen en van bijzonderheden over zeldzame vogels blijkt ook een 'gewoon' soort als de Huiszwaluw zich een plaats te kunnen veroveren, mits hij maar in oktober gaat broeden en jongen krijgt. Een waarnemingenrubriek besluit dit nummer van Dutch Birding.

MvdB.

Jaargang 2; nummer 2 - september 1980.

Inhoud: Het blad begint met een Dutch Birding Association Checklist-deel 1. Een aantal categorieën waarin waargenomen vogelsoorten kunnen vallen worden nader gedefiniëerd. Deel 1 van de lijst gaat uitgebreider in op een aantal vogelsoorten die door menselijke invloed in Nederland terecht komen. Een aantal avifaunistische termen wordt nader gedefiniëerd. Uitgebreide artikelen zijn verder: determinatie van Fregatvogels, het voorkomen van de Zwarte Ibis in Nederland, kruisingen tussen Brandgans & Roodhalsgans en Kolgans & Brandgans, een waarneming van een Slangenarend, het verenkleed van de Witvleugelstern, en notities over de determinatie, leeftijd en rui van ondersoorten van de Zwarte Zeekoet. Drie korte artikelen geven aan dat op Schiphol geïmporteerde koolvogels soms blijken te ontsnappen. Als deze vogels dan worden waargenomen door vogelaars in het veld kan verwarring met nauw verwante in Europa voorkomende soorten niet uitgesloten worden. Vergeleken worden de Indische Scharrelaar (contra Scharrelaar) en Mongoolse Leeuwerik (contra Witvleugelleeuwerik). Een waarneming van twee Vale Lijsters in het Amsterdamse Bos kan mogelijk toegeschreven worden aan ontsnapte exemplaren uit een zending op de luchthaven. De waarnemingenrubriek bevat o.a. waarnemingen van Ralreiger, Koereiger, Grote en Kleine Zilverreigers, Zwarte Ooievaar, 18 (!) Sneeuwganzen, Roodpootvalken, een Klein Waterhoen, Bijeneters en Scharrelaars.

MvdB

Jaargang 2; nummer 3 - oktober 1980.

Inhoud: Tweede deel van de Dutch Birding Association Checklist. Hierop zijn soorten uit twee categorieën (A en B) te vinden. In categorie A vallen soorten die na 1951 nog in Nederland met zekerheid zijn waargenomen en in categorie B soorten die met zekerheid voor 1951 in Nederland zijn waargenomen. (voor verdere specificatie van de categorieën zie Dutch Birding 2: 41-2) De status van een groot aantal soorten wordt nader toegelicht en verantwoord in een serie korte notities. Een uitstekend artikel over de determinatie van de Poelsnip en het voorkomen in Nederland geeft wederom de vaak hoge kwaliteit van het blad weer. De waarnemingenrubriek bevat als voornaamste zeldzaamheden een Geelsnavelduiker bij Kortenhoeve, drie Grote Pijlstormvogels bij Schiermonnikoog en de Hondbosse Zeewering, een Stellers Eider-eend bij Terschelling, een Bairds Strandloper op de Maasvlakte, twee Blonde Ruiters op Texel, een Franklins Meeuw bij Scheveningen, een juv. Kuifkoekeek in de Alblasserwaard en bij Giessenburg en een Kalanderleeuwerik werd gevangen op het ringstation Wassenaar.

MvdB

Limosa j.g. 53 (1980) nr. 1

A.J. Beintema: Het Nonnetje (*Mergus albellus*)

Aanleiding voor dit artikel was het ontbreken, in het meest recente "handbook", van een beschrijving van de massale concentraties Nonnetjes in Nederland (IJsselmeer).

's Winters zitten hier soms wel 20.000 van deze vogels, hetgeen een belangrijk deel van de wereldpopulatie is. Dat dit laat gepubliceerd is ligt aan de Nederlanders zelf, het massaal fourageren (vooral nabij Lelystad) is nota bene door buitenlanders wereldkundig gemaakt. De kennis over het Nonnetje vertoont verder nog hiaten: in voedselopsommingen komt de Spiering nooit voor (belangrijkste voedsel op het IJsselmeer).

Rob Bijlsma: De invloed van predatie op de broedresultaten van de Houtduif. Houtduiven kunnen broeden van maart tot en met oktober (soms november) en kunnen in deze periode vier tot vijf broedsels van elk twee jongen grootbrengen. In werkelijkheid is het aantal uitvliegende jongen per paar veel lager. Predatie is één van de belangrijkste broedsuccesverlagende factoren. In dit artikel wordt op grond van eigen onderzoek de invloed van predatie op de broedresultaten uiteengezet.

L.M.J. van den Bergh: Mogelijke waarnemingen van de ondersoorten "servivros-tris" en "johanseni" van de Rietgans (*Anser fabalis*). Mogelijke waarnemingen van bovengenoemde Siberische rietgansondersoorten in de strenge winter 1978-1979 worden besproken. Deze zijn waarschijnlijk in Nederland terechtgekomen door de grootscheepse verschuivingen in de winterpopulaties van de Rietgans die als gevolg van de strenge winter optraden.

C.J.G. Scharringa en E.R. Osieck: Zeldzame vogels in Nederland, 1978. In dit verslag de opsomming van dwaalgasten etc. die in 1978 zijn waargenomen. Nieuwe soorten voor Nederland waren: Woestijnplevier, Siberische boompieper en Bruine boszanger.

Korte mededelingen (diverse auteurs):

1) Vondst van een Woestijnplevier.

*Limosa* j.g. 53 (1980) nr. 2.

J. Veen: Waarom broeden vogels in kolonies?

Dit artikel wat de inleiding was op de themadag "Kolonievogels" van de N.O.U., beschrijft het hoe en waarom van het in kolonie broeden van vogels. Het geheel wordt ondersteund met voorbeelden uit verschillende vogelfamilies.

Arend J. van Dijk: Waarnemingen aan de rui van de Grutto.

Sedert 1969 onderzoekt de auteur het aantalverloop op slaapplaatsen van de Grutto in Nederland. Omdat het vermoeden bestond dat het aantalverloop samhangt met de rui is daar in 1976-1979 door middel van veldwaarnemingen, het verzamelen van ruiveren en balgegevens, onderzoek naar gedaan.

J.F. de Miranda en R.K. Koenekoop: Zeevogels in Nederland in 1977.

Per soort worden de door de C.V.Z. behandelde gegevens kort besproken; 1977 was onder andere weer eens een goed jaar voor pijlstormvogels (420 grauwe, 168 noordse en enkele grote pijlstormvogels).

Korte mededelingen:

1) Waarnemingen van een Amerikaanse Smient

2) Tafeleend woord hapt in de vlucht naar de staart van het wijfje.

3) Territoriumgedrag van Roerdompen.

Watervogels j.g. 5 (1980) nr. 4.

Bruno Ens en Leo Zwarts: Territoriaal gedrag bij wulpen buiten het broedgebied.

Onder andere met behulp van gekleurde vogels geven de schrijvers een beschrijving van territoriaal gedrag van op het wad voedselzoekende wulpen.