

Het monitoren doen we door over 100 meter om de 5 meter in de beek een speciekuip zonder bodem in de grond te duwen en de bovenste laag grond of slib los te maken en er uit te scheppen met een stevig schepnet. De grond gooien we in een platte bak om te controleren op larven die we verzamelen in een emmertje. Dan gaan ze naar de mensen op de wal die ze in een cuvet doen, meten en de aantallen noteren. Na afloop gaan de gevonden larven en de grond op dezelfde plek als waar er geschept is weer terug de beek in.

Sonja Schmidt

"Moet je dit nou zien! Dit is te bizar." Tijdens een visbemonstering voor Waterschap Vallei en Veluwe stonden we ineens op een plaats delict. Op een overhangende tak boven de Grift, lag een dode volwassen Beekprik. De hersens waren op brute wijze ingeslagen met een stomp voorwerp.

De plek, het seizoen en de verwondingen: de IJsvogel is onze hoofdverdachte. De paaiende beekprikken letten nergens op en zijn super kwetsbaar voor verstoring en predatie. Door te paaien op ondiepe grindbeddingen zijn ze veilig voor roofvissen....maar niet voor rivierkreeften, onderwaterfotografen of ijsvogels.



Viswerkgroep De Prik, www.ravon.nl/deprik



7