


geveer een half uur zaten, kwam er één; een keiler. Hij bleek in het geheel niet schuw, want toen ik mijn fotospullen uit het plastic ging halen, kwam hij als een gek op me afgerend, het bleek een liefhebber van pepermunt te zijn. Plots kwamen op een afstand van z'n 50 meter nog 24 zwijnen uit het bos gestormd. Het waren vrouwtje met jongen en nog enkele keilers. Intussen waren er meer toeschouwers dan zwijnen bijgekomen. Zo was er ook een vrouw die persé de jonge zwijntjes wild gaan voeren. Gewapend met een grote zak brood stapte ze het rustgebied in, om enkele ogenblikken later weer hard terug te rennend met op haar hielen een groot wild zwijn. Vanachter een dikke boom vandaan heb ik hard staan lachen, iets wat mij enkele minuten later wel verging, toen ik vlak bij iets hoorde en recht in twee oranje-zwarte zwijne-ogen keek. Hierna zijn we via het Hoog Soerense Veld weer richting Vaasen gefietst, waar de auto stond. Onderweg zagen we nog een Havik en een paar Boomklevers.

De Veertiende dag hebben we de koffers gepakt en zijn weer naar huis gegaan. Helaas. Dit was het verslag van een leuke, mooie en dwaze vakantie op het park De Coldenhove in Eerbeek.

Ab Steenvoorden



Geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt

WIJZIGING VOGELBESLUIT 1937

Ondanks de ingediende nieuwe Vogelwet heeft minister Braks gemeend het oude Vogelbesluit 1937 te moeten wijzigen. Vanaf 4 juli 1985 is het bezit van Klap-eksters verboden. Deze soort is niet langer aangewezen als jachtvogel. Nu werd de Klapekster toch al vrijwel door niemand gehouden. Een andere wijziging betreft de lijst van vogels, die tijdelijk onbeschermd kunnen worden verklaard. Blauwe Reiger, Aalscholver, Sperwer en Slechtvalk zijn van deze lijst afgevoerd; Turkse Tortel en Knobbelzwaan zijn juist toegevoegd. Het afvoeren van soorten maakt feitelijk geen verschil met de oude situatie, omdat al jaren geen gebruik meer gemaakt was van het onbeschermd verklaren van deze vogels. Het wekt echter wel bevreesding bij de Stichting Kritisch Faunabeheer, dat Turkse Tortel en Knobbelzwaan juist aan de lijst zijn toegevoegd. Deze soor-

ten veroorzaken geen schade op landelijk niveau en in ernstige gevallen van schade blijkt het huidige vergunningen-systeem voor het plegen van afschot redelijk goed te functioneren. De Natuurbeschermingsraad heeft daarom hierover ook negatief geadviseerd. Het opvoeren van nieuwe soorten op de lijst van voorwaardelijk onbeschermd vogels is alleen te verklaren, wanneer het onbeschermd verklaren in de bedoeling van de minister ligt. De Stichting Kritisch Faunabeheer is bang, dat na de wijziging van de Jachtwet (vermoedelijk eind 1985) de Turkse Tortel en de Knobbelzwaan tot het jachtwild zullen gaan behoren.

Uit : ARGUS, 10e jaargang ,nr.3

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt

STORMMEEUWEN BROEDEN OP EN TEGEN GEBOUWEN

Binnen de hekken van het Energieonderzoek Centrum Nederland te Petten, broeden reeds zo'n twintig jaar Stormmeeuwen; in 1984 ruim 200 paar. De meeuwen broeden verdeeld over 4 kolonies met erom heen enkele tientallen solitair broedende paren. Een groot deel van de solitair broedende meeuwen maakt zijn nest bij en op de bedrijfsgebouwen. Ze zijn niet schuw; ze broeden zelfs naast een deur met veel in- en uitloop, op een fietsenstalling en op een compressor tussen de nieuwbouw.

De gewoonte om op daken te broeden, begon al in de jaren zeventig, nadat eerst al eens op kratten was gebroed. Het heeft niets te maken met gebrek aan nestgelegenheid, want er is nog open duingebied te over. Lage daken hebben de voorkeur. Als uitzondering bevond een nest zich op ca. 8 m. boven de begane grond.

Het broeden van meeuwen op daken is geen onbekend verschijnsel en thans vooral in Groot-Brittannië wijdverbreid. De lijst wordt daar aangevoerd door de Zilvermeeuw, maar ook Grote en Kleine Mantelmeeuw doen dit geregeld en in toenemende mate. Bekend is ook het broeden van Drieteenmeeuwen in de vensters van pakhuizen in Engeland en Noorwegen.

In Nederland is het broeden op gebouwen verder alleen bekend van de Zilvermeeuw in de jaren veertig in Den Haag en Den Helder en in 1983 in het Noord-Hollands Duinreservaat. Strijbos meldde al in de dertiger jaren het broeden van Stormmeeuwen in struiken en bomen. Dit komt nu nog steeds voor op verschillende plaatsen in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied.

Uit : LIMOSA, jaargang 58 afl. 2

n.b.

Vorig jaar heeft E.Aartse in De Blink het broeden van tenminste 1 Zilvermeeuw in een Meidoorn geconstateerd. In de Noravallei broedde dit jaar een Stormmeeuw in een meidoorn (med.J.v.Dijk).

geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt geknipt

DAG PADDESTOELEN

In een KNNV-mededeling hebben paddestoelenkenners dit jaar al eerder geschreven over de achteruitgang van de paddestoelenflora. Vooral soorten die in wederzijdse wisselwerking (symbiose) leven met bomen hebben het zwaar te verduren. Tevergeefs zoekt men tegenwoordig naar Koningsboleet, sommige soorten gordijnzwammen, Lariksspijkerzwam en Bloemkoolzwam. Deze en tientallen andere zijn vermoedelijk uitgestorven in Nederland.

Dit is het begin van een artikel uit: Natuur en Milieu okt. 1985.