DE POLDER HOGEWEG IN DE WINTER VAN 1986/1987

In de wintermaanden van 1986/1987 is bijna iedere week een bezoek gebracht aan de polder Hogeweg. Vanaf 11 oktober 1986 tot en met 15 maart 1987 is de polder 21x bezocht.

De opstelling van dit verslag wijkt af van de verslagen die in voorgaande jaren werden gemaakt. Geen lange lijst meer van per bezoek waargenomen soorten en aantallen. Nee, nu een korte bespreking van de waargenomen soorten in de gehele periode.

Het is al meer gezegd; deze polder is een belangrijke pleisterplaats voor vogels. Door omspuiten in het noordoosten van de polder en het jaarlijks groter worden van het kassen- en tuinbouwgebied Kloosterschuur/Trappetjesberg wordt de open ruimte in de polder steeds kleiner. Hoe lang zal het nog duren voordat de polder Hogeweg zijn waarde als pleisterplaats en overwinteringsgebied zal verliezen?

Fuut

De Fuut was de gehele winter met 3- 6 exemplaren aanwezig. Alleen tijdens de vorstperiode werd de Fuut niet waargenomen.

Blauwe reiger

De gehele winter aanwezig met 2 - 4 exemplaren. Alleen tijdens de strenge vorstperiode werd de Blauwe reiger niet waargenomen. Vaak 1 vogel aanwezig in het open wak bij de rioolwaterzuivering.

Knobbelzwaan

Gemiddeld werden 4 - 7 , soms 10 - 11 Knobbelzwanen in de polder aangetroffen. De Knobbelzwaan ontbrak in de vorstperiode ook niet. De zwanen foerageerden toen op de bevroren weilanden.

Rietgans (of Kleine rietgans)

De meningen hierover lopen uiteen. Ik heb er zelf niets anders dan Rietgans van kunnen maken. Van eind januari tot begin februari verbleven 3 ganzen in de polder.

Bergeend

De Bergeend is een regelmatige gast in de polder, doch nooit meer dan 2 - 3 exemplaren. Deze aantallen werden genoteerd in februari en maart. In januari slechts een paar waarnemingen.

Smient

Vanaf begin november tot half maart verbleven er Smienten in de polder. De pleisterplaats was het weiland en de Watering bij de parkeerplaats. De aantallen schommelden rond de 35 exemplaren, soms wat meer en soms wat minder. In de eerste helft van maart liep het aantal Smienten op tot 80 en op 15 maart telde ik er 150. Op 6 en 9 maart werden resp. 180 en 100 Smienten waargenomen (De Strandloper mei 1987). Tijdens de vorstperiode was de Smient tijdelijk vertrokken. Toen de dooi flink doorzette en er weer wat open water was, waren de vogels zeer snel terug.

Wintertaling

De Wintertaling is een vrij algemene soort in de polder. De aantallen varieerden van 4 op 30 november tot 30 op 7 maart. Op 6 maart telde Jelle van Dijk 40 exemplaren in de polder.

Krakeend

De Krakeend is een onregelmatige gast in de polder. Op 25 oktober werden 14 exemplaren waargenomen en toen pas weer in maart, 4 exemplaren. Op 9 maart telde Jan Glasbergen 6 exemplaren in de polder.

Wilde eend

De Wilde eend was ook tijdens de vorstperiode in de polder aanwezig. De aantallen liepen flink uiteen tot ± 160 eind januari en begin februari tot 2 op 17 januari bij -5° C.
Gemiddelde waren 50 - 60 Wilde eenden in de polder aanwezig.

Slobeend

De Slobeend is een onregelmatige gast. Er zijn slechts 2 waarnemingen t.w. 1 op 1 op 28 december en 1 op 3 januari.

Tafeleend

Onregelmatige gast in de polder. Eind december 2 exx en op 7 februari 17 exx.

Kuifeend

De Kuifeend was van half december in wisselende aantallen (2 - 12 exx.) aanwezig.Alleen tijdens de vorstperiode was de Kuifeend weggetrokken. Op 7 februari 45 exx.

Brilduiker

Onregelmatige gast. Op 28 december en 3 januari 1 ex. Hein Verkade telde op 20 januari 5 Brilduikers.

Grote zaagbek

Onregelmatige gast. Op 7 februari 4 exx.

Sperwer

De Sperwer verblijft niet in de polder, doch is tijdens de trek regelmatig in de polder aanwezig.

Buizerd

De Buizerd is een regelmatige gast in de polder. Bijna wekelijks werd 1 Buizerd waargenomen, soms 2. De Buizerd trekt vooral met de Kieviten en Goudplevieren mee. Tijdens de vorstperiode waren Kieviten en Goudplevieren vertrokken. Ook de Buizerd liet zich toen niet zien.

Torenvalk

De Torenvalk is altijd aanwezig. Meestal 1, doch ook wel eens 2 exx.

Patrijs

In de herfst treft men wel koppeltjes Patrijzen aan. Deze koppeltjes worden in de loop van de winter steeds kleiner.

Waterhoen

Ieder jaar zit bij de schuur links van de tweede brug een koppel Waterhoentjes van 30 - 50 exx. Buiten deze concentratie ziet men in de polder weinig losse exemplaren.

Meerkoet

In de loop van de herfst verzamelen de Meerkoeten zich in grote groepen, die zich vooral in de weilanden bij de parkeerplaats ophouden. Ook tijdens de vorstperiode waren de Meerkoeten aanwezig. Gemiddeld verbleven 150 - 200 Meerkoeten in de polder. Begin maart liep dit aantal op tot ± 400 exx.

Scholekster

Onregelmatige gast in wisselende aantallen b.v. 21 december 25 exx. en op 24 januari 1 ex. doch op 15 maart 60 exx.

Goudplevier

In zachte winters overwinteren de Goudplevieren in de polder. Alleen tijdens een vorstperiode trekken ze tijdelijk weg.
Op 11 oktober werden de eerste Goudplevieren waargenomen. Dit aantal liep op tot ± 2000 exx op 30 november. Gemiddelde waren tussen de 800 - 1200 Goudplevieren in de polder aanwezig.

Kievit

Ook de Kievit overwintert in zachte winters. Goudplevieren en Kieviten zijn altijd in elkaars nabijheid te zien. Alleen de aantallen Kieviten zijn wat groter dan die van de Goudplevieren. Zijn er weinig Kieviten dan zijn er ook weinig Goudpleveieren. Op 15 november waren ± 2500 Kieviten in de polder aanwezig. Gemiddeld waren tussen de 1500 - 2000 Kieviten in de polder aanwezig.

Watersnip

Onregelmatige gast. De meeste waarnemingen zijn uit november met op 30 november 20 exx.

Wulp

Doortrekker in geringe aantallen. Op 21 december 8 exx.

Kokmeeuw

De Kokmeeuw is altijd in de polder aanwezig en soms in grote aantallen. Gemiddeld waren er tussen de 200 - 300 exx. aanwezig met een uitschieter op 3 januari van 1100 exx.

Stormmeeuw

Ook de Stormmeeuw is altijd in de polder aan te treffen. Gemiddeld tussen de 60 - 100 exx. met eveneens op 3 januari een uitschieter van 250 exx.

Kleine mantelmeeuw

De Kleine mantelmeeuw is alleen in de herfst in flinke aantallen aanwezig 40 - 70 exx. Deze meeuw trekt in de winter weg.
Na 30 november werden geen Kleine mantelmeeuwen meer waargenomen.
Op 5 maart verschenen ze met 8 exx.

Zilvermeeuw

De Zilvermeeuw is altijd aanwezig, soms in zeer grote aantallen. Deze aantallen kunnen nog al eens van uur tot uur verschillen. De polder wordt ook gebruikt als slaapplaats. Mogelijk dat vooral in de weekends de meeuwen van strand worden verjaagd door trimmers en honden en dan de weilanden in trekken.
Een leuk idee voor vogelaars die over veel vrije tijd beschikken dit eens uit te zoeken of het klopt.
Ik heb wel geconstateerd dat door een verstoring in de polder zelf de groep meeuwen als het ware oplossen. Zo tel je er nog een paar duizend en een half uur later nog slechts enkele tientallen. Waar zijn deze meeuwen heen gegaan? Waar kwamen ze vandaan?
Op 3 januari was er een concentratie Zilvermeeuwen van 1200 exx bij de parkeerplaats.

Grote mantelmeeuw

Ook de Grote mantelmeeuw is altijd in de polder aanwezig en in wisselende aantallen. Waar veel Zilvermeeuwen zijn, treffen we ook veel Mantelmeeuwen aan. Gemiddeld waren er tussen de 30 - 40 Grote mantelmeeuwen in de polder aanwezig met op 30 november en 3 januari 250 exx.

Kauw

De Kauw is altijd in de polder aanwezig, soms in grote aantallen. De Kauw gebruikt de polder ook als slaapplaats. Gemiddeld werden tussen de 40 - 60 Kauwen waargenomen. Op 19 oktober werden er 250 geteld en op 14 december en 21 december 120 exx.

Zwarte kraai

Deze soort is eveneens altijd in de polder aanwezig. De aantallen zijn vrij constant en liggen tussen de 12 - 16 exx.

Spreeuw

De Spreeuw is altijd in de polder aanwezig. Deze soort werd ook in de vorstperiode regelmatig in de polder waargenomen, doch in de eerste drie weken van februari, dus nà de vorstperiode, werd geen enkele spreeuw aangetroffen.
De Spreeuw komt vooral in de herfst met grote aantallen voor, gemiddeld 1200 - 1600 exx., doch op 3 januari 2500 exx.

Ekster

Altijd in de polder aanwezig met een vrij constant aantal van 6 - 10 exx.

Uiteraard zijn dit niet alle soorten die in de polder zijn waargenomen. Het zijn wel de belangrijkste soorten, omdat ze of in grote aantallen voorkomen of zeldzaam zijn voor de polder.

Vooral in de herfst trekken veel vogels door. Ze gebruiken de polder maar even om uit te rusten of om gauw iets te eten.
Tot deze groepen behoren Koperwieken, Zanglijster, Kramsvogels, Houtduiven, Graspiepers, Veldleeuweriken, Vinken enz.enz.

Mijn dank gaat uit naar Rien Sluijs die in de koudste periode van de winter een paar weekens voor mij heeft geteld omdat ik door griep aan huis gekluisterd was. Ik kan u verzekeren dat dan de polder Hogeweg geen pretje om langdurig daar te verblijven.

Noordwijk, juni 1987

Ees Aartse
Joh.Molegraafstraat 6
2201 LK NOORDWIJK

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Het aantal zeehonden dat volslagen uitgeput op de stranden van ons Waddengebied wordt aangetroffen stijgt met de dag. Ziek, ondervoed en absoluut niet meer in staat om op eigen kracht in leven te blijven, schreeuwen zij letterlijk om een laatste redmiddel.

De zeehondencrèche in Pieterburen weet per jaar vele tientallen van deze ten dode opgeschreven zeehonden met de juiste verzorging, voeding en medicijnen weer op krachten te helpen. Die inspanning kost tijd en geld.

Donateur worden van de zeehondencrèche in Pieterburen betekent een daadwerkelijke bijdrage leveren aan het wel en wee van het zeehondenbestaan. Door het insturen van de bon of een rechtstreekse overboeking op giro 36.73.095 t.n.v. zeehondencrèche Pieterburen zet u een eerste stap in de goede richting.

zeehondencrèche
PIETERBUREN

BON
Ja, ik red een zeehondeleven!
Maak mij donateur en stuur een acceptgiro
ter waarde van f _____
Naam: _____
Adres: _____
Kode: _____
Plaats: _____
Stichting Zeehondencrèche Antwoordnummer 950
9950 WL Pieterburen (Postzegel niet nodig)