

Adulte man Havik *Accipiter gentilis* als kortebaanzwemmer

Joop van den Berg & Gerard Ouweneel

Nadat Joop van den Berg op 27 september 2018 in het Oude Land van Strijen met leden van de Hoekschewaardse vogelwerkgroep de net gearriveerde Dwergganzen op zich had laten inwerken, ging hij tien dagen later, op 8 oktober, weer ter plekke poolshoogte nemen. Langs de Waleweg speurend naar de Dwergganzen zag hij vanuit de grasoever van een de polder invoerende sloot heel even de vleugel van een flinke roofvogel omhoogsteken. Aannemende met een in het Oude Land bepaald gewone Buizerd van doen te hebben, nam hij recht vóór de bewuste sloot positie in. Het betrof geen Buizerd *Buteo buteo* maar een adulte man Havik, die tot zijn borst in het water troonde en af en toe 'wiebelde' als zat hij op een trampoline. Naar later zou blijken had de Havik een vrouw Smient te pakken, waarbij Joop veronderstelde dat de Havik bezig was zijn prooi te verdrinken. Na enige tijd ondernam de roofvogel, met de steeds zwakker protesterende Smient onder zich, zwemmend de overtocht naar de andere kant van de sloot, een afstand van tussen de tweeënhalf en drie meter. Hij deed dat met een soort vlinderslag, waarbij hij af en toe tot zijn hals in het water verdween en de buitgemaakte Smient achter zich aan sleepte. Aan de overkant aangekomen klauterde Joops Havik met Smient en al met gemak de wal op, waarna hij zich eerst even droog schudde en daarna zijn buit 'mantelde'. Daarna stoven de veerplukken in het rond. Er waren al gauw twee Zwarte Kraaien *Corvus corone* bij die eerbiedig afstand hielden. In zijn mail van 2 november 2018 schrijft Joop dat op zeker moment de kop, ogen en snavel van de Havik dusdanig onder de eendendons zaten, dat deze deed denken aan een kerstman. Tijdens de niet langer dan een kwartier durende schranspartij zag Joop de krop van de Havik zienderogen gevuld raken tot een omvang dat deze als een grote bult voor zijn borst hing. Na een minuut of twintig vloog de Havik weg, van de Smient niet meer achterlatend dan de vleugels, poten, een berg veren en een skeletje. Het spektakel speelde zich af op ongeveer 60 meter van Joops standplaats, tussen 11.15 uur en 11.35 uur van de 8ste oktober.

De veronderstelling is dat de Havik zijn Smient buit maakte op de oever en dat deze, met de Havik op zijn rug, zich in paniek richting sloot sleepte, waardoor beide in de sloot terechtkwamen. Of de Havik moedwillig zijn prooi via verdrinking om het leven probeerde te brengen staat dus niet vast. Een paar jaar geleden zagen Adriaan Dijkse en Gerard Ouweneel in het Wagejot op Texel hoe een Havik een Kluut *Recurvirostra avosetta* te grazen namen. Ook daar troonde de Havik in het water nog niet eens zo kort een poosje op zijn prooi, die geheel kopje onder was geraakt. Na een poosje vloog de Havik weg, waarna de Kluut weer bovenkwam en ook zijns weegs ging.



Foto 1. Havikman staand op Smient in sloot, Oude Land van Strijen, 8 oktober (Joop van den Berg). *Adult male Goshawk standing on Widgeon in water-filled ditch, Oude Land van Strijen, 8 October 2018.*



Foto 2. Zelfde havikman ploeterend te water met Smient (Foto: Joop van den Berg). *Same Goshawk struggling towards shore with Widgeon.*



Foto 3. Zelfde havikman heeft moeite met slepen van ondergedompelde Smient (Foto: Joop van den Berg). *Same Goshawk having trouble with under-water transport of Widgeon.*



Foto 4. Zelfde havikman heeft de Smient aangeland en is bezig met plukken, gadeslagen door kapers op de kust (Foto: Joop van den Berg). *Same Goshawk having landed prey and plucking, closely observed by two Carrion Crows.*

Summary

Berg J. van den & Ouweneel G. 2019. Adult male Goshawk *Accipiter gentilis* drowns Widgeon *Mareca penelope*. De Takkeling 27: 77-80.

An adult male Goshawk was recorded whilst standing in a water-filled ditch, as it later turned out on top of a still moving Widgeon. It swam towards the opposite shore, some 2.5-3 m away, using a butterfly swimming mode, where it landed the Widgeon, shook itself free of water and immediately mantled its prey. It started plucking with two Carrion Crows *Corvus corone* nearby. After 15 min of plucking and tearing its crop was filled to capacity, and the bird flew away, leaving the carcass (wings, feet, feathers, skeleton). The entire episode took some 20 min. It remained unknown whether the Goshawk had dragged the prey into water with the purpose of drowning its prey, or whether predator and prey accidentally ended up in the water-filled ditch.

Adressen:

Joop van den Berg, Emmastraat 9, 3262 SE Oud-Beijerland

Gerard Ouweneel, Lijster 17, 3299BT Maasdam, glo@xs4all.nl