

TETRAGNATHIDAE	<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)	♂♀	
TETRAGNATHIDAE	<i>Tetragnatha montana</i> Simon, 1874	♀	♂♀
THERIDIIDAE	<i>Anelosimus vittatus</i> (C.L. Koch, 1836)	♂♀	♂
THERIDIIDAE	<i>Dipoena melanogaster</i> (C.L. Koch, 1837)		♀
THERIDIIDAE	<i>Paidiscura pallens</i> (Blackwall, 1834)	♀	♀
THERIDIIDAE	<i>Parasteatoda lunata</i> (Clerck, 1757)	juv.	
THERIDIIDAE	<i>Parasteatoda simulans</i> (Thorell, 1875)		♂♀
THERIDIIDAE	<i>Theridion varians</i> Hahn, 1833	♂♀	♀
THOMISIDAE	<i>Ozyptila praticola</i> (C.L. Koch, 1837)		♀

LITERATUUR

Helsdingen, P.J. van 2015. Catalogus van de Nederlandse spinnen. Versie 2015.2. Laatst bijgewerkt: 20 september 2015. – http://www.eis-nederland.nl/Portals/4/Werkgroepen/Spinnen/Spinnencatalogus_2015_1.pdf



DE WOLFSPIN *PIRATULA KNORRI* (BEEKPIRAAT) NA 124 JAAR AANGETROFFEN IN NEDERLAND

Anne Krediet

Soerenseweg 124, 7313EL Apeldoorn (anne.krediet@gmail.com)

ABSTRACT

A new record after 120 years of *Piratula knorri* in the southern part of the province of Limburg, may indicate the occurrence of a viable population in in the Netherlands.

Key words: Netherlands, *Piratula knorri*, rediscovery

Na meer dan 120 jaar niet in ons land waargenomen te zijn, werd op 29 mei 2014 een vrouwtje van *Piratula knorri* (Scopoli, 1763) verzameld. Het dier werd gevonden langs de Geul, direct ten westen van Partij (Zuid-Limburg). Het betrof een voor *P. knorri* typisch habitat; een beschaduwde grintoever. De Amersfoort-coördinaten van de waarneming zijn (192.277, 312.743).

De enige bekende waarnemingen van *P. knorri* dateren van 1882 bij Utrecht (Becker 1882), en van 1886 en 1890 bij Maastricht (Van Hasselt 1886, 1890). In de Eifel wordt de soort nog met enige regelmaat waargenomen. Een op deze soort gerichte inventarisatie van de Our, op de grens van België en Duitsland, leverde veel waarnemingen op. Daarbuiten zijn in België de waarnemingen schaars; een waarneming in de Belgische Eifel en één in de Viroinvallei. Het is waarschijnlijk dat de soort langs meer beekoevers veelvuldig voorkomt, maar dat hier te weinig wordt geïnventariseerd.

Omdat het in Nederland verzamelde dier niet direct als zodanig werd herkend, is verder niet intensief gezocht. Verdere inventarisatie van het geschikte biotoop kan uitwijzen in hoeverre de soort in Zuid-Limburg gevestigd is.

LITERATUUR

Becker, L. 1882. Les Arachnides de Belgique. Ire partie. – Annales du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique 10: 119.

Hasselt, A.W.M. van 1886. Catalogus Araneorum hucusque in Hollandia inventarum. – Tijdschrift voor Emtomologie 29: 51-102

Hasselt, A.W.M. van 1890. Catalogus Araneorum hucusque in Hollandia inventarum. Supplementum II. – Tijdschrift voor Emtomologie 33: 181-214

