

Vollenhoven, S.C. Snellen van, 1854.
Naamlijst van de Nederlandsche schildvleugelige insecten.-- Bouwst. Faun. Ned. 2: 1-70.

Vollenhoven, S.C. Snellen van, 1870.
Laatste lijst van Nederlandsche schildvleugelige insecten, (Insecta Coleoptera).-- Haarlem --: iv, 1-146.

Wiel, P. van der, 1949.
In memoriam Dr. A. Reclaire.-- Ent. Ber., Amst. 12: 409-413, 1 pl.

Wiel, P. van der, 1956.
Bijdrage tot de kennis der Nederlandse kevers, 4. (16e vervolg op het aanhangsel in Coleoptera Neerlandica 3).-- Tijdschr. Entom. 99: 1-21.

Wiel, P. van der, 1962.
Bijdrage tot de kennis der Nederlandse kevers, 5. (17e Vervolg op het aanhangsel in Coleoptera Neerlandica 3).-- Ent. Ber., Amst. 22: 169-178.

kenmerken om *O. norvegicus* te onderscheiden van de nauw verwante *O. flavicornis* (Sturm). De soort is reeds uit diverse andere Europese landen gemeld (Strand, 1971; Biström, 1977; Peschken & Lewis, 1981).

Biström, O., 1977.
Notes on *Olibrus norvegicus* and *Stilbus pannonicus* (Coleoptera, Phalacridae).-- Notul. Ent. 57: 49-50.

Peschken, D.P. & E.S. Lewis, 1981.
Neue Fundorte von *Olibrus norvegicus* Münster (Col., Phalacridae).-- Ent. Blät. biol. syst. Käfer 77: 140-142.

Strand, A., 1971.
Notes on *Olibrus norvegicus* Munst. and *O. flavicornis* Sturm (Col., Phalacridae).-- Norsk ent. Tidsskr. 18: 49-50.

R. Beenen

3. *Phyllotreta procera* Redtenbacher uit het aangrenzend gebied.

Phyllotreta procera werd op 21 IV 1984 in aantal verzameld op een droge helling langs het Albert-kanaal te Vroenhoven (België). De vindplaats ligt ongeveer 500 meter van de Nederlandse grens, zodat verwacht mag worden dat deze soort ook op geschikte plaatsen in Nederland zal voorkomen. De dieren bevonden zich tussen en op de bladeren van de rozetten van *Reseda luteola*. Derenne (1963) noemt *P. procera* voor België een zeldzame soort.

Derenne, E., 1963.
Chrysomeloidea, Chrysomelidae.--Cat. Coleopt. Belg. 4(94): 1-104.

R. Beenen

Kleine mededelingen 1-4

1. *Dermestes haemorrhoidalis* Küster f.n.sp., import.

Van de heer Q. Smeele ontving ik enige exemplaren van *Dermestes haemorrhoidalis*, verzameld in een woning te Amsterdam (april 1983). Deze soort werd in het verleden synoniem geacht met *D. peruvianus* Laporte. Brakman (1966) noemt wel *D. peruvianus* als geïmporteerd, maar vermeld *D. haemorrhoidalis* niet als waargenomen in Nederland. De soort is net als *D. ater* De Geer over de hele wereld met de handel verbreid. Lohse (1979) noemt in het bijzonder woningen in de grote steden. Waarschijnlijk staat deze soort in veel collecties onder *D. peruvianus*.

Brakman, P.J., 1966.
Lijst van Coleoptera uit Nederland en het omliggend gebied.--Monographieën ned. entom. Ver. 2: x, 1-219, 1 fig.

Lohse, G.A., 1979.
45. Familie: Dermestidae.--Die Käfer Mitteleuropas 6: 304-327, fig.

R. Beenen

2. *Olibrus norvegicus* Münster. f.n.sp.

Tijdens een inventarisatie van Het Gietelse en Appense Veld te Klarenbeek (Gld.) werd op 24 IX 1984 een mannetje van deze soort van de vegetatie gesleept. Strand (1971) geeft goede

4. *Spermophagus sericeus* (Geoffroy), bevestiging voorkomen in Nederland gevraagd.

Volgens Decelle (1983) behoort het materiaal uit de Nederlandse kustprovincies tot *S. calystegiae* Lukjanovich & Ter Minassian. Everts (1903) geeft ook Maastricht als vindplaats op, en deze opgave zou op de echte *S. sericeus* kunnen slaan. Helaas heb ik geen materiaal uit Limburg kunnen vinden en blijft het voorkomen van deze soort in Nederland twijfelachtig. Volgens Decelle (1983) komt *S. sericeus* voornamelijk op akkerwinde (*Convolvulus arvensis*) en *S. calystegiae* voornamelijk op zee- en haagwinde (*Calystegia soldanella* en *C. sepium*) voor.

Decelle, J.E., 1983.
Le genre *Spermophagus* Schönherr en Europe occidentale (Col. Bruchidae Amblycerinae).-- Bull. Soc. ent. Fr. 88: 235-241, fig. 1-12.

Everts, E., 1903.
Coleoptera Neerlandica, De schildvleugelige insecten van Nederland en het aangrenzend gebied 2(2).--'s-Gravenhage --:401-796, fig. 110-124, pl. 1-8.

J.Huijbregts