

9. *Carabus clathratus* (Linnaeus) in Noord-Brabant

Volgens Turin (1983) zou het voorkomen van deze loopkever in zuidelijk Noord-Brabant twijfelachtig zijn. Door mij werden echter enkele exemplaren van de soort verzameld onder de gemeente Leende, in de Boswachterij Leenderbos. De directe omgeving van de vindplaats bestaat uit eike- en dennebomen. Ook is in het betreffende vak een moerassig ven gelegen. Ik meen deze plaats als een vaste vindplaats te mogen beschouwen. Exemplaren werden gezien in 1975, 1982, en 1985.

C. Vendrig

10. Een nieuwe vondst van *Miscodera arctica* (Paykull) (Carabidae)

K. Alders en J.H. Donner vingden in een serie vangpotten op een heideterrein te Dalfsen (Ov.) een mannetje van deze soort in de periode 10.5.-15.6.1985.

Brakman (1963) meldde deze loopkever nieuw voor Nederland. Turin (1982) geeft een overzicht van de vondsten van deze soort uit de jaren 1959-1974. Van latere datum zijn geen waarnemingen bekend. De vondst in Dalfsen bevestigt het (sporadisch) voorkomen van deze kever op heideterreinen in het noordoostelijke deel van ons land.

Brakman, P.J., 1963. Korte coleopterologische notities, VI.— Ent.Ber., Amst. 23: 202-214.

Turin, H., 1982. Over het voorkomen van de loopkevers in Nederland, in het bijzonder van de zeldzame en uitgestorven soorten (Col., Carabidae).— Nieuwsbrief EIS-Nederland 12: 3-34.

R.Ph. Jansen

11. *Helophorus laticollis* Thomson, een inlandse soort (Hydrophilidae)

Bij de naamlijst van de Nederlandse waterkevers merkt Van Nieukerken (1982) op, dat *Helophorus laticollis* niet met zekerheid uit Nederland bekend is. Hij verwijst hierbij naar een ongepubliceerd verslag van De Groot (1974), dat handelt over de Nederlandse *Helophorus* soorten. In dit verslag ontbreekt *H. laticollis* geheel, hoewel zij reeds in 1934 door Reclaire & Van der Wiel als nieuw voor de Nederlandse fauna werd gemeld. Deze opgave heeft betrekking op een exemplaar in 1927 door F.T. Valck Lucassen te Plasmolen bij Mook (L.) verzameld. Heronderzoek van dit exemplaar, een mannetje (coll. RMNH), waarbij ook het genitaal werd bekeken, bevestigde de determinatie. In de collectie van het Zoölogisch Museum te Amsterdam werden nog drie exemplaren van deze soort gevonden. Het betrof hier oud materiaal afkomstig uit Bergen op Zoom (vóór 1900) en Eerbeek (1921). Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in NO Europa. Uit Groot Brittannië (Angus, 1971), Duitsland (Hebauer, 1980) en Denemarken (Hansen, 1983) zijn evenals uit ons land slechts zeer weinig vindplaatsen bekend. Angus (1971) beschouwt de engelse vondsten als mogelijke ijstijdrelicten.

Angus, R.B., 1971. Revisional notes on *Helophorus* F. (Col., Hydrophilidae). 3. Species resembling *H. strigifrons* Thoms. and some further notes on species resembling *H. minutus* F. — Entomologist's mon. Mag. 106: 238-256.

Groot, J.M.B. de, 1974. De Nederlandse soorten van het genus *Helophorus* F. (Coleoptera, Hydrophilidae). — Doctoraalverslag, Leiden. 68 pp.

Hansen, M., 1983. De Danske arter af slægten *Helophorus* Fabricius, 1775 (Coleoptera, Hydrophilidae). — Ent. Meddr 50: 55-76.

Hebauer, F., 1980. Beitrag zur Faunistik und Ökologie der

Elminthidae und Hydraenidae in Ostbayern. — Mitt. münch. ent. Ges. 69: 29-80.

Nieukerken, E.J. van, 1982. Handleiding voor het project waterkevers (Coleoptera). — Instructies Medewerkers EIS-Nederland 6: 1-28.

Reclaire, A. & P. van der Wiel, 1934. Bijdrage tot de kennis der Nederlandse kevers, 1. — Ent. Ber., Amst. 9: 11-19.

B. Drost

12. *Chrysomela vigintipunctata* (Scopoli, 1763) weer waargenomen in Nederland

Nadat *Chrysomela vigintipunctata* de laatste jaren vaker gemeld werd uit het aangrenzend gebied (Ardennen, Eifel) nu eindelijk een waarneming uit Nederland. Langs de Eyserbeek in de gemeente Wittem (L.) werd op 24.5.1987 een exemplaar van een knotwilg geklopt. In Nederland werd deze soort ooit bij Roermond en Breda gevonden (Everts, 1903; 1922). In het buitenland wordt *C. vigintipunctata* ook meestal gemeld van wilgen die vlak langs beken groeien. Het lijkt zinvol in dit soort biotopen, met name in Zuid-Limburg, uit te zien naar deze bijzondere soort.

Everts, E., 1903. Coleoptera Neerlandica 2. — 's-Gravenhage, pp. 401-796, pl. 1-8.

Everts, E., 1922. Coleoptera Neerlandica 3. — 's-Gravenhage, xviii + 667 pp.

Ron Beenen