

Nieuwsbrief European Invertebrate Survey - Nederland, 18: 5-6.

Nieuwe en interessante kevers uit Noord-Brabant en Gelderland

A. P. J. A. Teunissen

In de onderstaande lijst is een reeks van waarnemingen uit Noord-Brabant en Gelderland samengevat die aanvullend zijn op de lijst van Brakman: 8 soorten zijn nieuw voor Noord-Brabant, 3 zijn nieuw voor Gelderland. Andere interessante meldingen zijn toegevoegd.

Oedostethus quadripustulatus (Fabricius)

In de rivierduintjes langs de Waal is dit kniptorretje een vrij algemene verschijning. Het leeft tussen grassen, onder aangespoeld hout, onder stenen en zelfs onder droge koemest. Hurwenen (Gld.) ten oosten van Zaltbommel: 29.7.1984, 1.6.1985, 17.8.1986. Van der Krift ving exemplaren te Lage Zwaluwe, 10.7.1965 en Moerdijk, 24.6.1960. Nieuw voor Noord-Brabant.

Negastrius sabulicola (Boheman)

Dit bont getekende kniptorretje wordt evenals *O. quadripustulatus* aangetroffen in de rivierduintjes in de omgeving van "de Kil van Hurwenen" [Gld] een oude Waalarm ten oosten van Zaltbommel. Hurwenen 16.5.1976 (H. v.d. Krift), 28.8.1977, 29.7.1984 en 1.6.1985 (C. Berger, A. Teunissen). Nieuw voor Gelderland.

Anthicus bimaculatus (Illiger)

Deze ongewone, op een mier gelijkende kever werd met de volgende in aantal aangetroffen in de rivierduinen van de Waal te Hurwenen (Gld). Ze werden voornamelijk verzameld op 28 augustus 1977 en op diverse data in latere jaren, waar ze te vinden waren tussen gras, onder planken en onder droge plantaardige resten (C. Berger, A. Teunissen).

Anthicus sellatus (Panzer)

Evenals *A. bimaculatus* komt deze soort voor in de rivierduinen langs de Waal bij Hurwenen (Gld). Vangdata en plaats zijn voor beide soorten nagenoeg gelijk. Nieuw voor Gelderland.

Diaperis boleti (L.)

Zeer talrijk op berkenzwammen komt in de Drunense Duinen (N.Br.) voor de zwartlijfkever *D. boleti*. Met name in 1985 was de kever in het hele gebied aan te treffen. Drunen 1.6. en 6.6.1985. Eerder trof ik de kever aan te Maarheeze (N.Br.), 31.3.1979. Brakman (1966) geeft de kever uitsluitend aan van Gelderland en Limburg.

Tribolium castaneum (Herbst) en *Tribolium confusum* Jacquelin du Val

Beide soorten werden verzameld in de complexen van een van 's lands grootste bierbrouwerijen in Den Bosch. Beiden zijn kosmopolitisch en waren, hoewel niet eerder voor Noord-Brabant aangegeven, te verwachten.

Trox sabulosus (L.)

Horizontale takken van dennen dienen aan de rand van de Drunense Duinen (N.Br.) als slaappleaats voor de blauwe reiger. De voedselresten die onder deze slaappleaatsen worden aangetroffen, bevatten grote aantallen van deze, niet gewone soort. De voornamelijk uit haren bestaande resten bevatten verder delen van *Geotrupes* sp. en *Dytiscus* sp. De kevers werden waargenomen op 12.5.1985, 23.5.1985, 4.4.1986, 17.8.1986.

Phytodecta rufipes (Degeer)

Het gebied "De Geelders" tussen Boxtel-Liempde en St. Oedenrode (N.Br.) is een entomologisch interessant gebied. Op 16.5.1981 trof ik op wilg dit voor Noord-Brabant niet eerder waargenomen haantje aan. De soort *Ph. viminalis* (L.) is er vrij algemeen. Beide soorten komen op dezelfde planten voor.

Aphona violacea (Koch)

Dit niet algemene haantje werd in aantal aangetroffen op moeraswolfsmelk (*Euphorbia palustris*) in het natuurgebied "De Rampert" ten noordwesten van Kerkwijk (Gld), 4.5.86 en 12.6.84. De weinige voedselplanten bevinden zich in de vochtige grienden van dit natuurgebied.

Altica brevicollis Foudras

Een vrij algemene verschijning in de vochtige broekbossen ten zuiden en oosten van Boxtel (N.Br.) is deze op hazelaar (*Corylus avellana*) voorkomende kever. Brakman (1966) vermeldt uitsluitend vangsten van Limburg.

Altica palustris Weise

Deze niet algemene soort trof ik op 23.3.1977 in een zeer groot aantal aan in de omgeving van Gameren (Gld) langs de Waal ten westen van Zaltbommel. De kevers drevten tussen de plantenresten die door de hoge waterstand van dat moment langs de oever bij elkaar werden gedreven. In de veronderstelling dat het hier *A. lythri* Aubé betrof, nam ik slechts enkele mannetjes mee ten behoeve van vindplaats en genitaalonderzoek. In latere jaren verzamelde ik enkele exemplaren in de buurt van mijn woonplaats. Vlijmen: 3.7.1983; Vlijmen: 29.8.1983 en Elshout, Gemeente Drunen: 16.8.1981. Laatsten werden verzameld op *Epilobium* spec. Brakman (1966) geeft alleen Noord-Brabant en Zeeland op.

Altica carinthiaca Weise

In juni 1973 verzamelde ik een exemplaar langs het Beatrixkanaal ten oosten van de Oirschotse heide. De soort werd in Brakman (1966) alleen voor Zeeland opgegeven.

Crepidodera sublaevis Motschulsky


In vochtige blauwgraslanden sleepte ik dit haantje te Sprang Capelle (N.Br.) op 24.7.1982 en in de omgeving van Vlijmen (N.Br.) op 14.7.1983.

De soort is zeker minder algemeen dan *C. ferruginea* (Scopoli), maar is vaak aan de aandacht ontsnapt door zijn uiterlijke gelijkenis. Niet eerder voor Noord-Brabant aangegeven. (Brakman, 1966).

Literatuur

Brakman, P.J., 1966. Lijst van Coleoptera uit Nederland en het omliggend gebied. — Monographieën Ned. ent. Ver. 2: i-x, 1-219.

Strausslaan 6, 5251 HG Vlijmen



Otiorrhynchus sulcatus (Fabricius), tekening B.J. van Vondel